



Encontro Científico da EMESCAM



Apresentação dos TCCs

Ano I - Volume II

2017



EMESCAM

Tradição e Conhecimento em Saúde

Apresentação dos TCCs

Ano I - Volume II

2017



Editoria Científica

Adércio João Marquezini

Fabiana Campos Franco

Gracielle Karla Pampolim Abreu

Iana Soares de Oliveira Penna

Maria Cirlene Caser

Maria da Graça Silva Matede

Sara Martins de Barros Maestri

Editoria Executiva

Janaina Dardengo

Yára Musiello Barcellos

Aline Cosmo Rubia

Elisangela Terra Barbosa Povoas

Apresentação

Semestralmente a Emescam promove o Encontro Científico em que são apresentados os Trabalhos de Conclusão de Cursos; e nesta edição do segundo semestre de 2017 o evento passou a contar com a apresentação dos TCCs também dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.

Trata-se de um processo de integração entre os segmentos educacionais no conceito de formação integral do ser humano.

Os trabalhos apresentados foram separados por curso de graduação e de especialização após análise criteriosa do Corpo Editorial

Desejamos a todos uma excelente leitura

SUMÁRIO

[ECE001] A POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA	10
[ECE002] A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COM CÂNCER	10
[ECE003] EXPECTATIVAS DE FAMÍLIAS E DE CRIANÇAS NO PROCESSO DE ADOÇÃO	11
[ECE004] A EDUCAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DO INDIVÍDUO” Uma visão relacionada aos egressos do curso Serviço Social – 1ª turma Emescam	12
[ECE005] DOENÇA DE ALZHEIMER: O CUIDADO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS E CUIDADORES	13
[ECE006] ANÁLISE DA INSTRUMENTALIDADE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE UMA EMPRESA PRIVADA EM VITÓRIA - ES	14
[ECE007] POLÍTICA NACIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECENDO A EXPERIÊNCIA DO CENTRO POP DE VILA VELHA (ES)	15
[ECE008] RELAÇÃO ENTRE CONSELHO TUTELAR E MÃES ADOLESCENTES IDENTIFICADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: APONTAMENTOS PARA UM DEBATE	16
[ECE009] A INSERÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS NO MUNDO DO TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS	17
[ECE010] O PROCESSO DE DESLIGAMENTO DE ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS: REFLETINDO SOBRE MAIORIDADE E AUTONOMIA	18
[ECE011] INCLUSÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DA GRANDE VITÓRIA NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL	19
[ECE012] AS MÃES DA APAE: DESAFIOS ENFRENTADOS COM A CHEGADA DOS (AS) FILHOS (AS) COM DEFICIÊNCIA	20
[ECE013] ADOÇÃO TARDIA: EXPECTATIVAS E OBSTÁCULOS	21
[ECE014] A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MERCADO DO TRABALHO: A EXPERIÊNCIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NAS APAES DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA	22
[ECE015] TRATAMENTO DE SÍFILIS RECENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	23
[ECE016] TRATAMENTO DE SÍFILIS RECENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA	24
[ECE017] SÍNDROME DE MCCUNE-ALBRIGHT: REVISÃO DE LITERATURA	25
[ECE018] - ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA, SOCIOECONÔMICA E A SATISFAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA.	26
[ECE019] - OS VÍNCULOS DE TRABALHO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E A LONGITUDINALIDADE DO CUIDADO	27

[ECE020] - AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL / CIRCUNFERÊNCIA DE PESCOÇO COMO INSTRUMENTO DE TRIAGEM DE HIPERTENSÃO EM ADOLESCENTES	28
[ECE021] - SÍNDROME DE POEMS: REVISÃO DE LITERATURA	29
[ECE022] - DOENÇA DE CROHN PERIANAL: REVISÃO DE LITERATURA	30
[ECE023] - DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO PRECEDENDO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: RELATO DE CASO CLÍNICO.	31
[ECE024] - ANÁLISE DE EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA DO <i>Streptococcus pneumoniae</i> AOS BETA - LACTÂMICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.	32
[ECE025] - Distrofia muscular de Duchenne: relato de caso e revisão bibliográfica	34
[ECE026] TROMBOFLEBITE FÚNGICA DO SEIO CAVERNOSO: ASPECTOS ANATÔMICOS, CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS	35
[ECE027] TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	36
[ECE028] - DELÍRIUM PÓS-OPERATÓRIO EM PESSOAS IDOSAS: FREQUÊNCIA, FATORES ASSOCIADOS E INFLUÊNCIA NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR.	37
[ECE029] ABORDAGEM CIRÚRGICA COM INTENÇÃO CURATIVA NO ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA	38
[ECE030] - ACNE NA MULHER ADULTA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	39
[ECE031] - SÍNDROME DE <i>BURNOUT</i> EM MÉDICOS BRASILEIROS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	40
[ECE032] - AVALIAÇÃO DO USO DA RAZÃO CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA POR ESTATURA COMO PREDITORA DE EXCESSO DE PESO NA ADOLESCÊNCIA	41
[ECE033] -ANÁLISE DO CONTROLE GLICÊMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE APOIO AO DIABETES INFANTIL	43
[ECE034] -COLITE PSEUDOMEMBRANOSA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	44
[ECE035] TRATAMENTO CONSERVADOR DO TRAUMA FECHADO DE FÍGADO E BAÇO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	45
[ECE036] PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES.....	46
[ECE038] ERROS PRÉ ANÁLITICOS EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	48
[ECE039] A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM NEONATAL E DO ACONSELHAMENTO GENÉTICO COMO PREVENÇÃO DA ANEMIA FALCIFORME.....	49
[ECE040] ESTUDO DOS FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS A INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO DOS IDOSOS, DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DA CIDADE DE SIMONÉSIA MG.....	50
[ECE041] RESISTÊNCIA BACTERIANA ASSOCIADA AO USO IRRACIONAL DE ANTIMICROBIANOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	51
[ECE042] HEPATITE C: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E ESTUDO DA SOROPREVALÊNCIA DE HEPATITE C NA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, EM 2016.	52
[ECE043] IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUCAS – HESL.....	53
[ECE044] IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.....	54

[ECE045] PROJETO DE IMPLANTAÇÃO: GERENCIAMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO LUCAS – VITÓRIA – ES.	55
[ECE046] POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PNEPS) E A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH): POSSÍVEIS INTER-RELAÇÕES.	56
[ECE047] ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE IMPRENSA: O APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, FUNCIONARIOS E A OPINIÃO PUBLICA.	57
[ECE048] ELABORAÇÃO DE ROTEIRO COMO INSTRUMENTO NORTEADOR PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA DO ESPÍRITO SANTO.	58
[ECE049] LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS: UMA ABORTAGEM TEÓRICA-NORMATIVA.	60
[ECE050] ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUCAS – DIFICULDADES E DESAFIOS ENCONTRADOS NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO E SUGESTÕES DE MELHORIAS/ADEQUAÇÕES COM BASE NOS DADOS ANALISADOS.	61
[ECE051] ORÇAMENTO PÚBLICO: PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DA SOCIEDADE.	62
[ECE052] ANEMIA FALCIFORME.	63
[ECE053] TOXOPLASMOSE: PREVALÊNCIA DE SOROPOSITIVIDADE EM GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JAGUARÉ – ES.	64
[ECE054] ALTERAÇÕES NO HEMOGRAMA DE PACIENTES COM DENGUE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES.	65
[ECE055] DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA ANEMIA PERNICIOSA.	66
[ECE056] A EVOLUÇÃO DA MALÁRIA NO BRASIL E A DIFÍCIL MISSÃO DE ERRADICAÇÃO DA DOENÇA NA AMAZÔNIA LEGAL.	67
[ECE057] ALIMENTOS FUNCIONAIS E NUTRACÊUTICOS NA MODULAÇÃO DA PSORÍASE.	68
[ECE058] NANOTECNOLOGIA EM COSMÉTICOS.	69
[ECE059] A FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.	70
[ECE060] DESENVOLVIMENTO DE BIOCOSMÉTICOS.	71
[ECE061] A IMPORTÂNCIA DO EXAME PREVENTIVO GINECOLÓGICO PAPANICOLAU.	72
[ECE062] A EFETIVIDADE DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO.	73
[ECE063] A IMPORTÂNCIA DO HEMOGRAMA NO DIAGNÓSTICO DA ANEMIA FALCIFORME.	75
[ECE064] ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE UM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITOS.	76
medicina do trabalho	77
[ECE065] ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA. ..	77
[ECE066] ADEÇÃO AO PROTOCOLO DE SEGUIMENTO DE ACIDENTES PERFUROCORTEADOS EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM UM HOSPITAL EM VITÓRIA, ESPIRITO SANTO.	79
[ECE067] RISCO OCUPACIONAL À EXPOSIÇÃO DE ANTINEOPLÁSICOS REVISÃO DE LITERATURA.	80
[ECE068] A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DO TRABALHO JUNTO A PACIENTES COM PERDA AUDITIVA POR RUÍDOS NO AMBIENTE DE TRABALHO.	81
[ECE069] A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA COMO RISCO À SAÚDE DO TRABALHADOR.	82

[ECE070] OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DIANTE DAS DIFICULDADES DE ADAPTAÇÃO VIVENCIADAS PELO PACIENTE LÚCIDO	83
[ECE071] MEDIDA DA PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM	84
[ECE072] PUÉRPERAS E SINDROME HELLP: CUIDADOS DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	85
[ECE073] IMPLICAÇÕES E INTERVENÇÕES DOS FATORES ESTRESSORES NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS	86
[ECE074] INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA COM A TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	87
[ECE075] NOVAS DROGAS NO TRATAMENTO DO CÂNCER (MIELOMA MÚLTIPLO) – ANTICORPO MONOCLONAL	88
[ECE076] BIOSSEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS: PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE AO RISCO QUÍMICO.....	89
[ECE077]O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO FRENTE A UMA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA.....	90
[ECE078] - O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE QUEIMADO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	91
[ECE079] - O ENFERMEIRO COMO EDUCADOR EM UMA EQUIPE DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR	92
[ECE079] - PAPEL DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	92
[ECE080] -A PSICOSSOMÁTICA DO CÂNCER DE MAMA: DOENÇA QUE ANSEIA OU ANSIEDADE QUE ADOECE?	93
[ECE081] -A PSICOSSOMÁTICA DO CÂNCER DE MAMA: DOENÇA QUE ANSEIA OU ANSIEDADE QUE ADOECE?	95
[ECE082] - A IMPORTÂNCIA DO EXAME PREVENTIVO GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	96
[ECE083] - A IMPORTÂNCIA DO EXAME PREVENTIVO GINECOLÓGICO PAPANICOLAU	97
[ECE084] - ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE UM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITOS.....	97
[ECE085] - ASPECTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	99
[ECE086] A UTILIZAÇÃO DA ESCALA DE BRADEN COMO FATOR PREDITIVO AO APARECIMENTO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.	100
[ECE087] - CUIDADOS PALIATIVOS DOS PACIENTES TERMINAIS E ABORDAGEM DOS FAMILIARES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI.....	101
[ECE088] - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOSEM SERVIÇOS DE SAÚDE: UTI.....	102
[ECE089] - ESTUDO DOS PRINCIPAIS FÁRMACOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO TÓPICO E ORAL DE PACIENTES COM PSORÍASE	103
[ECE090] - O MERCADO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS NO BRASIL	104
[ECE091] - ESTABILIDADE DE FITOCOSMÉTICOS	105
[ECE092] - ANÁLISE DE PARASITAS INTESTINAIS EM AMOSTRAS FECALIS DE PACIENTES DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE ITAGUAÇU - ES.....	106



[ECE093] -DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	107
[ECE094] - PREVENÇÃO PRIMÁRIA: UMA ALTERNATIVA A SER TRABALHADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	108

[ECE001] A POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Elaine Aniceto da Silva

Gisele Ezequiela Mourão de Oliveira

Fabricia Maria Milanezi

Este artigo teve por objetivo analisar a Política de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes no Município de Vitória, pautada nas legislações e políticas sociais que norteiam os serviços de acolhimento. Para tanto optou-se pelo método crítico-dialético e pelas pesquisas: básica, descritiva, qualitativa e documental. As pesquisas possibilitaram o mapeamento dos serviços de acolhimento e a análise dos Projetos Políticos Pedagógicos que direcionam o serviço de acolhimento institucional.

Palavra-chave: Crianças e Adolescentes. Acolhimento Institucional. Legislação Social.

[ECE002] A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COM CÂNCER

Elaine Aniceto da Silva

Angela Maria Caulyt Santos

Eliane Tozato Pereira

Leyla Márcia Kill Escola

Espera-se que este artigo contribua no campo das políticas sociais públicas e possa ser referência às mulheres em tratamento contra o câncer, sobretudo conheçam seus direitos garantidos e que lutem pelos mesmos. Para que esse propósito seja alcançado entra em atuação o assistente social fazendo orientações sobre as políticas públicas e orientações técnicas sobre os meios para acessar esses direitos. O objetivo é identificar as políticas públicas direcionadas às mulheres com câncer; e, descrever a atuação do assistente social em meio às políticas públicas para mulheres com câncer. Pesquisa descritiva com característica de abordagem qualitativa e bibliográfica com utilização de bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

(CAPES) e Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG) no período de junho de 2012 a junho de 2017. Consideram-se como resultados a apresentação de políticas sociais públicas, Leis e Portarias que amparam as mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Discorre-se brevemente sobre os aspectos da doença câncer de mama, câncer de colo do útero e câncer de ovários que são os que mais acometem as mulheres. As principais legislações que as amparam e descreve-se sobre a atuação do assistente social em equipe multidisciplinar, com orientações técnicas à mulher ou ao seu familiar para acessarem esses direitos. Conclui-se afirmando que a atuação do assistente social é importante no campo da saúde, pois para acessar direitos é necessário que tenha profissional que instrua essas mulheres e seus familiares na luta por um tratamento digno, para que tenham seus direitos respeitados.

Palavra-chave: A atuação do assistente social; Políticas Públicas; Mulheres com câncer.

[ECE003] EXPECTATIVAS DE FAMÍLIAS E DE CRIANÇAS NO PROCESSO DE ADOÇÃO

Fabiana Oliveira dos Santos

Lorena de Souza Eleutério

Raquel de Matos Lopes Gentilli

O objetivo deste trabalho foi discutir as expectativas dos postulantes à adoção e de crianças até 6 (seis) anos de idade em face da realidade destas, em acolhimento institucional, quanto ao processo de adoção. Método: o método utilizado para fazer a pesquisa seguiu a metodologia proposta por Cecília Minayo com abordagem de estudo qualitativo. Para a coleta de dados foram utilizadas revisão bibliográfica, pesquisa documental no Sistema de Informação e Gerência da Adoção e Acolhimento, com autorização institucional, entrevista com os candidatos à adoção e observação participante das crianças em atividade lúdica. Resultados: Obtivemos, como resultado, elementos sobre a visão da família adotante em relação ao convívio familiar que vai ser modificada com o ingresso da criança adotada e da construção de uma nova tecitura de relações em família. Conclusão: Concluímos que as famílias entrevistadas relatam expectativas ligadas à identificação tanto de aparência física quanto de personalidade.

Em relação às expectativas das crianças observamos que as mesmas trazem questões envolvendo sentimentos de pertencimento e inclusão, manifestação de afeto e cuidados individuais, manifestação de desejo de segurança e proteção.

Palavra-chave: adoção, acolhimento, criança institucionalizada

[ECE004] A EDUCAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DO INDIVÍDUO” UMA VISÃO RELACIONADA AOS EGRESSOS DO CURSO SERVIÇO SOCIAL – 1ª TURMA EMESCAM

Alfredo Bruno Siqueira Rossi

Edelária Koehler

Nara Núbia Siqueira Marçal

Célia Marcia Birchler

Angela Maria Caulyt Santos da Silva

Rúbia Mara Ferreira de Alvarenga

Esse trabalho de conclusão de curso buscou contextualizar a trajetória dos egressos da primeira turma de Serviço social da Emescam, relatando acerca das políticas públicas voltadas para a educação explorando o subjetivo do entrevistado na sua experiência vivida durante e após a graduação correlacionadas com as expressões da questão social, elucidando a transformação do sujeito através do processo educacional de forma descritiva, utilizando a metodologia qualitativa para humanizar a pesquisa destacando as interações humanas e as acepções dos fenômenos. Através da coleta de dados documental com tratamento sintético, pesquisa de campo buscando informações diretas com o sujeito e analisando o conteúdo para relatar o comportamento do ser, atestado por uma fonte com intuito de desvendar o curso para além do mercado de trabalho, analisando a transformação do sujeito através da graduação, assim concluímos que o indivíduo mesmo que não venha a exercer suas atividades no campo profissional, através de todo aparato absorvido e refletido na graduação o torna apto para ser um assistente social.

Palavra chave: Educação. Egressos. Transformação. Serviço Social

[ECE005] DOENÇA DE ALZHEIMER: O CUIDADO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS E CUIDADORES

Iara Julião Lopes

Maria da Silva Santo

Eliane Tozato Pereira

Adriana Mendes

Renato Lirio Morelato

Este artigo tem como objetivo traçar o perfil sócio demográfico dos idosos com Doença de Alzheimer (DA) e de seus cuidadores que fazem acompanhamento no ambulatório de geriatria do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – HSCMV, identificando às dificuldades e/ou demandas apresentadas ao Serviço Social. Tratou-se de uma pesquisa documental com levantamento de dados no prontuário eletrônico e análise de 23 fichas de entrevista social com informações dos idosos e cuidadores realizada pelo assistente social da instituição. Identificou-se nesta amostra que os idosos possuem baixa escolaridade, são aposentados ou recebem benefício assistencial, com renda que varia de um a três salários mínimos, a maioria professa sua fé na religião católica e geralmente convive com um familiar, filho/a, esposo/a, que exerce a função de cuidar. Os cuidadores são na maioria informal, do sexo feminino com escolaridade de nível médio e sem vínculo empregatício devido à necessidade de despender tempo integral ao idoso. Apesar das dificuldades econômicas e sociais, e da sobrecarga de trabalho, cuidar é um ato de amor e solidariedade para os cuidadores pesquisados. Embora as legislações vigentes preconizem aos idosos e cuidadores o acesso a bens e serviços como direito do cidadão, verifica-se que ainda faltam investimentos e efetivação de políticas públicas voltadas para esses sujeitos. Os dados apontam para necessidade de ampliação da oferta de grupos de apoio, como o Grupo de Cuidadores de Idosos do HSCMV, assim como maior envolvimento da sociedade e do Estado nas demandas relativas ao processo de envelhecimento, e, sobretudo, a velhice com Alzheimer.

Palavra-chave: Idoso, Alzheimer, Cuidador, Família, Dificuldades.

[ECE006] ANÁLISE DA INSTRUMENTALIDADE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE UMA EMPRESA PRIVADA EM VITÓRIA - ES

Renata Nunes Ribeiro

Aparecida de Oliveira Rezende

Maria Cirlene Caser

Cláudia Gomes Rossoni

Livia Pereira Nunes Bessa

Este artigo tem como objeto de estudo a análise da instrumentalidade no exercício profissional dos assistentes sociais de uma empresa privada, localizada em Vitória - ES. Compreendemos que o Serviço Social caracteriza-se como uma profissão assalariada inserida na divisão social e técnica do trabalho que enfrenta as correlações de forças entre capital x trabalho, isto é, ao mesmo tempo em que atua sobre as necessidades dos trabalhadores é chamado a atender aos requisitos de seu empregador. Desse modo, este estudo buscou evidenciar através das mudanças do mundo do trabalho a forma com que a instrumentalidade configurada como mediação tem sido executada na passagem das ações meramente instrumentais para o exercício profissional crítico e competente, considerando nesta perspectiva o olhar do próprio assistente social sobre seu processo de trabalho. Tratou-se de pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, utilizando o procedimento documental para a coleta de dados do sistema de registro de casos sociais atendidos pelo setor de Serviço Social. As informações foram “complementadas” com entrevistas realizadas com assistentes sociais que atuam nesse espaço ocupacional. Conclui-se que mesmo com os desafios e contradições na rotina profissional, o assistente social na empresa privada tem extrema importância, pois compreende a realidade social dos empregados na sua totalidade e a partir desse conhecimento desenvolve a instrumentalidade do exercício profissional, com estratégias e técnicas para atender as intervenções com competência profissional, e como resultado conquista cada vez mais seu espaço de atuação na empresa privada.

Palavra-chave: Serviço Social. Esfera Privada. Instrumentalidade.

**[ECE007] POLÍTICA NACIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA:
CONHECENDO A EXPERIÊNCIA DO CENTRO POP DE VILA VELHA (ES)**

Debora Barbosa Alves

Eliana Moreira Nunes Garcia

Cláudia Gomes Rossoni

Maria Dorotéa dos Santos Silva

Este estudo tem como tema a Política Nacional para População em Situação de Rua e o Centro Pop, dentro do contexto histórico de conquista dos direitos e garantias fundamentais para esta população. Como objetivo, procura analisar a implantação e consolidação do Centro de Referência Especializado para População em situação de rua (Centro Pop) de Vila Velha, Espírito Santo à luz da Política Nacional de Assistência para Pessoas em Situação de Rua e propõe descrever o processo de uso das ruas como moradia (habitar-morar) por esse segmento da população, contextualizando o processo de rompimento dos vínculos sociais e familiares. A metodologia escolhida para este estudo foi a pesquisa bibliográfica e documental. Para contextualizar o uso das ruas como moradia (habitar-morar) optou-se por uma revisão bibliográfica dos autores que discutem essa temática, normativas, orientação técnica e política específica destinada ao atendimento a esta população, visando fundamentar e compreender o processo de construção e efetivação dessas políticas. A pesquisa qualitativa descritiva e documental foi realizada nos relatórios de atendimentos produzidos do Centro Pop, do município de Vila Velha. Este estudo demonstra que o desafio está na reformulação de políticas públicas coerentes com a real necessidade da PSR e das mais variadas demandas na busca pela construção da cidadania e emancipação destes indivíduos das ruas. Neste sentido apontamos que o tema população em situação de rua é relevante, e complexo; o que requer novos estudos e aprofundamento, buscando respostas na realidade vivida por esses sujeitos, e nas mais variadas expressões da questão social que estão expostos, visando uma intervenção humanizada, e a ampliação das políticas públicas.

Palavra-chave: Assistência Social. População em Situação de Rua. Centro Pop – Vila Velha.

[ECE008] RELAÇÃO ENTRE CONSELHO TUTELAR E MÃES ADOLESCENTES IDENTIFICADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: APONTAMENTOS PARA UM DEBATE

Ana Paula da Pena Costa
Bruna Ávila Pimenta da Silva
Jaqueline da Silva
Célia Márcia Birchler
Jussara Bezerra de Menezes

O presente trabalho tem como objetivo apresentar breve debate, sobre o atendimento do Conselho Tutelar, visto a demanda de acompanhar adolescentes em situação de risco social, desacompanhadas de seus responsáveis. Traz na história dos direitos da pessoa em desenvolvimento, a necessidade de criar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) juntamente com o Conselho Tutelar, que visam respectivamente, transformar as crianças e adolescentes em cidadãos providos de todos os direitos, e dar a proteção garantindo os direitos para aqueles que tiverem seu direito violado. Diante disto, analisaremos um (1) caso, em que seria fundamental o atendimento do Conselho Tutelar, levando em conta as atribuições do mesmo dispostas no ECRIAD e o que está disposto na lei que rege esses desprotegidos. Citaremos o crescente número de gravidez na adolescência que é uma questão social cada vez mais presente no nosso dia a dia e percebidos dentro do campo de estágio da maternidade Pro-Matre. Diante do não acompanhamento dos responsáveis legais dessa adolescente, faz com que mãe e filho se tornem indefesos diante da sociedade e desprovidos de seus direitos, inerentes a pessoa humana. Salientamos a importância do trabalho em rede e do conhecimento dos direitos de cada cidadão, como também o trabalho primordial do Serviço Social em constatar a demanda e enviá-la para o órgão competente, para que tomem providências cabíveis aos mesmos.

Palavra-chave: Gravidez. Adolescência. Conselho Tutelar

[ECE009] A INSERÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS NO MUNDO DO TRABALHO:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Bárbara Oliveira de Souza

Ingrid Nayara Moreira Martins

Maria Cirlene Caser

Pedro Bussinger

Sebastião Gonçalves de Barros Neto

Esse artigo teve por objetivo analisar os desafios e perspectivas da população transexual integrantes do grupo da Associação Gold – Grupo Orgulho, liberdade e dignidade no processo da inserção no mercado de trabalho. Este segmento da população não consegue emprego formal e por isso, na maioria das vezes, realiza trabalho informal e/ou atua na prostituição. De acordo com o dado da ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transexuais, 90% das travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil. Tratou-se de pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevistas, com roteiro semiestruturado de perguntas fechadas e abertas, com 10 (dez) integrantes transexuais da associação Gold. Conclui-se que existem dificuldades para a inserção da pessoa transexual no mundo do trabalho. Apesar da maioria dos transexuais terem cursos e escolaridade de acordo com o exigido no mercado formal de trabalho, são deixados para trás na hora da seleção. Além disso, os que estão inseridas no trabalho formal sentem o peso da intolerância no ambiente de trabalho, pois as empresas não estão preparadas para lidar com a situação, sendo revelado que os colegas de trabalho não entendem a sua condição de transexual, ficando evidente a falta de informação por parte dos integrantes das empresas sobre a identidade de gênero. Identificou-se que são necessários investimentos em políticas públicas que assegurem a empregabilidade para essa população, cabendo aos assistentes sociais trabalhar para efetivação das políticas sociais, lutando para a defesa e garantia de seus direitos.

Palavra-chave: Mercado de Trabalho - Serviço Social - População Transexual.

[ECE010] O PROCESSO DE DESLIGAMENTO DE ADOLESCENTES
INSTITUCIONALIZADOS: REFLETINDO SOBRE MAIORIDADE E AUTONOMIA

Andreia Lopes

Jéssica Gomes Lopes

Eliana Moreira Nunes Garcia

Fabricia Maria Milanezi

Essa pesquisa buscou contextualizar o processo de desligamento de adolescentes institucionalizados. Mais especificamente, objetivou-se analisar em que medida as ações promovidas pelos serviços de acolhimento institucional contribuem para que os adolescentes que se encontram em processo de desligamento, devido à aproximação da maioridade, estejam preparados para a vida fora do acolhimento institucional, tendo condições de conduzir a própria vida com autonomia. Constitui-se de uma pesquisa descritiva com característica de abordagem qualitativa, realizada por meio de pesquisa bibliográfica, além de consulta em materiais publicados: livros, artigos, materiais disponíveis na internet, e também Relatórios Anuais de Gestão (2013 a 2016) de uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes da Região Metropolitana de Vitória/ES, entre outros materiais. O estudo revelou que as ações desenvolvidas pelas instituições de acolhimentos estão de acordo com o que preconizam as legislações vigentes. As instituições oferecem acesso à educação, à convivência comunitária, participação em cursos de formação profissional e em programas de adolescente aprendiz, contudo, os adolescentes frente ao desligamento não estão totalmente amparados pelas políticas públicas existentes, pois nem sempre, estas garantem aos adolescentes a conquista da autonomia quando da maioridade.

Palavra-chave: Adolescente. Acolhimento institucional. Maioridade. Autonomia.

[ECE011] INCLUSÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DA GRANDE VITÓRIA NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL

Cristiane dos Santos Toreta

Kelly Aparecida Oliveira dos Santos

César Albenes de Mendonça Cruz

Angela Maria Caulyt Santos da Silva

Marcélia Retz

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de inserção dos egressos do sistema prisional no mercado de trabalho formal que são atendidos no Escritório Social da Secretária de Estado da Justiça (SEJUS) localizado em Vitória/ES. Conhecendo as legislações existentes que os amparam, como a Lei de Execução Penal e o projeto “Escritório Social”, que visa reintegração social para àqueles que cumpriram pena restritiva de liberdade, diagnosticando quais são as suas carências, necessidades e compreender os meios que o Governo do Espírito Santo oferece para viabilizar a reintegração social por meio do trabalho. Portanto, considerando a categoria trabalho como determinante na vida humana ao longo da história, torna-se necessário pensar o âmbito do trabalho e sua representatividade, sobretudo de pessoas que passaram pelo sistema prisional, uma vez que a sociedade reconhece o sujeito pelo trabalho que exerce no meio social. Através deste estudo foi possível verificar as dificuldades que o egresso encontra para se inserir no mercado de trabalho e a sua efetivação, tendo em consideração a complexidade que consiste na subjetividade desses indivíduos e/ou pelas falhas que a política possui, entre elas a falta de efetivação do cumprimento das leis e a fiscalização daquelas que são inerentes ao Estado. Quanto a metodologia adotada, utilizou-se um estudo qualitativo, e os procedimentos utilizados foi a pesquisa bibliográfica exploratório e descritiva.

Palavra-Chave: Egresso Prisional. Mercado de Trabalho Formal. Escritório Social. Reintegração Social.

[ECE012] AS MÃES DA APAE: DESAFIOS ENFRENTADOS COM A CHEGADA DOS (AS)
FILHOS (AS) COM DEFICIÊNCIA

Eliane Coutinho Silva

Jessica de Oliveira Rosa

Rosângela Maria Marineli Januthe

Leyla Márcia Kill

Gláucia Salles Xavier

Rayany Mathias da Silva

Essa pesquisa de campo, qualitativa, de natureza descritiva e exploratória realizada com 10 mães dos usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cariacica, visou abordar os desafios enfrentados pelas mães e/ou famílias com a chegada dos (as) filhos (as) com deficiência, bem como o tratamento dado a esta questão tanto pela sociedade quanto pelo Estado ao longo da história. Procurou-se discorrer sobre o trabalho do assistente social na referida instituição e sobre quais foram as políticas públicas desenvolvidas no Brasil que asseguram os direitos sociais a esta parte da população. A exemplo disso, temos os artigos 203, 227, 244 da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outras legislações. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o processo vivenciado pelas mães da APAE com a chegada dos (as) filhos (as) com deficiência. Como objetivo específico, buscou identificar os desafios enfrentados no cuidado da pessoa com deficiência e apresentar algumas políticas públicas desenvolvidas para esta parte da população. Após a análise dos dados coletados, foi constatado que 80% das mães entrevistadas encontram-se sozinhas no cuidado do (a) seu (a) filho (a) e que uma das maiores dificuldades enfrentadas é a locomoção dessa camada social em vias públicas. Por fim, essas genitoras afirmam que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é de extrema importância no processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência.

Palavra-chave: Deficiência. Desafios. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Serviço Social. Políticas Públicas.

Aline Anizio Lopes

Rosieni Ott Kruger Chinad

Raquel de Matos Lopes Gentilli

Maria de Fátima dos Santos Nacari

Danielle Érica da Silva Laudino

Adoção é um processo jurídico pelo qual uma criança ou adolescente é inserido, na qualidade de filho, em uma família não-biológica. Refere-se à adoção tardia, quando esta ocorre com crianças em idade superior a 6 anos de idade e adolescentes. Objetivos: Analisar as expectativas de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade disponíveis para adoção e as expectativas de famílias em processo de adoção. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, possibilitado pela inserção institucional de pesquisadoras, que também foram estagiárias da Instituição. O processo de pesquisa, realizado ao longo de 18 meses contou com os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa documental, acessados pelo banco de dados do Sistema de Informação e Gerenciamento de Acolhimento e Adoção, entrevistas semi-estruturadas e grupo focal, realizado com crianças e adolescentes e postulantes. Resultados: Observou-se que os postulantes à adoção raramente possuem expectativas de adotar adolescentes e crianças maiores de 6 anos, com problema graves de saúde e afrodescendentes. Em relação às expectativas dos indivíduos em processo de adoção, constatou-se que as expectativas variam de acordo com a idade e com as experiências de rejeição anteriores. Conclusão: A pesquisa confirmou o predomínio do desejo de adoção de crianças na primeira infância, apesar de existirem algumas adoções tardias, indicando a existência de uma sociabilidade que consagra uma visão dos postulantes à adoção, de demandarem adoção crianças pequenas, solidificando situações de violações de direitos crianças e adolescentes no âmbito social, emocional e afetivo.

Palavra-chave: Adoção Tardia. Criança e Adolescente. Acolhimento Institucional.

[ECE014] A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MERCADO DO TRABALHO: A EXPERIÊNCIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NAS APAES DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA

Ágata da Silva Firmino

Fabiana Breda Gomes

Maria Cirlene Caser

Glauca Salles Xavier

Sebastião Gonçalves de Barros Neto

Este artigo faz uma reflexão acerca do processo de trabalho dos assistentes sociais das APAES, da Região Metropolitana de Vitória, na inclusão da pessoa com deficiência intelectual (PCDI) no mercado de trabalho. Buscou identificar os serviços oferecidos, possibilidades e desafios encontrados pelos assistentes sociais no desenvolvimento de sua prática cotidiana. Tratou-se de pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevistas, com roteiro semiestruturado de perguntas fechadas e abertas, com as assistentes sociais. As informações foram coletadas em caráter confidencial, assegurando privacidade, sigilo e proteção à identidade dos participantes, tendo para isso utilizado nomes fictícios de flores para os 08 (oito) participantes da pesquisa. O estudo revelou que numa sociedade regida pelo sistema capitalista, apesar das legislações existentes, a inclusão das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho encontra barreiras e que estas se constituem em desafios a serem enfrentados pelos assistentes sociais inseridos nesses espaços sócios ocupacionais. O trabalho do assistente social enfrenta mudanças e demandam uma visão crítica, que possibilite enfrentar os desafios postos nas instituições, dessa forma, cabe aos assistentes sociais inseridos nas instituições, conhecer a realidade social, buscando estratégias para propor e efetivar ações profissionais que viabilizem os espaços de inserção das PCDI no mercado de trabalho, como um direito social inerente ao homem, como condição primeira para sua sociabilidade.

Palavra-chave: Serviço Social, mercado de trabalho e pessoa com deficiência.

[ECE015] TRATAMENTO DE SÍFILIS RECENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Fábio Lucas Bassini e Silva

Raphael Benevenuto

Vinícius Laporti do Nascimento

Diana de Oliveira Frauches

Maria das Graças Silva Mattêde

Vanessa Pereira Gaigher

Introdução: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela espiroqueta *Treponema pallidum*. O não tratamento oportuno tem graves consequências. Embora a penicilina G benzatina seja o antibiótico de escolha, há atualmente escassez desse medicamento. **Objetivo:** Verificar, segundo a literatura recente, quais as opções terapêuticas para sífilis recente. **Métodos:** Revisão sistemática de literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, com publicações de 2007 a 2017. Para minimizar o risco de vieses, foram utilizadas recomendações do Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, do sistema GRADE e do PRISMA. **Discussão e resultados:** O tratamento de sífilis recente pode ser realizado de diversas maneiras. Entre elas pode-se citar a penicilina G benzatina, amoxicilina associada a probenecida, azitromicina, ceftriaxone, minociclina e doxiciclina/tetraciclina. As opções terapêuticas apresentam boa efetividade e tolerabilidade em relação à penicilina G benzatina e podem ser empregadas como alternativa, exceto em gestantes, nas quais o padrão-ouro ainda é a penicilina G benzatina. **Conclusão:** Penicilina G benzatina permanece o medicamento de escolha para tratamento da sífilis recente. As evidências obtidas não permitem indicar, quando não disponível penicilina G benzatina, um método preferencial de tratamento para sífilis recente. A escolha deve ser individualizada, analisando fatores como adesão, custo e perfil de resistência conhecida na região do paciente. É necessário a realização de mais estudos que verifiquem a efetividade das terapias alternativas à penicilina G benzatina.

Palavra-chave: Sífilis. Terapêutica. Antibacterianos. Esquema de Medicação.

[ECE016] TRATAMENTO DE SÍFILIS RECENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Alice Bravim Fernandes Moça

Juliana Maria Mendonça Do Amaral Lages

Larissa Cecato Delunardo

Regina Célia Tonini

Moacir Soprani

A Tuberculose é uma infecção crônica causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, prevalente no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Sua forma de acometimento mais comum é a pulmonar, apesar de ter potencial de causar doença em diversos sítios do organismo. A forma laríngea é raramente encontrada isolada, mas apresenta alta patogenicidade e infectividade. Portanto, é fundamental que essa patologia seja considerada no diagnóstico diferencial das doenças da laringe, principalmente em pacientes imunossuprimidos. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver discussões pertinentes à sua epidemiologia, quadro clínico, diagnósticos diferenciais e tratamento acerca desse tema.

Palavra-chave: Tuberculose laríngea. *Mycobacterium tuberculosis*. Diagnóstico.

[ECE017] SÍNDROME DE MCCUNE-ALBRIGHT: REVISÃO DE LITERATURA

Eduardo Littig Neto

Rubens Littig Mariano

Chárbel Jacob Junior

Regina Célia Tonini

Marcus Alexandre Novo Brazolino

A Síndrome de McCune-Albright é uma condição rara causada por uma mutação na fase de desenvolvimento embrionário. As principais glândulas endócrinas do corpo podem carregar essa mutação, conferindo secreção autônoma às mesmas. Apesar do fato de que qualquer tecido pode ser afetado, há certa preferência pelos ossos, pele e gônadas, assim descritas na tríade clássica da doença. Sua prevalência é incerta, estimada entre 1/100.000 e 1/1.000.000, e mesmo com a carência de dados epidemiológicos melhores, a doença pode ser considerada rara. Suas manifestações clínicas incluem fraturas e deformidades ósseas, causadas pelas lesões displásicas típicas da síndrome, manchas café-au-lait na pele e presença de puberdade precoce, além de outras endocrinopatias. Quanto ao diagnóstico, os achados clínicos são soberanos. Testes laboratoriais podem ajudar a detectar afecções glandulares, e os exames de imagem são importantes para avaliação e acompanhamento das alterações ósseas. Quando há dúvidas nos exames de imagem, a biópsia de lesão óssea se mostra eficaz. Por fim, existem testes genéticos específicos, porém são de difícil acesso e não são necessários para diagnóstico e conduta. O tratamento da síndrome baseia-se na correção e controle dos achados mais comuns. Nenhum tratamento é considerado modificador da história natural da doença, e essa é uma das principais questões que as novas pesquisas visam solucionar. Este trabalho apresenta uma reunião de informações a respeito dessa patologia, organizada na forma de uma revisão bibliográfica, que visa contribuir para fomentar novas pesquisas sobre o tema e para o aumento do acesso ao que já é conhecido. A Síndrome de McCune-Albright possui, então, um caráter multidisciplinar e ainda carece de novos estudos para o aperfeiçoamento do manejo dos pacientes e para a promoção de qualidade de vida aos mesmos. **Palavra-chave:** Síndrome de Albright-McCune. Displasia Fibrosa Poliostótica. Manchas Café-au-lait.

[ECE018] - ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA, SOCIOECONÔMICA E A SATISFAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA.

Bruno Dian Gandra
Herbert Felipe Heimbeck
Isadora Luiz Pereira
Bruno De Freitas Valbon
Alessandra Tieppo
Felipe Garcia Moreira

OBJETIVOS: Analisar o perfil epidemiológico, socioeconômico, a satisfação e percepção/educação da saúde ocular dos pacientes submetidos à cirurgia de catarata no Hospital Universitário Santa Casa de Misericórdia de Vitória. **MÉTODOS:** Estudo observacional, com amostra formada por 114 pacientes, atendidos no Ambulatório de Oftalmologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV). Entre janeiro e dezembro de 2016. Recrutados aleatoriamente. **RESULTADOS:** A média de idade foi de 67,3 anos, e a raça branca foi responsável por 80,7% dos casos. 66,7% eram provenientes da região Metropolitana e em relação ao grau de instrução, a maioria (65,8%) apresentou até 8 anos de estudo. Em relação a atividade ocupacional 47,4% eram aposentados e a renda mensal individual, 59,6% ganhavam até um salário. 45,6% dos pacientes tiveram acesso ao serviço encaminhados pela Unidade Básica de Saúde e 8,8% tiveram acesso ao serviço por meio da ajuda interna de funcionários do hospital. 25,4% alegaram o tempo de espera como a maior dificuldade, 20,2% a distância de casa. **CONCLUSÃO:** A população atendida não tem acesso rápido a primeira consulta com oftalmologista nem a cirurgia de catarata, resultando em baixa acuidade visual, tornando necessária a busca por meios de facilitar o acesso ao especialista, visando diminuir o tempo de espera, as dificuldades e os malefícios causados pela patologia. Tratando-se de uma população economicamente carente, com baixa acuidade visual, baixo nível de instrução, que depende unicamente do serviço público de saúde em sua grande maioria, a existência de algumas formas irregulares de acesso ao serviço acarretam uma maior dificuldade de acesso para os pacientes com real necessidade, e

aumentam o tempo de espera das pessoas que estão na fila para a primeira consulta ou para a realização do procedimento cirúrgico no serviço de especialidade.

Palavra-chave: Catarata; cirurgia; visão.

[ECE019] - OS VÍNCULOS DE TRABALHO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E A LONGITUDINALIDADE DO CUIDADO

Lucas Silveira Moraes

Nuno Bressanelli

Diana De Oliveira Frauches

Denise Rozindo Bourguignon

Marcio De Oliveira Almeida

Objetivo: Discutir a distribuição dos vínculos de trabalho médico transitório na atenção primária à saúde no Espírito Santo. **Método:** Estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo, de dados secundários do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), referentes ao Espírito Santo, em julho de 2017. Os vínculos de trabalho médico foram classificados em transitórios e não transitórios, sendo distribuídos segundo as regiões de saúde do estado. Diferença da proporção dos tipos de vínculos entre as regiões foi investigada com o teste Qui quadrado de Pearson e com a Análise de Resíduos Ajustados, ambos ao nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Projeto de pesquisa CAAE 75595617.3.0000.5065. **Resultados:** Dos 1.677 vínculos incluídos na pesquisa, foram observados 891 vínculos transitórios (53,13%) e 786 não transitórios (46,87%), com associação dos vínculos transitórios às regiões de saúde Norte e Central e dos não transitórios à região Metropolitana, enquanto a região Sul não apresentou associação. **Conclusão:** O cenário atual ainda privilegia vínculos de trabalho médico transitório na atenção primária do Espírito Santo, o que é nocivo para os médicos, para o SUS e, principalmente, para a população.

Palavra-chave: Recursos Humanos em Saúde. Atenção Primária à Saúde. Relações Trabalhistas. Assistência à Saúde.

[ECE020] - AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL / CIRCUNFERÊNCIA DE PESCOÇO COMO INSTRUMENTO DE TRIAGEM DE HIPERTENSÃO EM ADOLESCENTES

Lara Martins Fiório

Ligia Sousa Santos

Marilia Moro

Gustavo Carreiro Pinasco

Patrícia Casagrande Dias De Almeida

Valmin Ramos Da Silva

Objetivo: propor uma ferramenta simples, eficaz, de baixo custo e fácil aplicabilidade para triagem de pressão arterial sistêmica (PA) alterada em adolescentes. **Método:** estudo de corte transversal de uma amostra probabilística e representativa de adolescentes, de dez – 14 anos, matriculados em escolas públicas estaduais da Região Metropolitana da Grande Vitória. Foram utilizadas as medidas de circunferência de pescoço (CP) obtidos através de fita milimetrada e a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) aferida por método oscilométrico. As relações PAS/CP e PAD/CP foram estabelecidas dividindo-se o valor absoluto da PAS ou PAD pelo valor absoluto da CP do indivíduo. Os pontos de corte ótimos para PA elevada (pré-hipertensos e hipertensos), tanto para PAS quanto para PAD, em relação a CP foram determinados a partir de Curvas ROC (Intervalo de confiança = 95%). **Resultados:** avaliaram-se 818 adolescentes (477 meninas e 341 meninos). A prevalência de PA alterada foi 27,1% e a de CP alterada foi 23,8%. O ponto de corte ótimo para definição de PA alterada foi 3,81 para PAS/CP e 2,15 para PAD/CP. O ponto de corte para PAS/CP foi 3,83 em meninos e 3,81 em meninas e, para PAD/CP foi 2,10 em meninos e 2,22 em meninas. A área sob a curva (AUC) da PAS/CP e PAD/CP em diagnosticar PA elevada foram respectivamente 0,86 e 0,75.

Conclusão: a relação pressão arterial/circunferência de pescoço (PA/CP) mostrou-se uma ferramenta eficaz e prática na triagem de PA alterada na faixa etária avaliada (dez a 14 anos).

Palavra-chave: Hipertensão; Circunferência de Pescoço; Adolescentes.

Lucas Santos Bravin

Marcele Henriques Lougon

José Antônio Fiorot Junior

Maria Das Graças Silva Mattede

Lelian De Lacerda Montezi

A síndrome de POEMS é uma entidade clínica rara, de acometimento sistêmico e desenvolvimento indolente. Consiste na presença concomitante de polineuropatia periférica, organomegalias, endocrinopatias, desordem monoclonal de plasmócitos, e alterações cutâneas, sendo a idade média dos pacientes com a síndrome de 50 anos e mais prevalente em homens (63%). Devido ao acometimento sistêmico e a diversidade de manifestações clínicas é fundamental o acompanhamento médico multiprofissional visando melhor otimização do tratamento. Para ampliar o conhecimento sobre o assunto idealizou-se uma revisão de literatura descritiva dos aspectos clínicos, critérios diagnósticos e tratamento da síndrome de POEMS. Estudo qualitativo, descritivo, em bases de dados como *Pubmed*, LILACS, SciELO, BIREME e Biblioteca Virtual da Saúde. A fisiopatologia da síndrome não está completamente estabelecida, mas estudos mostram relação da doença com aumento dos níveis séricos de citocinas. O tratamento padrão parcialmente indefinido, mas com opções terapêuticas, dentre eles corticosteroides, radioterapia, quimioterapia e transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas. O tratamento recente mais promissor tem sido o bevacizumab, um anti-VEGF que também pode ser utilizado como um marcador de resposta terapêutica. O bortezomib em baixas doses, associado a ciclofosfamida e dexametasona, tem sido uma nova opção terapêutica para pacientes com intolerâncias ou contraindicações à outras terapias. A ampliação do conhecimento médico no que diz respeito ao reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, estabelecimento do diagnóstico diferencial e tratamento adequado da síndrome de POEMS são relevantes para o prognóstico do paciente e continuação de estudos futuros.

Palavra-chave: Síndrome. POEMS. Polineuropatia. Gamopatia monoclonal.

[ECE022] - DOENÇA DE CROHN PERIANAL: REVISÃO DE LITERATURA

Lohana Soares Figueiredo

Natália Abrantes Grossi

Fabiano Quarto

Bruna Rodrigues Brandolini

Ana Paula Hamer Sousa Clara

As manifestações anais e perianais da doença de Crohn são muito comuns e o comprometimento dessa região pode se manifestar bastante acentuado e debilitante. O comprometimento perianal apresenta-se frequentemente com abscessos e fístulas, que costumam ser múltiplas, complexas e recorrentes. Esta revisão apresenta a anatomia do esfíncter anal necessária para o atendimento desta patologia, métodos de imagem, classificação e tratamento. Os novos tratamentos para a doença de Crohn perianal estão agora disponíveis e têm a promessa de controlar melhor a sepse e manter a continência fecal. As diferentes modalidades de tratamento são selecionadas com base na anatomia da fístula, nas características do paciente e nos objetivos de manejo (controle de fechamento ou de sepse).

Palavra-chave: Doença de Crohn. Fístulas perianais. Incidência. Diagnóstico. Tratamento.

[ECE023] - DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO PRECEDENDO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: RELATO DE CASO CLÍNICO.

Caio Guimarães Araújo

Thaís Pires Silva Pereira

Moacir Soprani

Regina Célia Tonini

Raquel Altoé

Valquiria Dinis

Carolina Zorzanelli Costa

Objetivo: Revisar a literatura dando ênfase na importância do seguimento da doença de Kikuchi-Fujimoto e descrever a história, o diagnóstico e o tratamento dessa enfermidade a partir de um relato de caso de uma paciente atendida no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória – ES. **Método:** Consulta de prontuário informatizado e revisão bibliográfica, na qual foram consultadas as seguintes bases de dados: PubMed, MEDLINE e SciELO, sendo selecionados artigos publicados entre os anos de 1972 e 2014. **Resultado:** Relatamos o caso de uma mulher de 26 anos, que deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória por apresentar, há 40 dias, os seguintes sinais e sintomas: mialgia, poliartralgia, febre não aferida, náuseas, vômitos e lesões descamativas e pruriginosas difusas. Antes da admissão nesse hospital, a paciente esteve internada em outro serviço hospitalar com quadro de anasarca, linfadenopatia generalizada e bicitopenia. O quadro clínico evoluiu com trombose venosa profunda em membro superior direito, que complicou com tromboembolismo pulmonar, sendo iniciado anticoagulação plena. Também evoluiu com piora da função renal e com nodulação endurecida e dolorosa em região glútea esquerda. Paciente foi transferida para o Hospital Santa casa de Misericórdia, onde foi admitida com insuficiência renal aguda, manutenção da trombose venosa profunda e celulite em membro superior direito, anasarca, linfadenopatia generalizada e abscesso em região glútea esquerda. Submetida à drenagem da coleção, que revelou saída de secreção hemática. Biópsia excisional do gânglio axilar esquerdo demonstrou hiperplasia linfocítica atípica.

Imunohistoquímica foi solicitada para confirmação diagnóstica. Após melhora clínica, a paciente recebeu alta hospitalar e foi encaminhada para acompanhamento clínico ambulatorial. O resultado do exame imunohistoquímico apresentado na consulta ambulatorial confirmou doença de Kikuchi-Fujimoto. Após um semestre de remissão da doença, paciente apresentou critérios suficientes para que fosse realizado o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico.

Palavra-chave: Linfadenite histiocítica necrosante. Linfadenite. Lúpus Eritematoso Sistêmico.

[ECE024] - ANÁLISE DE EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA DO *Streptococcus pneumoniae* AOS BETA - LACTÂMICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

Caio Santiago Ferreira Coelho

Yuri Duarte Polyacove

Maria Das Graças Silva Mattede

Henrique Tommasi Neto

Firmino Braga Neto

Introdução: Infecções por *Streptococcus pneumoniae* são prevalentes na população, e por vezes são causadas por cepas com resistências a antibióticos, assim se faz necessário o diagnóstico precoce e tomada de conduta correta por parte do médico. **Objetivo:** Verificar, segundo a literatura, qual o mecanismo de resistência do pneumococo aos antibióticos beta - lactâmicos, e quais as opções terapêuticas adequadas frente à resistência desse patógeno. **Metodologia:** Revisão de literatura descritiva utilizando trabalhos científicos das bases de dados da área da saúde, informações científicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, *Centers for Disease Control and Prevention* e livros textos. **Revisão da literatura:** O mecanismo de resistência do pneumococo aos beta-lactâmicos é a mudança do alvo de ligação da droga, o que pode ocorrer a partir de mutação genética ou aquisição do material genético de outros *Streptococcus spp.*, formando assim uma resistência heterogênea. Dessa forma, na suspeição de resistência,

a cultura de material biológico deve ser feita, para determinar a concentração inibitória mínima e por consequência o padrão de resistência do patógeno. Essas informações, quadro clínico e história patológica pregressa do paciente, colaboram para o médico escolher o antimicrobiano adequado. **Considerações finais:** A resistência do *S. pneumoniae* à beta - lactâmicos tornou-se uma realidade, principalmente a partir da década dos anos noventa. Mas, ainda assim, essa classe de medicamento é considerada de escolha no manejo inicial de infecções pneumocócicas. Deve-se atentar a possibilidade de resistência e falha terapêutica, principalmente nos casos de doença invasiva.

Palavra-chave: *Streptococcus pneumoniae*. Antibacterianos. Penicilinas. Cefalosporinas.

[ECE025] - Distrofia Muscular de Duchenne: Relato de Caso e Revisão Bibliográfica

Gabriel Ferri Baltazar

Isabela Bittencourt Coutinho Lopes

Lucas Santos Bravin

Maria Angélica Santos Novaes

Rosana Arpini Pagung

José Carlos Novaes

Descrita pela primeira vez em 1858 pelo neurologista francês, Guillaume Duchenne, a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma patologia decorrente de alterações na síntese de distrofina em função de mutações genéticas, podendo levar à quebra da fita de leitura ou *stop codon* prematuro através de deleções, inserções ou duplicações. Em dois terços dos casos, tais mutações são herdadas da mãe, portadora assintomática, enquanto no terço restante é decorrente de mutação nova. Relata-se um caso de um paciente de 12 anos, com diagnóstico de DMD realizado aos 6 anos e 9 meses de idade, apresentando achados físicos exuberantes como hipertrofia de panturrilha, marcha escarvante, sinal de Gowers e fraqueza muscular proximal, entre outros. Além disso, apresentava dosagens de creatinoquinase elevada, biópsia muscular e estudo genético compatível. Com base nesse relato, são comentados aspectos de tratamento não farmacológicos e farmacológicos habituais, bem como novas abordagens terapêuticas através de revisão bibliográfica da literatura atual.

Palavra-chave: Distrofia Muscular de Duchenne; Distrofina; Células musculares esqueléticas.

[ECE026] TROMBOFLEBITE FÚNGICA DO SEIO CAVERNOSO: ASPECTOS ANATÔMICOS, CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS

Antonio Francisco Loss Possatti

Douglas Gonçalves Bento

Lucas Loss Possatti

Henrique Farias Ramos

Hildegardo Rodrigues

Objetivo: Descrever um caso raro de tromboflebite fúngica do seio cavernoso secundário a mucormicose rinocerebral, com ênfase nas manifestações clínicas, descrições radiológicas e ressaltando a importância do conhecimento anatômico.

Método: Estudo do tipo relato de caso com revisão de literatura. Informações obtidas em prontuário, exames e entrevista com o paciente. Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, número 1.865.033. **Relato de caso:** Relatamos caso de um homem, 54 anos, com diagnóstico definido após resultado do histopatológico de mucormicose rinocerebral complicada com tromboflebite fúngica do seio cavernoso direito. O paciente recebeu tratamento para doença de base, com remoção do foco infeccioso primário e anfotericina B. A tromboflebite fúngica do seio cavernoso é uma enfermidade rara, de prognóstico ruim e muitas vezes fatal quando diagnosticada tardiamente. O diagnóstico e tratamento precoce dessa doença, quando instituído, melhora a probabilidade de sobrevivência do doente.

Palavra-chave: Mucormicose. Tromboflebite. Seio cavernoso. Rinossinusite fúngica invasiva. Sinusite fúngica.

[ECE027] TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Carolina De Melo

Jéssica Peroni Custódio

Rafaella De Nadai

Felipe Bertollo Ferreira

Ana Paula Hamer Sousa Clara

Maria Das Graças Silva Mattede

Introdução: A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma condição de alta prevalência e com um efeito significativo na qualidade de vida da população. É uma doença de etiologia multifatorial, incluindo alterações no eixo cérebro-intestino e na motilidade intestinal, porém, ainda não foi completamente elucidada. Dados recentes apontam sobre uma relação importante da disbiose intestinal na patogênese da SII. O transplante de microbiota fecal (TMF) tem a condição de reestabelecer a homeostase intestinal.

Objetivos: Este trabalho objetiva a revisão de publicações científicas que associam o uso do TMF no tratamento da SII, para a posterior análise de sua eficácia terapêutica.

Metodologia: A busca literária foi realizada no acervo MEDLINE, através do PubMed, onde angariamos 120 artigos. Através de critérios de inclusão e exclusão sobraram 9 publicações que foram analisadas. **Resultados:** A partir da análise dos estudos, um total de 91 pacientes foram avaliados. O tratamento revelou melhora sintomática em 85.71% dos casos. As diferenças entre os 9 estudos inclusos devem ser levadas em consideração.

Não houve homogeneidade entre modelos, vias e uso do antibiótico pré-TMF.

Conclusão: O TMF se mostrou eficaz no tratamento da SII, porém são necessários estudos clínicos com maior impacto científico para concretizar esta nova modalidade terapêutica.

.

Palavra-chave: “Síndrome do Intestino Irritável”, “Transplante de Microbiota Fecal” e “Microbiota Intestinal”.

[ECE028] - DELIRIUM PÓS-OPERATÓRIO EM PESSOAS IDOSAS: FREQUÊNCIA, FATORES ASSOCIADOS E INFLUÊNCIA NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR.

Mayne Santiago Brandão

Nicole Souza Henriques

Thiago Lobato Sordine

Renato Lirio Morelato

Larissa Brimbato

Alessandra Tieppo

OBJETIVOS: Estudar a frequência, fatores de risco e influência no período de permanência hospitalar de *Delirium* pós-operatório em pacientes idosos submetidos a cirurgias eletivas não cardíacas. **MÉTODOS:** Estudo do tipo transversal, observacional, de pessoas idosas (65 anos ou mais de idade) internadas para realização de cirurgia eletiva não cardíaca no Hospital filantrópico universitário. Durante o período pré-operatório imediato foram avaliados os fatores de risco (variáveis independentes): idade, gênero, cognição (MiniCog), funcionalidade (Katz e Time up and go), fármacos e aspectos clínicos. O desfecho (variável dependente) foi avaliado no pós-operatório imediato (até 72 horas), através do CAM (*Confusion Assesment Method*). Realizamos estatística descritiva, qui quadrado e t de student para amostras independentes. **RESULTADOS:** Oitenta e três pacientes foram incluídos na pesquisa, sendo 44,6% (37) de cirurgia ortopédica, 41 % (34) cirurgia geral, 13,3% (11) cirurgia urológica, e um paciente (1,2%) de outra cirurgia não relacionada. Predominou o sexo masculino (53%) com idade média de 73 anos (65-95 anos). Oito pacientes (9,6%) apresentaram *Delirium* pós-operatório; cinco do tipo hiperativo (6%), dois hipoativo (2,4%) e um misto (1,2%). Os pacientes com delirium eram mais idosos ($p = 0,02$), com maior declínio cognitivo ($p = 0,01$), portadores de anemia ($p = 0,04$) e prolongamento na permanência hospitalar ($p = 0,001$). **CONCLUSÃO:** Observamos *Delirium* pós-operatório acometendo os mais idosos, com declínio cognitivo e portadores de anemia; com aumento da permanência hospitalar. Demonstrando a importância da avaliação abrangente no período pré-operatório para prevenção de *Delirium*.

Palavra-chave: *Delirium*; período pós-operatório; assistência ao idoso.

[ECE029] ABORDAGEM CIRÚRGICA COM INTENÇÃO CURATIVA NO ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Daniel Alves Loureiro

Eron Machado Cobe

Claudio Medina Da Fonseca

Lara Kneipp Costa Rossi

Atualmente nos EUA, o câncer pancreático ocupa o terceiro lugar nas causas de morte relacionada ao câncer, sendo a maioria, cerca de 90%, do tipo adenocarcinoma ductal pancreático. Destes, mais de dois terços estão localizados na cabeça do pâncreas. O câncer pancreático é uma das neoplasias mais agressivas e de difícil tratamento, apresentando uma sobrevida média de seis meses após o diagnóstico e uma sobrevida em 5 anos de 5 a 7%. Isso se deve principalmente à sua biologia molecular agressiva, apresentando rápida progressão e ao diagnóstico tardio da malignidade, que ocorre na maioria dos casos. A única opção curativa para o adenocarcinoma ductal pancreático é a ressecção cirúrgica, entretanto, menos de 20% dos paciente ao serem diagnosticados são candidatos a cirurgia. Essa era associada a uma mortalidade perioperatória significativa, entretanto, com os avanços das técnicas cirúrgicas e cuidados perioperatórios, a mortalidade vem caindo em centros com grande volume de cirurgias. Tendo isso em vista, o trabalho pretende informar tanto ao clínico quanto o cirurgião sobre a doença, para que o diagnóstico seja realizado o mais precocemente possível e quando houver a possibilidade, abordada cirurgicamente da melhor forma possível. Foi realizada uma revisão de literatura sobre a abordagem cirúrgica com intenção curativa do adenocarcinoma ductal de cabeça de pâncreas usando artigos encontrados no scielo, pubmed e clinicalkey.

Palavra-chave: Neoplasias pancreáticas, pancreatoduodenectomia, carcinoma ductal pancreático

[ECE030] - ACNE NA MULHER ADULTA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Anna Caroliny Da Silva Mantovani

Marcus Vinicius Oliveira Nogueira

Nayane Frozi Caiado

Karina Demoner De Abreu

Cristine Aparecida Mendes

Lia Quintaes Cardoso Santa Clara

A acne vulgar é uma dermatose inflamatória crônica que acomete a unidade pilossebácea. Na mulher adulta é definida quando há surgimento ou persistência das lesões acneicas após os 25 anos de idade. Sua patogênese é complexa, envolvendo os androgênios circulantes, estando presente o hiperandrogenismo periférico ou a hipersensibilidade terminal da unidade pilossebácea. Seu arsenal terapêutico inclui o tratamento da acne vulgar, mas também terapias hormonais, antiandrogênicas, entre outras.

Palavra-chave: acne; mulher; *Propionibacterium acnes*; hiperandrogenismo.

[ECE031] - SÍNDROME DE *BURNOUT* EM MÉDICOS BRASILEIROS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Henrique Novaes Rodrigues

Henrique Rodrigues Da Silva Dalzini

Thiago Dalleprane Cavalcante

Denise Rozindo Bourguignon

André Carnevali Da Silva

Henrique César Pontini De Castro Alves

Objetivo: Realizar uma análise da literatura nacional e internacional relativa à Síndrome de *Burnout* em médicos brasileiros. **Métodos:** Trata-se de um estudo do tipo revisão narrativa de literatura com utilização da base literária de dados. Como critérios de inclusão: médicos de qualquer especialidade em sua rotina de trabalho no Brasil. Adotou-se como critério de exclusão: artigos de revisão de literatura, relatos de caso e metanálises, assim como artigos que não se tornam pertinentes ao estudo desenvolvido. A amostra foi composta de 15 trabalhos com seus resultados demonstrados também através de tabelas. **Resultados:** A

caracterização da Síndrome de *Burnout* foi feita utilizando o questionário *Maslach Burnout Inventory* em 14 dos 15 artigos estudados (93,3%). Em relação à exaustão emocional, os artigos abordados trouxeram valores percentuais de níveis elevados, no intervalo de 23,1% a 69,1% (mediana de 47,5%), em relação à despersonalização os artigos abordados trouxeram valores percentuais de níveis alterados no intervalo de 24,2% a 96,1% (mediana de 31,8%), em relação à realização profissional os artigos abordados trouxeram valores percentuais de níveis alterados, no intervalo de 11,8% a 94,6% (mediana de 28,3%). O ambiente de trabalho se demonstrou predominantemente hospitalar, tendo todos artigos analisado profissionais que trabalham nestes locais. Tratando-se do gênero, sete estudos (46,6%) demonstraram prevalência do sexo feminino na amostra e oito estudos (53,3%) demonstraram prevalência do sexo masculino. **Conclusão:** A Síndrome de *Burnout* possui elevada prevalência entre os médicos brasileiros nos estudos publicados, em suas três dimensões, acometendo heterogeneamente nas diferentes especialidades. As

estratégias positivas de enfrentamento e prevenção das tensões decorrentes do trabalho devem ser estimuladas a fim de melhorar as perspectivas de saúde no cotidiano laboral do médico.

Palavra-chave: Médicos brasileiros. Síndrome de *Burnout*. Estresse ocupacional.

[ECE032] - AVALIAÇÃO DO USO DA RAZÃO CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA POR ESTATURA COMO PREDITORA DE EXCESSO DE PESO NA ADOLESCÊNCIA

Marina Bento Alves Vasconcellos

Rebeca Silva Moreira Da Fraga

Gustavo Carreiro Pinasco

Valmin Ramos Da Silva

Janine Pereira Da Silva

Objetivo: Obter pontos de corte da razão circunferência de cintura / estatura (CCE) para predição de sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares e avaliar utilidade diante das variantes sexo, idade e estadiamento puberal. **Métodos:** Estudo transversal, descritivo, quantitativo, com 818 adolescentes de dez a 14 anos, de escolas públicas. Avaliados por profissionais treinados quanto ao peso, estatura e circunferência abdominal. Estadiamento puberal foi autodeclarado, de acordo com classificação de Tanner. Criadas curvas Receiver Operating Characteristic Curve para uso de CCE no diagnóstico de sobrepeso, obesidade e obesidade para cada sexo. Os testes de Kruskal-Wallis e U de Mann-Whitney foram utilizados. Foi usado intervalo de confiança de 5%. **Resultados:** Os valores de corte preditores de sobrepeso e obesidade geral foram respectivamente 0,46 [área abaixo da curva (AUC)=0,956] e 0,51 (AUC=0,980). Obesidade específica para meninas e meninos foi respectivamente 0,51 (AUC=0,974) e 0,52 (AUC=0,943). CCE ($p=0,33$) e índice de massa corporal ($p<0,001$) variaram com a idade. Não houve diferença considerando sexos ($p=0,276$) ou estadiamento puberal para meninos ($p=0,208$) e meninas ($p=0,052$). **Conclusão:** CCE é útil para rastreamento de excesso de peso na adolescência. Apesar da variação entre faixas etárias, adotando valor único de 0,5 obtém-se altas taxas de sensibilidade e especificidade. Além disso,

não necessita do uso de tabelas ou gráficos para sua interpretação, independe do sexo ou estadiamento puberal, e dispensa uso de balança, o que facilita seu uso por profissionais da saúde e leigos.

Palavras-chave: Child; Adolescent; Overweight; Obesity; Waist-Height Ratio.

[ECE033] -ANÁLISE DO CONTROLE GLICÊMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE APOIO AO DIABETES INFANTIL

Karluana Nunes Endlich

Lorena Viana Magri

Marcela Ferreira Trazzi

Christina Cruz Hegner

Patrícia Casagrande Dias De Almeida

Letícia Guimarães De Souza

Renata Xavier Frechiani De Castro Bergamin

Objetivo: Avaliar o controle glicêmico de crianças e adolescentes com diabetes.

Método: Estudo observacional, descritivo do tipo retrospectivo, composto por 25 pacientes, todos com Diabetes Mellitus tipo 1, participantes do Grupo de Apoio ao Diabetes Infantil em um hospital filantrópico de Vitória, Espírito Santo. Estes foram analisados, a partir de dados obtidos de prontuários eletrônicos, em relação a idade, sexo, tempo de tratamento, resultados de glicemia em jejum e hemoglobina glicada laboratorial e foram submetidos ao teste de hemoglobina capilar para posterior análise e comparação. **Resultado:** O grupo estudado, entre 3-17 anos, tem maior prevalência do sexo masculino (52%) e apresentam um tempo médio de tratamento de 5,4 anos. Em relação à glicemia em jejum, 76% dos participantes apresentaram um controle glicêmico inadequado. Em relação à hemoglobina glicada, tanto a capilar quanto a laboratorial, apenas 4% atingiram o alvo de controle. Sendo que os testes de hemoglobina glicada capilar e laboratorial não apresentaram diferença significativa quando comparados. **Conclusão:** O controle glicêmico da maioria dos participantes do estudo está inadequado.

Palavra-chave: Diabetes Mellitus. Hb A1c. Glicemia.

[ECE034] -COLITE PSEUDOMEMBRANOSA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Thalis Scuassante Bolzan

Tony Coimbra Clara

Yallana Silveira Arruda

Ana Paula Hamer Sousa Clara

Maria Das Graças Silva Mattede

Lara Kneipp Costa

O principal agente etiológico de diarreia infecciosa e colite associada a antibioticoterapia é o *Clostridium difficile*, um bacilo gram positivo anaeróbio formador de esporos e produtor de toxinas capaz de causar a colite pseudomembranosa. Pacientes que se submeteram a antibioticoterapia prévia, idosos maiores de 60 anos, indivíduos hospitalizados e imunodeprimidos são os mais acometidos. O espectro clínico varia desde portadores assintomáticos do *lostridium difficile*, até colite fulminante com falência de múltiplos órgãos e óbito. O início dos sintomas ocorre geralmente dentro de duas semanas após o fim do uso de antibióticos. O diagnóstico é baseado na combinação de sintomas clínicos além de exames de amostras fecais positivas para as toxinas do *Clostridium difficile* ou achados endoscópicos e/ou histológicos de colite pseudomembranosa. O tratamento de portadores assintomáticos não é indicado, entretanto, pacientes com infecção por *Clostridium difficile* comprovada devem receber tratamento adequado. O mesmo consiste na suspensão do antibiótico deflagrador do quadro, prevenção secundária por estratégias de controle da infecção e tratamento farmacológico específico com antibioticoterapia. A infecção por *Clostridium difficile* recorrente pode ser melhor manejada com transplante de fezes conforme guidelines atuais e casos graves podem necessitar de colectomia subtotal emergencial. Outras edidas alternativas para o tratamento ainda são motivos de debate. A mortalidade resultante da colite pseudomembranosa depende da gravidade dos sintomas, doenças subjacentes e idade do paciente.

Palavra-chave: Colite pseudomembranosa; *Clostridium difficile*; Transplante fecal.

[ECE035] TRATAMENTO CONSERVADOR DO TRAUMA FECHADO DE FÍGADO E BAÇO:
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Lucas Alves Nemer

Marcello Moro Queiroz

Mitre Kalil Junior

Mitre Kalil

Thiago Rampazzo Pancini

Guilherme Carvalhal Moitinho

Objetivo: revisar na literatura as indicações e modalidades de tratamento conservador no trauma abdominal fechado com lesões do fígado e do baço, comparando-os com o tratamento cirúrgico no que tange morbidade, mortalidade e prognóstico.

Metodologia: revisão sistemática de literatura na base de dados MEDLINE, sendo acessada via PUBMED. Foram selecionados 13 artigos publicados nos últimos cinco anos.

Resultado: o tratamento não operatório em relação ao tratamento cirúrgico no trauma hepático e esplênico contundentes possui vantagens como a diminuição de laparotomias desnecessárias não terapêuticas associada a diminuição de mortalidade, morbidade, duração do tempo de internação e menor necessidade de transfusão de hemoderivados. Procedimentos minimamente invasivos, como angioembolização, contribuíram para o aumento das taxas de sucesso do tratamento não operatório, sendo este último basicamente influenciado pela condição hemodinâmica do paciente. Os graus de lesões hepática e esplênica além da presença de lesões abdominais associadas também definem a conduta do tratamento não operatório. Graus avançados de lesões no fígado e baço requerem avaliação criteriosa em relação ao uso de angioembolização ou tratamento cirúrgico, sendo o tratamento não operatório também passível de escolha em lesões mais graves. **Conclusão:** o manejo não-operatório do trauma hepático e esplênico em pacientes hemodinamicamente estáveis é o tratamento de escolha, comprovados pelos benefícios demonstrados pelos estudos avaliados.

Palavra-chave: tratamento não-operatório. Lesão hepática contusa. Lesão esplênica contusa.

[ECE036] PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES

Mateus Oliveira Potratz

Patrícia Casagrande Dias De Almeida

Janine Pereira Da Silva

Christina Cruz Hegner

Objetivo: Identificar a prevalência de síndrome metabólica em adolescentes com excesso de peso. **Método:** Estudo epidemiológico, transversal, em amostra probabilística e representativa de adolescentes (dez a 14 anos) frequentadores de escolas da rede pública estadual da Região Metropolitana da Grande Vitória, ES, representados por 200 estudantes com excesso de peso. Foram obtidos peso, estatura e circunferência abdominal. Para a avaliação nutricional foi considerada o índice de massa corporal por idade, em escore z, do referencial padrão OMS. Realizada aferição da pressão arterial e coleta de 10 mL de sangue venoso, para análise da glicemia de jejum, perfil lipídico e triglicérides. Para diagnóstico de síndrome metabólica foi utilizado o critério sugerido por Cook *et al.* O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas. As informações coletadas foram organizadas em Excel. Quando necessário foram feitos análises estatísticas em métodos paramétricos ou não paramétricos. Variáveis qualitativas foram comparadas pelo teste do qui-quadrado ou pelo teste de Fisher. O nível de rejeição para a hipótese de nulidade foi estabelecido em, estabelece-se em 0,05. **Resultados:** Dos 200 adolescentes avaliados 134 tinha sobrepeso, 62 obesidade e 4 obesidade grave. Foi diagnosticado 11,5% (23/200) adolescentes com síndrome metabólica, condição associada ao excesso de peso ($p=0.000$). Entre os componentes individuais da síndrome metabólica nos adolescentes com excesso de peso identificou-se, dentre o de maior prevalência a pressão arterial sistólica aumentada (34,5%), e o de menor prevalência a glicemia de jejum aumentada (1,5%). **Conclusão:** Houve 11,5% de prevalência de síndrome metabólica entre os adolescentes com excesso de peso.

Palavra-chave: Síndrome X Metabólica, Sobrepeso, Obesidade, Adolescente.

[ECE037] INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM GESTANTES: ASPECTOS GERAIS, DIAGNÓSTICO CLÍNICO E LABORATORIAL

Arthur Diaz Marques

Paula Brambilla Loyola

O artigo analisou o financiamento da política de assistência social reconhecendo-a como política pública, dever do Estado e direito do cidadão. Constitui-se numa pesquisa qualitativa e bibliográfica, a partir de material já elaborado, extraído de livros e artigos científicos. Assistência Social se realiza de forma integrada às demais políticas setoriais considerando as desigualdades socioterritoriais visando seu enfrentamento e a garantia dos mínimos sociais. Integra o sistema de proteção social brasileiro e se organiza de forma descentralizada os serviços, programas e projetos e benefícios socioassistenciais através do Sistema Único de Assistência Social- SUAS. O financiamento da Assistência social compete aos três entes federados e necessita da existência e funcionamento do Conselho, Plano e Fundo de Assistência Social. O Fundo Público é instrumento para gestão financeira cujo componente mais evidente é o orçamento. O ciclo orçamentário é composto pelo PPA, LDO e LOA, com a participação do executivo e do legislativo. O financiamento dessa política historicamente se altera passando da lógica convenial para os Pisos e atualmente blocos de financiamento. Foram identificados alguns elementos intervenientes no financiamento da política de assistência social: o modelo de financiamento da assistência social; a insuficiência de recursos financeiros; o desequilíbrio entre os entes federados; a inexistência de percentual obrigatório e a prevalência de recursos federais para os programas de transferência de renda. O financiamento da assistência social é o que garante uma política pública de qualidade para o principal, e mais importante financiador dessa política: a população

PALAVRA-CHAVE: Assistência Social, Financiamento, Fundo Público.

Os exames laboratoriais, em grande parte depende da execução humana estando sujeita ao aparecimento de erros, o que são consequências da falta de padronização ou de cumprimento dos procedimentos da qualidade podendo determinar a emissão de laudos não compatíveis com o estado atual do paciente. No que dizem respeito à fase pré-analítica no laboratório de análises clínicas estão dentre as mais importantes para garantir a confiabilidade dos resultados. As ações executadas nesta fase refletem em todas as demais fases do processo. A fase pré-analítica não deve assumida como de menor importância porque um erro pode comprometer gravemente a qualidade nos resultados obtidos. É necessário que a fase pré-analítica apresente medidas que garantam a sua correta execução, fazendo com que as falhas sejam detectadas e imediatamente corrigidas. São diversos os processos pré-analíticos que devem ser adequadamente observados antes da realização dos exames. Estes se iniciam com a consulta médica, com uma orientação em linguagem clara quanto aos procedimentos a serem assumidos pelo paciente tais como dieta, jejum desejável, uso de medicamentos, horário da coleta, atividade física, ingestão de líquidos, tabagismo, material a ser coletado, e também, é desejável um pedido médico que seja legível e objetivo quanto ao que se pede. A fase pré-analítica merece atenção no laboratório clínico, proporcionando treinamentos constantes a sua equipe e promover a colaboração ativa do paciente, para que haja sucesso, e a diminuição de erros.

PALAVRA-CHAVE: erros laboratoriais; fase pré-analítica; erros clínicos, laboratórios.

[ECE039] A IMPORTÂNCIA DA TRIAGEM NEONATAL E DO ACONSELHAMENTO GENÉTICO COMO PREVENÇÃO DA ANEMIA FALCIFORME

Arthur Diaz Marques

Luciano Pereira do Nascimento

O Brasil possui poucas ações no campo da genética em saúde pública. Grande parte dos centros de testagem e aconselhamento genético estão localizados nos hospitais universitários, em alguns hospitais públicos dos grandes centros urbanos e nos hemocentros de referência. Geralmente as sessões de aconselhamento genético ocorrem no período neonatal para fins de diagnóstico ou de planejamento reprodutivo, ou em grandes centros de doação de sangue após a realização dos exames compulsórios pré doação. A prática do aconselhamento genético é uma novidade no Brasil, e poucos hospitais públicos ou universitários oferecem o serviço. O aconselhamento genético na anemia falciforme tem objetivo assistencial e educativo, ou seja, o de permitir a indivíduos ou famílias a tomada de decisões consistentes e psicologicamente equilibradas a respeito da procriação. O oferecimento do aconselhamento genético é um componente importante e parte integrante da conduta médica, sendo a sua omissão considerada uma falta grave.

PALAVRA-CHAVE: anemia falciforme; aconselhamento genético; hemoglobinas.

[ECE040] ESTUDO DOS FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS A INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO DOS IDOSOS, DE UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DA CIDADE DE SIMONÉSIA MG

Arthur Diaz Marques

Douglas Antônio Maurício da Silva

Este estudo tem como objetivo geral demonstrar os fatores de riscos associados às infecções do trato urinário em idosos de uma Instituição de Longa Permanência (ILP) da cidade de Simonésia-MG. Dentre os objetivos específicos, analisar a ocorrência de ITU nos idosos institucionalizados; identificar os sintomas, bem como, fatores, tais como, idade, sexo e patologias crônicas nos idosos institucionalizados com ITU. Para contextualização dessa temática, será realizada uma pesquisa bibliográfica para estruturar o desenvolvimento teórico do estudo e, em sequência, um estudo de analítico prospectivo, do tipo transversal, visando averiguar a incidência de ITU's idosos de uma instituição localizada no município de Simonésia-MG. Foi empregada a epidemiologia descritiva com base em dados primários coletados através da realização de exame de urina de idosos de uma ILP. De acordo com o resultado, dentre os 35 idosos da ILP 12 foram diagnosticados com ITU. A faixa etária variou de 60 a 92 anos, sendo o sexo feminino o mais prevalente em relação a ITU. Levando em conta que a ITU foi caracterizada como não complicada, a terapia baseou-se nos cefalosporinas. Conclui-se que o diagnóstico precoce se torna indispensável para reduzir os riscos associados a ITU, bem como, minimizar os casos de recidivas.

PALAVRA-CHAVE: Terceira Idade. Institucionalização. Infecção do Trato urinário. Fatores de risco. Profilaxia.

[ECE041] RESISTÊNCIA BACTERIANA ASSOCIADA AO USO IRRACIONAL DE ANTIMICROBIANOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Arthur Diaz Marques

Elaine Freire Muqui

A resistência aos antimicrobianos é um fenômeno genético, relacionado à existência de genes contidos no microrganismo que codificam diferentes mecanismos bioquímicos que impedem a ação das drogas. A resistência pode ser originada em mutações que ocorrem durante seu processo de divisão celular e resultam de erros de cópia na sequência de bases do DNA cromossômico. A outra origem da resistência é a importação dos genes causadores do fenômeno, consistindo na resistência transferível. Os antimicrobianos são fármacos com a propriedade de suprimir o crescimento dos patógenos ou destruí-los e cuja utilização na prática clínica modificou o curso natural, além de melhorar o prognóstico das doenças infecciosas. Eles podem ser utilizados de forma profilática e terapêutica, porém, seu emprego crescente e indiscriminado é o principal fator relacionado com a emergência de cepas microbianas resistentes. O uso adequado e inadequado, tanto profilático quanto empírico, doses subterapêuticas e duração prolongada, bem como a indicação para febre de origem obscura sem diagnóstico definido e infecções virais, são equívocos comuns que resultam em seleção bacteriana e aumento da resistência. A resistência aos antibióticos pode ser reduzida pelo uso dos mesmos de forma racional, levando-se em consideração as propriedades farmacológicas dos antimicrobianos, bem como pelos testes de diagnósticos e testes de susceptibilidade antimicrobiana.

PALAVRA-CHAVE: Antimicrobianos, Bactérias; Mecanismos de resistência.

[ECE042] HEPATITE C: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E ESTUDO DA SOROPREVALÊNCIA DE HEPATITE C NA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, EM 2016.

Arthur Diaz Marques

Thayssa Dalla Costa Escobar

Introdução: A hepatite C é uma doença infecciosa que pode causar inflamação aguda e crônica no fígado, podendo levar ao desenvolvimento de cirrose e hepatocarcinoma. Ela é transmitida principalmente por meio de contato com sangue contaminado, sendo que a via sexual e vertical não são muito comuns. Até hoje, não há uma vacina desenvolvida e aprovada para a hepatite C e, portanto, a única forma de evitá-la é através da prevenção. **Objetivos:** analisar a soroprevalência da hepatite C em indivíduos atendidos no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, em Vitória, Espírito Santo, no ano de 2016. Para isso, foram levantados os resultados de todos os exames para a hepatite C no período de 1 ano (n = 933). **Resultados:** foi encontrada uma prevalência total de 1,18% de indivíduos soropositivos, sendo que a população masculina (1,86%) apresentou uma porcentagem maior do que a feminina (0,72%). Além disso, foi observado também que a população hospitalar (1,67%) apresentou uma prevalência maior da doença, quando comparada à população ambulatorial (1,01%). **Conclusão:** foi encontrada baixa prevalência da doença na população estudada, o que não diferiu de outros resultados encontrados na literatura. Esse estudo poderá contribuir para entender a distribuição da doença na população, bem como a levar ao desenvolvimento de estratégias com a finalidade de combatê-la.

PALAVRA-CHAVE: Hepatite C, HCV , Epidemiologia

[ECE043] IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUCAS – HESL.

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Héber de Souza Lauar

Maria Leda Oliveira De Muner

A segurança do paciente é a redução do risco de danos desnecessários associados à saúde, tendo em vista que se deve reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. No Brasil, a incidência dos Eventos Adversos é alta, sendo que a ocorrência deste tipo de incidente é de 7,6%, dos quais 66% são considerados evitáveis. Baseando-se nesses dados, o presente estudo é um plano de intervenção que objetiva elaborar e implantar um Protocolo de Cirurgia Segura no Hospital São Lucas, localizado em Vitória/ES; preconizando prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde. Nosso projeto foi desenvolvido por meio de reuniões semanais do colegiado gestor do Centro Cirúrgico (C.C.) e Central de Material e Esterilização (CME), além do Núcleo de Acesso à Qualidade Hospitalar (NAQH), onde com o amparo das disciplinas estudadas no curso pudemos ampliar nossos horizontes e vislumbrar perspectivas promissoras. Finalizado, houve a apresentação desse plano a todos os envolvidos no processo.

PALAVRA-CHAVE: Incidência de Eventos Adversos. Protocolo de Cirurgia Segura. Plano Nacional de Segurança do Paciente.

[ECE044] IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SEGURANÇA DO PACIENTE NOS HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Maria Leda Oliveira De Muner

Najla Gomes Nagib Paulo

Nas últimas décadas a preocupação com a segurança no cuidado prestado ao paciente tem se tornado um dos assuntos prioritários na área da saúde. O conceito de Segurança do Paciente corresponde à redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Assim, é essencial elaborar um projeto de intervenção, cujos objetivos seriam a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente e a correta notificação dos eventos adversos nos serviços de saúde do Estado do Espírito Santo. Para isso, serão realizadas reuniões bimestrais entre a Comissão Estadual e as Comissões Regionais para definição de estratégias; realização de seminários estaduais e regionais, abordando os temas: Segurança do Paciente e Notificação de Eventos Adversos; visita técnica aos estabelecimentos de saúde com dificuldade em implantar o Núcleo de Segurança do Paciente ou em realizar as notificações; sensibilização dos gestores com dados estaduais para que ocorra a designação de pessoa específica para a realização desse trabalho e envio de e-mails e ofícios para as instituições de saúde, pela Comissão Estadual e Comissões Regionais de Segurança do Paciente, solicitando a implantação e cadastro para realização de notificações do Núcleo de Segurança do Paciente. Espera-se como resultado conseguir a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) nos estabelecimentos de saúde do Estado do Espírito Santo e a redução dos eventos adversos e melhoria na qualidade dos serviços prestados no Estado do Espírito Santo.

PALAVRA-CHAVE: Segurança do Paciente. Núcleos de Segurança do Paciente. Notificação de eventos adversos.

[ECE045] PROJETO DE IMPLANTAÇÃO: GERENCIAMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO LUCAS – VITÓRIA – ES.

Alaide Gomes de Souza

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Maria Leda Oliveira De Muner

No ambiente hospitalar o serviço de manutenção por diversas vezes é considerado uma atividade menos importante que a atividade-fim e o presente trabalho, retrata parte dessa realidade, pois geralmente os hospitais iniciam suas atividades e somente após um determinado período de funcionamento o setor é implantado. No Hospital Público São Lucas, pertencente à rede do Estado do Espírito Santo, o setor de manutenção não foi contemplado no projeto arquitetônico e na fase inicial da construção. O setor foi improvisado, e aliado a falta de estrutura, observou-se que os funcionários não tinham nenhum controle dos serviços solicitados, pendentes ou executados. Devido à falta de planejamento, inexistência de processos e rotinas para execução dos serviços, os atendimentos eram realizados a partir de solicitações verbais e corretivas, evidenciando falhas no gerenciamento operacional. O presente estudo objetiva a elaboração de um plano de intervenção que visa identificar as causas do problema e adquirir maior conhecimento para apontar uma solução que sirva de melhoria na qualidade do serviço prestado, proporcionando mais agilidade e segurança às atividades assistenciais. O projeto foi desenvolvido através de estudo de caso e levantamento bibliográfico. Essa metodologia foi adotada para analisar problemas gerenciais verificados nos serviços de manutenção no Hospital São Lucas, pertencente à rede de Hospitais do Estado do Espírito Santo. As considerações extraídas das fontes utilizadas serviram para retratar a realidade pesquisada, apontamento de soluções e elaboração de sugestões constantes no presente trabalho.

PALAVRA-CHAVE: Manutenção Hospitalar. Gestão de Serviços. Planejamento Gerencial.

[ECE046] POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PNEPS) E A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH): POSSÍVEIS INTER-RELAÇÕES.

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Douglas Gonçalves Jacob

Maria Leda Oliveira De Muner

O artigo se propõe a debater as potencialidades e desafios das Políticas Nacionais de Educação Permanente em Saúde e de Humanização. O objetivo deste estudo é discutir sobre a interação entre essas políticas, destacando suas similaridades e principais diferenças, bem como debater sobre os problemas enfrentados por elas em sua implementação. Nesse artigo é utilizada a metodologia do ensaio teórico. Apesar das dificuldades de implementação das Políticas de EPS e Humanização, as duas se mostraram importantes no sentido de trazer uma nova perspectiva na discussão sobre gestão coletiva do processo de trabalho, tanto na utilização de estratégias educativas quanto no manejo das relações de poder entre os diversos atores presentes no campo da saúde: trabalhadores, gestores, usuários, instituições de ensino, dentre outros.

PALAVRA-CHAVE: Educação Permanente em Saúde. Política Nacional de Humanização. Humanização da assistência.

[ECE047] ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE IMPRENSA: O APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, FUNCIONARIOS E A OPINIÃO PUBLICA.

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Dannielly Samira Valory Dias Paz

Maria Leda Oliveira De Muner

O presente trabalho aborda a comunicação em saúde como uma das estratégias da Comunicação Social. Além disso, enfatiza a assessoria de comunicação, como uma das ferramentas para melhor compreensão da perspectiva de comunicação que mobiliza e contribui para que os usuários da política de saúde efetivem os seus direitos, sobretudo, no que diz respeito aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Parte-se do pressuposto de que a comunicação em saúde contribui também com as mudanças na forma de olhar a saúde, como promoção e prevenção e não somente ausência de doenças. Consideramos que a Assessoria de Comunicação pode tornar a comunicação em saúde mais eficiente e adequada aos valores democráticos e aos princípios constitucionais.

PALAVRA-CHAVE: comunicação em saúde, assessoria de comunicação, comunicação social, sistema único de saúde.

[ECE048] ELABORAÇÃO DE ROTEIRO COMO INSTRUMENTO NORTEADOR PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE TERAPIA ANTINEOPLÁSICA DO ESPÍRITO SANTO.

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Maria Leda Oliveira De Muner

Sarah Letícia Bello Lemos Martins

INTRODUÇÃO: Os grandes problemas de saúde pública exigem o entendimento de outras variáveis, e não somente aquelas referentes ao mecanismo biológico de transmissão de doenças, para que as medidas de controle sejam aplicadas adequadamente. **JUSTIFICATIVA:** Atualmente as Vigilâncias Sanitárias são compostas por técnicos dos mais diversos níveis de formação, da área da saúde ou não. Diante de serviços complexos, como o Serviço de Terapia Antineoplásica, um roteiro pode direcionar as decisões do profissional no momento da inspeção sanitária superando a predominância da subjetividade do ato decisório. **METODOLOGIA:** Quanto aos fins, a pesquisa será metodológica haja vista a necessidade de construir uma ferramenta de avaliação de uma atividade na forma de roteiro de inspeção. Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica, pois o embasamento dos critérios de avaliação e classificação, relacionados no roteiro, será desenvolvida a partir de regulamentos sanitários e profissionais publicados oficialmente e código sanitário estadual (Vergara 2005 apud CHAVES, 2012). **OBJETIVO:** Apresentar uma proposta de roteiro de inspeção sanitária em serviços de terapia antineoplásica situados em estabelecimentos presentes no estado do Espírito Santo, baseado na legislação sanitária vigente e pertinente a essa categoria de estabelecimentos, colaborando na uniformidade e otimização das inspeções sanitárias efetuadas nesse setor. **RESULTADOS ESPERADOS:** Criação de roteiro de inspeção sanitária em serviços de terapia antineoplásica como instrumento padrão para fiscalização nesses estabelecimentos, integrando as legislações pertinentes a esta categoria de serviço em uma só ferramenta.

PALAVRA-CHAVE: Vigilância Sanitária; Serviços de Saúde; Terapia Antineoplásica; Roteiro.

Anderson Rodrigues Barbosa

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Maria Leda Oliveira De Muner

O presente trabalho tem por objetivo mostrar o amparo legal na adoção de critérios de sustentabilidade nas compras públicas, tornado obrigatório através da Lei nº 12.349/2010, que alterou a Lei nº 8.666/1993, em que acrescentou a promoção do desenvolvimento nacional sustentável como um dos princípios licitatórios. A ampliação dos debates sobre os impactos ambientais negativos derivados dos padrões de consumo levou à percepção do Estado como um expressivo consumidor de bens e serviços. Nesse sentido, percebeu-se que a preocupação com o impacto socioambiental das compras públicas já é uma realidade internacional e nacional, porém, em relação ao Estado do Espírito Santo ao analisar suas políticas públicas percebem-se que a prática ainda muito incipiente em suas compras públicas, dependendo de mais ações de modo a incentivar, motivar e sensibilizar os seus gestores para a adoção da gestão sustentável. A realização da licitação sustentável é uma imposição constitucional e legal, não constituindo uma mera faculdade do gestor, que exige a busca da proposta mais vantajosa, que atenda ao interesse público e contribua para promoção do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um desafio global e o Estado tem um papel importante na difusão de políticas públicas de responsabilidade socioambiental e no incentivo à produção e consumo de bens e serviços sustentáveis. Apesar de já existir normas estaduais sobre o assunto, o governo estadual, ainda precisa regulamentar mais detalhadamente sua aplicação, visando à melhoria e ampliação de sua prática, para que as licitações sustentáveis deixem de ser exceção e constituam regra nas compras públicas realizadas pelos órgãos públicos estaduais.

PALAVRA-CHAVE: Desenvolvimento sustentável; Licitações Públicas; Licitações Sustentáveis.

[ECE050] ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO HOSPITAL ESTADUAL SÃO LUCAS – DIFICULDADES E DESAFIOS ENCONTRADOS NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO E SUGESTÕES DE MELHORIAS/ADEQUAÇÕES COM BASE NOS DADOS ANALISADOS..

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Maria Leda Oliveira De Muner

Renan Reis Pinto

Considerando a problemática da geração de resíduos no âmbito dos serviços de saúde, verifica-se a importância do gerenciamento, buscando a proteção humana, a preservação do meio ambiente e de seus recursos naturais, e a qualidade e eficiência dos serviços de saúde pública. Nesse sentido o presente estudo avaliou a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde - PGRSS do Hospital Estadual São Lucas - HESL. A partir da análise de documentos, entrevistas com funcionários do hospital, observação do ambiente de trabalho e comparação com a legislação vigente, foi possível concluir que, mesmo havendo lacunas a implementação do plano já apresenta resultados positivos, como a redução da quantidade de resíduos infectantes.

PALAVRA-CHAVE: Gestão pública em saúde. Gerenciamento de Resíduos. Resíduos dos serviços de saúde.

[ECE051] ORÇAMENTO PÚBLICO: PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DA SOCIEDADE.

Anselmo Dantas

Cesar Albenes de Mendonça Cruz

Luciano Santiago Uchôa

Maria Leda Oliveira De Muner

O objetivo deste artigo é realizar uma discussão e também inserir um mínimo de esclarecimento sobre a importância dos conhecimentos sobre planejamento e orçamento para a administração pública e para o controle social que mesmo com o advento da internet ainda assim é pouco utilizado pela sociedade em geral. Dessa forma, a partir de uma pesquisa bibliográfica e também a análise da execução orçamentária da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, iniciam-se os estudos sobre o tema em questão, sendo abordados os seguintes itens: aspectos históricos, um breve levantamento sobre orçamento público no Brasil; e, aspectos gerais e técnicos sobre a execução do orçamento público na Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, planejamento na administração pública e controle interno e externo. Os esforços dessa pesquisa têm como objetivo agregar valor no debate ao tema em questão, com intuito de promover o uso desse instrumento de planejamento e também, difundir na sociedade a valiosa fonte de informação que representa o orçamento em termos de controle social, devido ao fato de está ali exposto as prioridades em relação à aplicação dos recursos públicos.

PALAVRA-CHAVE: Orçamento Público. Planejamento.

[ECE052] ANEMIA FALCIFORME.

Arthur Diaz Marques

Pedro Luiz de Souza Hybner

A anemia falciforme é uma doença genética causada por uma troca de aminoácidos na síntese da cadeia de hemoglobina que altera sua forma e sua função. Os indivíduos homozigóticos manifestam a doença e os heterozigóticos possuem o traço falciforme. Esta doença é considerada um problema de saúde pública que afetam principalmente pessoas da raça negra reduzindo a expectativa de vida. O diagnóstico pode ser feito por diferentes técnicas incluindo a eletroforese de hemoglobina e a determinação por HPLC, porém não deve ser utilizada uma única metodologia no diagnóstico. O diagnóstico precoce aumenta a qualidade de vida dos indivíduo com anemia falciforme. Esta revisão de literatura traz uma abordagem da doença falciforme incluindo aspectos histórico, sociais e epidemiológicos, fisiopatologia, diagnóstico laboratorial e tratamento da doença.

PALAVRA-CHAVE: Anemia falciforme; hemoglobina; diagnóstico laboratorial.

[ECE053] TOXOPLASMOSE: PREVALÊNCIA DE SOROPOSITIVIDADE EM GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ – ES..

Arthur Diaz Marques

Marcela Altoé Thomaz

A toxoplasmose no homem é descrita sob duas formas, a toxoplasmose congênita ou pré-natal e a pós-natal, que afeta adultos e crianças maiores. A toxoplasmose congênita é um dos problemas mais graves causados pelo *Toxoplasma gondii*, quando na fase aguda da doença, e dentre suas consequências estão o aborto e partos precoces. Visto os problemas que a doença pode causar durante o período gestacional, realizou-se um estudo para avaliar a prevalência de positividade de infecções por *Toxoplasma gondii* em gestantes atendidas numa Unidade Básica de Saúde em Jaguaré-ES, utilizando dados sorológicos dos exames laboratoriais de Imunoglobulina G e Imunoglobulina M anti-toxoplasma, feitos durante o acompanhamento pré-natal. Foi obtida uma taxa de prevalência de soropositividade de 55,31%, compreendendo 26 mulheres, no total de 47 gestantes estudadas. Quando estas foram divididas por faixa etária, a prevalência de soropositividade estava entre aquelas compreendidas na faixa dos 24 a 33 anos, alcançando 72,42%. Com os resultados obtidos observou-se a importância do acompanhamento pré-natal devido às informações passadas a cada gestante sobre como prevenir a infecção, a conduta a ser levada quando ela ocorre, o que ela pode causar ao feto, e a importância do tratamento adequado, podendo levar a redução dos casos de infecção congênita e possíveis sequelas em crianças infectadas congenitamente.

PALAVRA-CHAVE: toxoplasmose congênita, soropositividade, imunoglobulina G, imunoglobulina M, gestantes.

[ECE054] ALTERAÇÕES NO HEMOGRAMA DE PACIENTES COM DENGUE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

Arthur Diaz Marques

Ronaldo José Faria

A dengue é uma doença viral que vem se tornando um dos principais problemas de saúde pública no mundo. De acordo com a organização mundial de saúde, a incidência desta doença cresce dramaticamente a cada ano que se passa. No Brasil, a infecção pelo vírus da dengue se torna cada vez mais freqüente, atingindo a população de todos os estados. O presente estudo teve como objetivo identificar e descrever a freqüência das alterações do hemograma de pacientes que apresentaram sorologia IgM positiva para dengue. Durante o mês de janeiro ao mês de abril do ano de 2016 foram notificados 656 pacientes com suspeita da doença. Destes, 498 pacientes apresentou sorologia IgM positiva. Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo, onde que realizou-se uma análise crítica dos dados do hemograma destes pacientes para obtenção da freqüência das alterações. Dentre os casos estudados a população feminina foi a mais acometida pela doença, tendo 52% de prevalência. No que tange a faixa etária, indivíduos com mais de 50 anos foram os mais atingidos com 35,5% de incidência. As alterações hematológicas mais observadas foram uma leucopenia, que esteve presente em 57,7% dos pacientes, seguido de plaquetopenia predominante em 32,0% dos casos, linfopenia em 21,7% e aumento do HCT (hematócrito) em 14,8%. Por razão a fatores como a genética viral e à resposta imune ser diferente entre os pacientes, a freqüência dessas alterações pode variar de acordo com a região e a população estudada. A realização do hemograma é suma importância, devido sua grande contribuição para a decisão da conduta médica frente à ocorrência de possíveis casos críticos da doença.

PALAVRA-CHAVE: Dengue; Prevalência; Hemograma; Freqüência.

Arthur Diaz Marques

Layla Rodrigues Zanchetta

A anemia perniciosa é uma patologia causada por uma deficiência na absorção de vitamina B12 (cobalamina). É uma proteína produzida por células da parede do estômago que se liga à vitamina B12, permitindo sua absorção pelo intestino delgado. A vitamina B12 é hidrossolúvel, não-sintetizada pelo organismo humano, presente em certos alimentos, o qual o corpo precisa para fabricar células vermelhas saudáveis e manter o sistema nervoso funcionando apropriadamente. Sua deficiência é muito frequente entre idosos, vegetarianos e indivíduos que adotam baixa dieta proteica ou apresentam problemas de absorção gastrointestinal. Pessoas com anemia perniciosa ou megaloblástica não conseguem absorver essa vitamina em quantidade suficiente devido à falta de fator intrínseco, uma proteína fabricada no estômago. Isso ocasiona a deficiência de vitamina B12, em variados casos a deficiência pode permanecer assintomática por longos períodos, desencadeando uma deficiência crônica que, se mantida, pode levar a manifestações neurológicas irreversíveis. Outros fatores e condições que também podem causar deficiência de vitamina B12 incluem infecções, cirurgia, medicamentos e dieta. O seu diagnóstico é de extrema importância e envolve cuidados com a metodologia aplicada e o grupo populacional que será avaliado. Com objetivo de avaliar as metodologias disponíveis para o diagnóstico laboratorial da anemia perniciosa e suas aplicações em laboratórios clínicos, foi realizado uma revisão bibliográfica para descrever os tipos de diagnóstico. Conclui-se que em casos subclínicos, um diagnóstico correto e precoce representa ainda um desafio, e futuros estudos são necessários para definir um método padrão para diagnóstico laboratorial da deficiência de vitamina B12.

PALAVRA-CHAVE: anemia perniciosa, diagnóstico laboratorial, série vermelha, série branca.

[ECE056] A EVOLUÇÃO DA MALÁRIA NO BRASIL E A DIFÍCIL MISSÃO DE ERRADICAÇÃO DA DOENÇA NA AMAZÔNIA LEGAL

Anibal Ferreira Mathias

Arthur Diaz Marques

Francine Alves Grativa

A malária humana é considerada uma das enfermidades parasitárias mais antigas no mundo, ampla distribuição geográfica e impacto nas populações, sendo um grave problema de saúde pública em países subdesenvolvidos. É transmitida através da picada do mosquito fêmea do gênero *Anopheles* infectado pelo parasito intracelular *Plasmodium sp.* No Brasil as duas espécies mais comuns são *P. Vivax* mais abrangente que causa a forma mais branda da doença e o *P. falciparum*, responsável por uma forma muito grave de malária, podendo se não tratada, levar a óbito. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo descrever a situação epidemiológica da malária na Região amazônica brasileira e sua evolução nos últimos anos, uma vez que o conhecimento de sua natureza e seu comportamento em diferentes áreas de ocorrência é fundamental para implantação de programas de controle e erradicação da doença no país. A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho consistiu na revisão sistemática, da literatura disponível e como base de dados estatísticos utilizou-se o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica – SIVEP-Malária/SVS/MS do Ministério da Saúde. Os resultados indicam uma redução contínua da incidência parasitária na Região a partir de 2005, quando houve um pico de mais de 600 mil casos da doença, o que pode ser creditado aos esforços governamentais na implantação de Programas para o controle da epidemia. Entretanto, vários municípios dos Estados da Amazônia Legal registram surtos com índices parasitários altíssimos, o que mostra que medidas de intervenção devem ser distintas para cada grupo ou extrato de transmissão da doença.

PALAVRA-CHAVE: Epidemiologia. Malária. Saúde pública. Medicina tropical. Brazil.

[ECE057] ALIMENTOS FUNCIONAIS E NUTRACÊUTICOS NA MODULAÇÃO DA PSORÍASE.

Vanessa Teixeira Moulin

Patrícia de Oliveira França

Inúmeros fatores afetam a qualidade da vida moderna, de forma que a população deve conscientizar-se da importância de alimentos contendo substâncias que auxiliam a promoção da saúde, trazendo com isso uma melhora no estado nutricional. Os alimentos funcionais e os nutracêuticos comumente têm sido considerados sinônimos, no entanto, os alimentos funcionais devem estar na forma de alimento comum, ser consumidos como parte da dieta e produzir benefícios específicos à saúde, tais como a redução do risco de diversas doenças e a manutenção do bem-estar físico e mental. Por outro lado, os nutracêuticos são alimentos, ou parte dos alimentos que apresentam benefícios à saúde, incluindo a prevenção e/ou tratamento de doenças. Apesar de pouco conhecida, a psoríase é uma doença crônica inflamatória da pele bastante comum que atinge em torno de 2% da população mundial. Possui aspectos multipatogênicos com envolvimento genético, imunológico e de fatores ambientais. Caracteriza-se principalmente por hiperproliferação dos queratinócitos e infiltrado leucocitário na epiderme e pela expansão vascular e alteração na produção de citocinas na derme. Estudos recentes têm demonstrado melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes com psoríase quando submetidos a dietas de restrição calórica, com o incremento de vitaminas e minerais provenientes de frutas e hortaliças, e a inclusão de alimentos que sejam fonte de ômega 3, como, por exemplo, diversos tipos de peixes. Assim, justifica-se a importância de revisar na literatura a influência da nutrição na psoríase e propor cuidados nutricionais específicos a esta população.

PALAVRA-CHAVE: Alimentos Funcionais. Nutracêuticos. Psoríase.

[ECE058] NANOTECNOLOGIA EM COSMÉTICOS.

Fangye Suegmma Amorim Cardoso

Patrícia de Oliveira França

A nanocosmética refere-se à utilização de pequenas partículas contendo princípios ativos que são capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele, potencializando os efeitos do produto, o que se faz possível, com a junção dessas duas áreas, nanotecnologia e cosmética o desenvolvimento de sistemas de veiculação de substâncias e para a otimização das formulações já existentes. O potencial financeiro desse mercado projetado para 2015 por volta de US\$3,1 trilhões de acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), segundo números divulgados no ano de 2010. Neste estudo realizou-se o levantamento bibliográfico com o foco da nanotecnologia em cosméticos, mostrando alguns tipos já lançados no mercado. Pesquisou-se os artigos nas bases de dados eletrônicas Medline e Scielo, bem como em livros didáticos. Sendo notório que o campo é extremamente fértil e sedento por pesquisa, o trabalho exposto tem como finalidade abordar sucintamente a nanocosmética, tanto como seus elevados impactos, social, econômico e científico mostrando os nanocosméticos já lançados no mercado, suas formulações e também entender como é feita a nanotecnologia em cosméticos.

PALAVRA-CHAVE: Nanocosmética; Nanotecnologia; Cosmético.

[ECE059] A FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Danielle Reis de Souza

Patrícia de Oliveira França

Este trabalho é uma revisão bibliográfica contextualizando a realidade das farmácias de manipulação no Brasil. A pesquisa foi realizada a partir da busca por artigos e periódicos localizados nos bancos de dados eletrônicos: BIREME, MEDLINE, SCIELO e LILACS. Utilizou-se como descritores para busca em bancos eletrônicos: farmácia magistral; farmácia manipulação; indústria farmacêutica. Além destes, fora também utilizada para fins de investigação deste objeto de estudo os documentos legais vigentes acerca da regulamentação das farmácias de manipulação. A prática magistral ou de manipulação de medicamentos perdurou por muitos séculos chegando até o século XX. O século XX foi um período que provocou profundas mudanças no contexto da comercialização de medicamentos com a predominância das farmácias magistrais ou de manipulação até a metade do século e pela substituição destas pelas grandes indústrias farmacêuticas introduzidas no país a partir da década de 50. A indústria farmacêutica predomina até os dias atuais com imensa lista de medicamentos e insumos farmacêuticos. Contudo, aos poucos, tem se observado a reinserção das farmácias de manipulação no mercado de fármacos. A realidade atual das farmácias de manipulação apresenta um misto de conquistas adquiridas a partir do movimento dos farmacêuticos e da consolidação das leis que regulamentam o setor a partir da RDC 33/00 e mais recentemente da RDC 67/07 e de expectativa de que outros avanços ocorram mais adiante, com a universalização dos parâmetros impostos pela RDC 67/07 em relação ao nível de qualidade dos serviços prestados.

PALAVRA-CHAVE: Farmácia. Manipulação. Magistral. Farmacêuticos.

[ECE060] DESENVOLVIMENTO DE BIOCOSMÉTICOS.

Mayara Fraga da Silva

Patrícia de Oliveira França

Cosméticos são produtos constituídos por substâncias naturais ou sintéticas usadas na higienização pessoal, proteção, odorização ou embelezamento. Os biocosméticos possuem certificação de produtos orgânicos, pois são compostos de materiais que provocam impacto mínimo ao meio ambiente. São produtos livres de materiais de origem animal, materiais sintéticos e conservantes químicos. Toda a matéria-prima utilizada é derivada de plantas ou extrato vegetal produzidos sem adubos químicos, minerais e artificiais. Este grupo de cosméticos precisa passar por um rigor de produção, desde o plantio até ao consumidor final. O processo de produção deve ser ecológico e sustentável e que promova a biodiversidade e proteja as gerações futuras. Cosméticos orgânicos tem se tornado um assunto recorrente nos últimos anos. Isto deve-se ao aumento da percepção de que somos responsáveis pelo mundo em que vivemos e pela consciência da nossa própria saúde. Esta classe de cosméticos, procura balancear o mundo natural e busca manter esta harmonia utilizando produtos eficientes e saudáveis para os consumidores com processos o mínimo possível nocivos ao meio ambiente. Os consumidores estão mais dispostos a gastar em produtos orgânicos para cuidados com a saúde.

PALAVRA-CHAVE: Biocosméticos, cosméticos naturais e meio ambiente.

[ECE061] A IMPORTÂNCIA DO EXAME PREVENTIVO GINECOLÓGICO PAPANICOLAU.

Arthur Diaz Marquez

Marli Aparecida Dias Bromonschenkel

O Ministério da saúde preconiza a realização do exame de Papanicolau e/ ou exame citológico, ao início da atividade sexual, sendo como prática de prevenção ao câncer do colo uterino. É preocupante o número de mulheres, que não tem o hábito de realizar esse exame como prevenção, uma vez que, o câncer do colo uterino apresenta uma taxa de mortalidade elevada entre as mulheres. O levantamento bibliográfico foi com base de dados da Biblioteca virtual em saúde (SCIELLO), sendo também revisado literaturas de acordo com o assunto que esse artigo se propõe. Também foi realizado buscas em livros, revistas, textos e artigos que tratam do assunto em questão. Nesse estudo de revisão literária, observa-se a falta de conhecimento por parte de algumas mulheres, que por diversos motivos não se submetem a esse tipo de prevenção através do exame citológico. Muitas vezes até desconhecem o risco que estão correndo, como o câncer do colo uterino. Segundo a revisão literária, programas como atenção a saúde da mulher deveria orientar com clareza a importância do exame periódico com intuito de detectar possível morbimortalidade em mulheres que se encontram em grupos de risco. A revisão direciona a possíveis causas de um grupo de mulheres não fazer o exame citológico, como dificuldade de acesso ao serviço oferecido; medo do exame; constrangimento principalmente entre as mais velhas. Esse tipo de pesquisa torna-se necessária, como alerta aos profissionais de saúde em esclarecer e divulgar a importância do exame ginecológico como prevenção.

PALAVRA-CHAVE: Prevenção, exame citológico, câncer do colo uterino

[ECE062] A EFETIVIDADE DA CONSULTA DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO.

Karla Mozelli

Mônica Barros de Pontes

Na assistência a saúde da gestante envolvem a saúde da mulher, a saúde da criança, o planejamento familiar. Estamos relacionando todas as vertentes do processo da saúde da família. Nós enfermeiros temos nas mãos um momento impar que pode proporcionar diferentes resultados a diferentes famílias, dependendo principalmente, de como será realizado esta atenção a saúde. Pela importância a saúde da gestante, o presente estudo tem por objetivo descrever os achados do cuidado na assistência ao pré-natal em consultas de enfermagem dos Programas de Saúde da Família. Trata-se de um estudo de natureza descritiva e exploratória, com abordagem quanti-qualitativa. Realizado por meio de referenciais teóricos, onde foram utilizados como materiais de busca os acervos da biblioteca da EMESCAM e os sistemas de busca eletrônica Scielo e Google Acadêmico. Para a elaboração do estudo foram utilizados livros, manuais e artigos redigidos em português publicados entre os anos de 2002 a 2009. Concluiu-se que o acolhimento dos profissionais e a acreditação dos pacientes diante dos nossos cuidados na consulta de enfermagem, além da estrutura necessária de um sistema público, trouxe um avanço significativo nas atenções à saúde.

PALAVRA-CHAVE: Assistência de enfermagem. Saúde da Família. Saúde da Mulher.

[ECE063] A IMPORTÂNCIA DO HEMOGRAMA NO DIAGNÓSTICO DA ANEMIA FALCIFORME.

Arthur Diaz Marques

Larissa Pereira Alves

O diagnóstico diferencial da anemia falciforme é clinicamente importante. Na tentativa de tornar esse diagnóstico menos oneroso e mais eficiente, o uso de parâmetros dos contadores automáticos tem sido sugerido. O objetivo deste estudo foi avaliar a importância do hemograma no diagnóstico da anemia falciforme. Em conclusão, a contagem de hemácias pode ser útil no diagnóstico diferencial de anemias microcíticas.

PALAVRA-CHAVE: Anemia falciforme, diagnóstico e hemograma.

[ECE064] ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE UM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITOS.

Arthur Diaz Marques

Késsia Andreatta Corteletti

O diabetes tem adquirido um caráter de epidemia devido ao grande aumento do número de indivíduos acometidos nas últimas décadas. É uma doença caracterizada por distúrbios no metabolismo de açúcares, gorduras e proteínas. Ocorre devido a uma interação entre fatores hereditários e ambientais que levam a falta de secreção da insulina, aumento da glicose no sangue e comprometimento de vários órgãos, destacando-se os rins, a retina, e os sistemas nervoso e circulatório. A mortalidade relacionada ao diabetes está associada a eventos trombóticos, principalmente cardiovasculares. De uma maneira geral, pacientes com diabetes apresentam um quadro de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise; entretanto, ainda não foram esclarecidos os mecanismos que deflagram as alterações hemostáticas nos indivíduos diabéticos. O objetivo do presente artigo foi abordar as alterações hematológicas de um paciente portador de diabetes mellitus mais frequentes descritas na literatura. Os indivíduos diabéticos apresentam alterações endoteliais, plaquetárias, nos fatores de coagulação, nos anticoagulantes naturais e no sistema fibrinolítico, sendo que essas alterações são causadas direta ou indiretamente pela hiperglicemia. As evidências laboratoriais das alterações hemostáticas nos indivíduos diabéticos suportam a observação clínica de que o diabetes é um estado de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise. Ainda não estão bem estabelecidas as estratégias de intervenção clínica e/ou medicamentosa frente aos resultados alterados do sistema hemostático.

PALAVRA-CHAVE: Diabetes melitos; insulina; alterações hematológicas.

MEDICINA DO TRABALHO

[ECE065] ESTRESSE OCUPACIONAL EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Flaviano de Assis Caçador

Maria das Graças Caus de Souza

Maria da Penha Caus Simões

O objetivo geral é identificar os motivos do acometimento do estresse ocupacional em profissionais da saúde. O estudo trata-se de uma revisão de literatura por meio de dados já categorizados e validados, para que seja possível sumarizar as pesquisas já concluídas e obter conclusões a partir de uma área de interesse. O estudo teve como questão norteadora, a problemática, em seguida foram levantados artigos, teses, dissertações para alcançar o objetivo proposto. De acordo com a revisão de literatura desenvolvida, observou-se que o estresse ocupacional é motivado por fatores relacionados ao trabalho, e se constitui como um conjunto de atividades preenchidas de valores, intencionalidades, comportamentos e representações. Acrescentando as peculiaridades de riscos ao profissional da saúde, ainda existe a comprovação científica de que a maioria dos profissionais acometidos pelo estresse ocupacional, são aqueles com duplas jornadas de trabalho, sem um devido descanso, e se submetem à uma grande sobrecarga de trabalho no seu cotidiano, o que acaba por lhe exigir uma intensa e contínua renovação de energia adaptativa para não desenvolver o estresse patológico. Dos profissionais da saúde que despontam condições mais propensas ao acometimento de estresse ocupacional, se destacam os enfermeiros e médicos. Esses profissionais são aqueles que lidam constantemente com o risco iminente de morte, e com a complexidade de cuidados prestados, acrescentado aos fatores pessoais, acabam tendo uma relação com o desencadeamento do estresse ocupacional. Nesse sentido, estes estressores devem ser identificados, para que medidas de enfrentamento sejam preconizadas, com o objetivo de evitar ou minimizar o adoecimento. Sugere-se realizar este estudo com os profissionais da saúde, que por natureza do trabalho vivenciam situações tensas no desenvolvimento de suas atividades. Foi destacado neste trabalho a necessidade de adotar medidas preventivas visando oferecer melhores condições de trabalho e no ambiente físico, como também elaboração de palestras educativas sobre

os agentes estressores, seu enfrentamento e melhoria nas relações entre chefia e subordinados.

PALAVRA-CHAVE: Doença Ocupacional; Estresse Ocupacional; Trabalho, Profissional da Saúde.

[ECE066] ADESÃO AO PROTOCOLO DE SEGUIMENTO DE ACIDENTES PERFUROCORTANTES EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM UM HOSPITAL EM VITÓRIA, ESPIRITO SANTO

Débora Pereira Galveas

Enan Sales Magalhães

Diana de Oliveira Frauches

Contexto: Trabalhadores da área de saúde estão continuamente expostos a acidentes perfurocortantes (APC), com maior risco de transmissão de doenças como HIV, hepatites B e C. Apesar do risco conhecido, grande parte dos trabalhadores expostos são resistentes e não aderem ao protocolo de seguimento após APC. **Objetivos:** Discutir fatores que possam influenciar a adesão ao protocolo de seguimento após APC, com base no estudo de casos ocorridos em um hospital privado de grande porte. **Métodos:** Estudo observacional do tipo coorte histórico, com coleta retrospectiva de dados de APC em 342 trabalhadores em um hospital privado de grande porte localizado na Grande Vitória, no período de 2004 a 2015. Foi realizada estatística descritiva por meio de distribuição de frequência absoluta e relativa. A relação entre os fatores estudados e adesão ao protocolo de seguimento foi investigada mediante regressão logística. **Resultados:** Foi encontrada maior prevalência para a não adesão ao protocolo no sexo masculino (61,3%), função de médico (88,4%), centro cirúrgico (45,8%), final de semana (14,0%), turno matutino (19,5%), uso correto de EPI (18,4%) e sorologia de paciente fonte conhecida (19,0%). Na regressão logística, as variáveis que se apresentaram como fator de risco para não adesão foram o sexo masculino e a função médico. Já o setor da Hemodinâmica mostrou-se como fator protetor. **Conclusões:** Este estudo possibilitou descrever os fatores envolvidos na adesão ao protocolo de seguimento após APC. Devemos refletir sobre a importância de ações específicas, direcionadas aos trabalhadores mais vulneráveis, com objetivo de esclarecer e enfatizar as consequências após exposição.

PALAVRA-CHAVE: acidentes de trabalho; exposição a agentes biológicos; continuidade da assistência ao paciente; cooperação do paciente.

[ECE067] RISCO OCUPACIONAL À EXPOSIÇÃO DE ANTINEOPLÁSICOS REVISÃO DE LITERATURA

Carina Gomes Ferrari

Liliane Graça Santana

O presente trabalho tem como objetivo investigar os riscos ocupacionais dos trabalhadores que manipulam quimioterápicos, estão expostos. Para coleta de dados procedeu-se um levantamento bibliográfico nos livros do acervo da biblioteca da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e também em textos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), tendo como base de dados: LILACS, SCiELO, neste caso a busca de artigos partiu de descritores próprios da área da Ciência da Saúde tais como: neoplasias, antineoplásicos, carcinogênese, manipulação quimioterápica e riscos ocupacionais. Na sequência procedeu-se a análise dos dados à luz do conhecimento científico levantado. Discussão: dada a inerente toxicidade, em particular mutagenicidade e carcinogenicidade dos antineoplásicos tem havido preocupação no que diz respeito aos riscos da exposição ao longo prazo para os profissionais de que alguma forma manipulam tais fármacos, o que tem sido objeto de muita discussão e estudos. Conclusão: é fundamental que todos profissionais envolvidos sejam adequadamente informados, treinados e supervisionados no cumprimento das medidas de proteção disponíveis.

PALAVRA-CHAVE: neoplasias, antineoplásicos, carcinogênese, manipulação quimioterápica, riscos ocupacionais.

[ECE068] A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DO TRABALHO JUNTO A PACIENTES COM PERDA AUDITIVA POR RUÍDOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Mariana Bolsoni Fraga Zoteli

Francine Alves Gravitel Raposo

Este trabalho tem como objetivo caracterizar a importância da atuação do enfermeiro do trabalho frente à prevenção e controle de ruídos, evitando que, ao longo de sua jornada de trabalho, o trabalhador apresente perdas ou déficits auditivos. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, através de levantamento bibliográfico tendo como fonte de pesquisa monografias, artigos, teses publicadas, internet e livros. Partindo do tema a atuação do enfermeiro do trabalho junto a pacientes com perda auditiva por ruídos no ambiente de trabalho, este estudo permitirá verificar a importância deste profissional junto às organizações, com vistas à prevenção de doenças ocupacionais assim como a orientação e os cuidados com os pacientes que já adquiriram problemas causados pelos ruídos que age causando danos em milhares de trabalhadores, influenciando na capacidade de atenção e reduzindo o desempenho das atividades, tanto intelectuais como físicas do trabalhador.

PALAVRA-CHAVE: Perda auditiva por ruídos. Enfermeiro do trabalho; Prevenção.

Lilian Nascimento Salviato

Maria das Graças Caus de Souza

Maria da Penha Caus Simões

A proposta do estudo é compilar informações sobre os riscos à saúde do trabalhador com vida laboral ao ar livre devido a exposição à RUV e as medidas preventivas para se evitar efeitos negativos à pele por meio de revisão bibliográfica. A pesquisa se baseou em uma revisão bibliográfica, utilizando literaturas que complementam o tema em questão, tendo como seguimento as técnicas qualitativa e descritiva. O estudo revelou que os trabalhadores da construção civil, setor agrícola e marítimo constituem os maiores grupos de risco para o câncer ocupacional devida a exposição à RUV. O setor da construção civil lidera, pelo fato da maior parte dos empregados se encontrarem no trabalho informal, possuírem baixa escolaridade e reduzida qualificação profissional, liderando as taxas de acidentes de trabalho. Constatou-se a necessidade de estabelecer estratégias que preconizem a minimização dos problemas de profissionais como dificultadores na adoção de ações preventivas, e a motivação quanto à adesão de medidas efetivas como o uso do protetor solar e a utilização de EPIs, e a associação com os métodos de barreira física, com medidas protetivas individual, como o uso de óculos de proteção com lente verde-escura, protetores faciais, vestimentas adequadas como couro, napa, tecido impregnado de amianto, e, no caso de trabalhadores rurais, chapéu de aba larga e camisas claras de manga comprida, são imprescindíveis para contornar o problema. Evidenciou-se uma baixa produção científica com abordagem das atividades laborais mais acometidas por problemas de saúde devido a exposição à RUV, como também, a compilação dos riscos que essa população apresenta frente à exposição solar excessiva e ao potencial de desenvolver graves problemas de saúde, como o câncer. A pesquisa visa incentivar novos estudos como uma maneira de incentivar e envolver empresas, trabalhadores e profissionais de saúde na promoção da qualidade de vida do trabalhador como um dos requisitos, e o aumento da produtividade e redução de custos para as mais diversas empresas do mercado atual.

PALAVRA-CHAVE: Raios Ultravioleta; Prevenção; Saúde do Trabalhador.

[ECE070] OS CUIDADOS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DIANTE DAS DIFICULDADES DE ADAPTAÇÃO VIVENCIADAS PELO PACIENTE LÚCIDO

Aleuda Oliveira de Souza

Jackeline Frade Agrizzi

O período de internação em ambiente de cuidados intensivos, apesar de ser vivenciado de forma subjetiva por cada indivíduo, normalmente gera dificuldade de adaptação neste meio, sobretudo, quando o paciente se mantém lúcido durante o tempo em que permanece internado. Assim sendo, o objetivo deste estudo visa investigar os cuidados da equipe de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) diante das principais dificuldades vivenciadas pelo paciente lúcido. Dentre os objetivos específicos, descrever as características da Unidade de Terapia Intensiva e identificar as principais dificuldades vivenciadas pelos pacientes lúcidos durante o período de internação na UTI. A metodologia empregada neste estudo foi do tipo bibliográfica, baseada em artigos científicos publicados nos bancos de dados Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de dados da Enfermagem (BDENF). Foi possível concluir com este estudo que torna-se indispensável estabelecer uma comunicação efetiva com o paciente, explicando o motivo da sua internação, conversando com ele sobre os procedimentos que serão realizados, entendendo e respeitando os seus questionamentos, mas, sobretudo, auxiliando a superar os momentos difíceis e dolorosos vivenciados neste ambiente.

PALAVRA-CHAVE: Unidade de Terapia Intensiva. Cuidados de Enfermagem. Pacientes internados. Adaptação.

[ECE071] MEDIDA DA PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: CUIDADOS DE ENFERMAGEM

Maryanni Magalhães Camargo

Jackeline Frade Agrizzi

Introdução e Justificativa: A cavidade abdominal é um sistema com complacência limitada em que a pressão intra-abdominal (PIA) pode variar de 0-5 mmHg, pressões acima de 12 mmHg, de forma repetida e sustentada, é definido como Hipertensão Intra-abdominal (HIA) e valores maiores do que 20 mmHg associados a disfunção orgânica é diagnosticado como Síndrome do Compartimento Abdominal (SCA). Estima-se que 60-65% dos pacientes criticamente enfermos internados em Unidades de Terapia Intensiva apresentem algum grau de HIA e que o desenvolvimento da SCA aumenta o tempo de internação e os gastos hospitalares. **Objetivos:** Descrever as condições clínicas que sugerem a medida da PIA como método avaliativo do quadro clínico do paciente crítico; elaborar um POP (Procedimento Operacional Padrão) quanto à mensuração da PIA; e relatar os principais cuidados de enfermagem à pacientes com diagnóstico de HIA. **Metodologia:** Revisão de literatura de caráter qualitativo. **Resultado:** O choque hipovolêmico induz a vasoconstrição periférica e mesentérica, ou seja, é um fator de risco para HIA. O diagnóstico da HIA é através da identificação dos fatores de risco, avaliação dos sinais e sintomas e monitorização da PIA. A medida da PIA através do cateterismo vesical é o principal método de avaliação indireta e é fundamental a padronização da técnica de medida a fim de tornar o procedimento seguro e ágil. **Considerações finais:** A medida da PIA é um parâmetro vital para o diagnóstico de HIA e quando associado aos cuidados de enfermagem é efetivo na prevenção e tratamento da SCA.

PALAVRA-CHAVE: Hipertensão intra-abdominal, Pressão intra-abdominal, Unidades de terapia intensiva, Cuidados de enfermagem, Procedimento operacional padrão.

[ECE072] PUÉRPERAS E SÍNDROME HELLP: CUIDADOS DA ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Jéssica Pires Freitas

Jackeline Frade Agrizzi

Julianna Vaillant Louzada

O seguinte estudo tem como objetivo geral analisar os cuidados da enfermagem para os casos de puérperas internadas em Unidade de Terapia Intensiva com Síndrome de Help e seu impacto para a evolução dos mesmos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujas fontes primárias constituíram-se de artigos publicados nas bases de dados da BVS, LILACS e SciELO, de 2000 a 2012. A busca ocorreu mediante os seguintes descritores: hipertensão gestacional, síndrome HELLP, cuidados de enfermagem na síndrome HELLP. A análise compreensiva destacou três categorias temáticas: Fatores de risco da síndrome HELLP; manifestações clínicas da síndrome HELLP e Cuidados de Enfermagem na síndrome HELLP. Assim, a assistência de enfermagem é fundamental para estabelecer precocemente o diagnóstico com as suas devidas intervenções, proporcionando assim, uma gestação com menos riscos para o binômio mãe-filho.

PALAVRA-CHAVE: gestante, hipertensão, síndrome de help, UTI.

[ECE073] IMPLICAÇÕES E INTERVENÇÕES DOS FATORES ESTRESSORES NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS

Thays Lessa dos Santos Grijó

Jackeline Frade Agrizzi

Estudo de natureza de revisão de literatura que teve por finalidade identificar as causas geradoras de estresse, seus efeitos na saúde dos profissionais, e propor medidas para atenuar este problema. Na metodologia foram utilizados artigos publicados pelo Ministério da Saúde, na biblioteca SciELO e Dissertações de Mestrado. O recorte temporal foi do ano 2000 a 2014. Como principais fatores de estresse para os enfermeiros inseridos nas UTIs. Identificou-se como fatores estressores a realização de multitarefas, à administração e gerenciamento de equipes, o número reduzido de profissionais, alta carga emocional e jornada dupla de trabalho. Concluiu-se que para minimizar a realidade de estresse vivenciada pelos enfermeiros é preciso que os empregadores valorizem seus profissionais, ofereçam condições mais dignas de trabalho, e que o profissional mantenha um bom relacionamento interpessoal com toda equipe multiprofissional.

PALAVRA-CHAVE: Estresse. UTI. Enfermeiros. Unidade de Terapia Intensiva.

[ECE074] INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA COM A TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Wanderson Almeida de Paula

Andressa Tomazini Borghardt

Jackeline Frade Agrizzi

Objetivo: analisar a produção científica quanto as possíveis interações medicamentosas de formulações orais com a terapia nutricional enteral. **Método:** realizou-se uma revisão integrativa sobre as interações medicamentos-nutrição enteral, utilizando-se os descritores nutrição enteral, enfermagem e interações medicamentosas, nas bases de dados da LILACS, MedLine e BDNF no período de 2006 a 2016. **Resultados:** evidenciou-se que há escassez de publicações no que tange o tema no Brasil. Foram encontrados oito artigos científicos que destacam os medicamentos que causam interações com a nutrição enteral. **Conclusão:** interações fármaco-nutrição enteral interferem na qualidade e no custo efetivo da assistência prestada em Unidades de Internação. Destaca-se a importância da monitorização dos pacientes em terapia nutricional enteral que fazem uso de medicamentos com formulações orais, visando à minimização dos efeitos adversos e extraíndo todo o potencial, tanto dos fármacos quanto da nutrição.

PALAVRA-CHAVE: Enfermagem. Nutrição enteral. Interações medicamentosas.

[ECE075] NOVAS DROGAS NO TRATAMENTO DO CÂNCER (MIELOMA MÚLTIPLO) –
ANTICORPO MONOCLONAL

Aline Rodrigues Buzin

Ariely Vermelho Comper da Silva

Jackeline Frade Agrizzi

Mieloma múltiplo é um cancro hematológico derivado a partir de células plasmáticas malignas dentro da medula óssea, tipicamente acompanhado pela secreção de imunoglobulinas monoclonais que são detectáveis no soro ou na urina, caracterizando o segundo câncer mais comum no sangue, sendo sua patogênese pouco compreendida.

Objetivo: Realizar uma revisão sobre as novas drogas (anticorpo monoclonal) para o tratamento do mieloma múltiplo. **Metodologia:** Foi realizado uma busca retrospectiva de artigos científicos que abordam amplamente o tema, compreendidos no período entre 10 anos, usando o Scielo e o PubMed como fontes norteadoras de levantamento de dados, com os seguintes descritores: mieloma múltiplo, daratumumab, elotuzumab, pembrolizumab, nivolumab e impilimumab. Sendo excluídos os artigos que não falavam sobre o tema principal e artigos muito antigos. **Conclusão:** Conclui-se que grande parte dos medicamentos relatados, quando associados com outros medicamentos possui um efeito maior e melhor do que quando se administrado sozinho no paciente. Sendo a terapia de combinação de diferentes fármacos ainda hoje apresenta uma melhor resposta ao câncer, do que quando administrados sozinhos.

PALAVRA-CHAVE: Mieloma múltiplo, anticorpo monoclonal, câncer, daratumumab, elotuzumab.

[ECE076] BIOSSEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS: PROFISSIONAIS DE SAÚDE FRENTE AO RISCO QUÍMICO.

Nathália Cristina Oliveira Soares

Ariely Vermelho Comper

Jackeline Frade Agrizzi

Visando a exposição ocupacional dos trabalhadores da área de saúde que manipulam e manuseiam medicamentos antineoplásicos, e possíveis acidentes ocupacionais, este estudo tem como principais objetivos de reforçar a atenção destes profissionais quanto a paramentação adequada e segura nos centros de quimioterapia, atentando também para uma manipulação correta, evitando erros, e evitando descarte inadequado para o meio ambiente. Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva, abordando o tema no período de 1997 a 2016, utilizando o Scielo, PubMed e o Google Acadêmico como fontes norteadoras de levantamento de dados. Pode-se concluir, com base nesse artigo, a importância do uso correto dos EPIs para evitar possíveis acidentes, educação continuada abordado a biossegurança para os profissionais de saúde, além de uma fiscalização nos setores de hospitais e clínicas que possuem centros oncológicos. Deve-se conscientizar a todos os trabalhadores envolvidos que há muitos riscos a saúde pela exposição as drogas antineoplásicas.

PALAVRA-CHAVE: Biossegurança, risco ocupacional, medicamentos antineoplásicos, equipamentos de proteção.

[ECE077] O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO FRENTE A UMA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO CONTINUADA.

Luana Mariano

Fabício Bragança da Silva

Jackeline Frade Agrizzi

O Objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento dos enfermeiros acerca das manobras de RCP no paciente adulto. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica exploratório e descritivo, que abordou os trabalhos científicos publicados nos últimos dez anos. Metodologicamente predominam os estudos que apresentaram o questionário como instrumento de coleta de dados, optou-se por uma categoria de análise a Educação Continuada. Concluiu-se que são poucos os estudos de enfermagem na área da PCR, sendo fundamental o incentivo à produção científica, bem como a necessidade das instituições de ensino e dos serviços de saúde buscarem aprimoramento nos treinamentos e programas para uma melhor capacitação da equipe.

PALAVRA-CHAVE: ressuscitação cardiopulmonar; parada cardiorrespiratória; cuidados de enfermagem; papel do enfermeiro; educação continuada.

[ECE078] - O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE QUEIMADO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.

Kelly Christina Xavier de Oliveira

Andressa Tomazini Borghardt

Jackeline Frade Agrizzi

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo analisar as pesquisas que descrevem o papel do enfermeiro na assistência ao paciente queimado. Método: trata-se de uma revisão integrativa, utilizaram-se as bases de dados: LILACS, BDNF, MEDLINE, publicações do período de 2007 a 2016 e no idioma português. Foram utilizados os descritores: queimadura, cuidados de enfermagem e dor, ao final, foram encontrados 13 artigos que estabeleceram os critérios de inclusão. Resultados: Destes artigos 7(58,4%) estavam relacionados a assistência de enfermagem, 4 (32,2%) a queimadura e 2 (9,4%) relacionados a dor. Conclusão: Percebe-se que o enfermeiro desempenha um papel de extrema importância nas tomadas de decisões que são estipuladas ao paciente, ressaltando a importância da assistência de enfermagem ao paciente queimado, principalmente com relação à dor vivenciada por essa clientela.

PALAVRA-CHAVE: Queimadura, Cuidados enfermagem, Dor.

[ECE079] - O ENFERMEIRO COMO EDUCADOR EM UMA EQUIPE DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR

Juliano Celestino de Freitas

Tatiane Silva

O presente estudo tem como objetivo geral descrever sobre o Atendimento Pré-Hospitalar, destacando as atribuições do enfermeiro como o profissional indicado para desempenhar o papel de educador. Os objetivos específicos baseiam-se em apresentar uma contextualização histórica de implantação do modelo brasileiro e apresentar um diagnóstico situacional nos dias atuais. A metodologia utilizada para a realização desse estudo foi a pesquisa bibliográfica. Nesse sentido, a capacitação mostra-se como recurso estratégico e indispensável para que a equipe possa aprimorar os conhecimentos adquiridos na fase acadêmica, e, principalmente, aperfeiçoar a prática profissional de forma a atender as diretrizes do APH e garantir aos usuários deste serviço a presteza e a qualidade da assistência.

PALAVRA-CHAVE: Atendimento pré-hospitalar. Equipe. Enfermeiro. Educação em Saúde.

[ECE079] - PAPEL DO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Emanuelli Belotti Silva

Tatiane Miranda

O objetivo do presente artigo foi descrever sobre o ruído que interfere no desenvolvimento do neonato e o papel do enfermeiro em uma unidade de terapia intensiva neonatal. Método: para o desenvolvimento do artigo foi realizado uma revisão integrativa da literatura, foi efetuada uma busca de dados com artigos em português entre os anos de 2007 a 2016. As coletas de dados foram realizadas em sites científicos como: LILACS, BDNF, MEDLINE. Sendo utilizados os descritores: neonato, ruídos, enfermagem. Resultados: foram analisados 11 artigos. Do total de estudos investigados, 5 (48.9%) estava relacionado a neonatologia, (44.6%) ruídos, 2 (6.5%) sobre assistência de enfermagem. Conclusão: O presente estudo buscou proporcionar e relatar sobre os

ruídos que interfere no desenvolvimento do recém-nascido, assim como mencionar a eficácia do horário do soninho e o método canguru na recuperação do neonato. Sendo que o enfermeiro possui um papel importante na tomadas de decisões estipulado ao recém-nascido.

PALAVRA-CHAVE: Neonato, Ruídos, Enfermagem.

[ECE080] -A PSICOSSOMÁTICA DO CÂNCER DE MAMA: DOENÇA QUE ANSEIA OU ANSIEDADE QUE ADOECE?

Nayara Peçanha e Castro Machado

Débora Dummer Meira

Este artigo é uma revisão bibliográfica na qual foi levantada a literatura científica do período entre 2006 e 2016 objetivando conhecer a relação causal entre fatores emocionais causados por estresse crônico e o câncer de mama em mulheres. Sabendo-se ser o câncer de mama um problema de grande magnitude e transcendência, o que lhe confere destaque inclusive em termos de Saúde Pública, fica clara a relevância do estudo, pois um dos fatores pesquisados, a depressão, é tida atualmente como “o mal do século”. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de tal enfermidade. Além disso, a depressão e outros fatores emocionais em pacientes oncológicos podem preceder ou manifestar-se posteriormente ao diagnóstico e tratamento do tumor. Alguns estudos demonstram que a maior parte dos pacientes oncológicos apresenta história prévia de transtornos emocionais, e em outros estes se manifestam como um agravante do câncer. Nesse contexto surgem a psiconeuroimunologia e a psico-oncologia no intuito de relacionar as variáveis psicológicas e comportamentais sobre a incidência e sobrevivência aos tumores malignos, inclusive os de mama. O presente trabalho se propôs a investigar a existência de uma relação direta entre tais fatores emocionais como causadores dos tumores malignos de mama em mulheres. Essa pesquisa deve ser percebida como processo que abre perspectivas de investigações posteriores com pesquisa de campo,

uma vez que a angústia do ser e do existir é inerente à condição humana, o que remete à necessidade de uma avaliação psicológica dos pacientes, avaliá-los como um todo, tanto para fins profiláticos como para fins terapêuticos.

PALAVRA-CHAVE: câncer de mama, fatores emocionais, psico-oncologia.

[ECE081] -A PSICOSSOMÁTICA DO CÂNCER DE MAMA: DOENÇA QUE ANSEIA OU ANSIEDADE QUE ADOECE?

Verônica Fernandes Gobbi

Francine Alves Grativel Raposo.

A qualidade de vida do trabalhador revela-se um tema e um conceito amplamente discutido no mundo. O interesse por esse assunto emerge desde a antiguidade, através do grande filósofo Aristóteles, que referia que a qualidade de vida no trabalho é o maior determinante da qualidade de vida. No Brasil, o trabalhador da área da saúde tem uma profissão atrelada ao cuidado minucioso, situações laborais de exposição aos mais diversos riscos, uma grande carga de prestação de serviços altamente especializados, além das dificuldades que as instituições sofrem para suprir as necessidades individuais dos pacientes e dos trabalhadores, diante disso há um esgotamento físico, psíquico e uma baixa qualidade de vida. Neste intuito, esta pesquisa tem como objetivo analisar a influência que o trabalho em um ambiente hospitalar pode exercer sobre a qualidade de vida dos profissionais. A metodologia adotada foi de uma pesquisa descritiva, com a análise de artigos, periódicos e livros dos últimos 10 anos de publicação. Os resultados encontrados na análise de dados demonstram que é necessário propiciar melhores condições de trabalho nos contextos de saúde, principalmente na sua forma de organização e distribuição de tarefas e responsabilidades, considerando as necessidades individuais de cada trabalhador, bem como sua capacidade de enfrentamento, adaptação e reação em diferentes situações.

PALAVRA-CHAVE: Qualidade de Vida. Estresse Ocupacional. Saúde do Trabalhador.

O Ministério da saúde preconiza a realização do exame de Papanicolau e/ou exame citológico, ao início da atividade sexual, sendo como prática de prevenção ao câncer do colo uterino. É preocupante o número de mulheres, que não tem o hábito de realizar esse exame como prevenção, uma vez que, o câncer do colo uterino apresenta uma taxa de mortalidade elevada entre as mulheres. O levantamento bibliográfico foi com base de dados da Biblioteca virtual em saúde (SCIELLO), sendo também revisado literaturas de acordo com o assunto que esse artigo se propõe. Também foi realizado buscas em livros, revistas, textos e artigos que tratam do assunto em questão. Nesse estudo de revisão literária, observa-se a falta de conhecimento por parte de algumas mulheres, que por diversos motivos não se submetem a esse tipo de prevenção através do exame citológico. Muitas vezes até desconhecem o risco que estão correndo, como o câncer do colo uterino. Segundo a revisão literária, programas como atenção a saúde da mulher deveria orientar com clareza a importância do exame periódico com intuito de detectar possível morbimortalidade em mulheres que se encontram em grupos de risco. A revisão direciona a possíveis causas de um grupo de mulheres não fazer o exame citológico, como dificuldade de acesso ao serviço oferecido; medo do exame; constrangimento principalmente entre as mais velhas. Esse tipo de pesquisa torna-se necessária, como alerta aos profissionais de saúde em esclarecer e divulgar a importância do exame ginecológico como prevenção.

PALAVRA-CHAVE: Prevenção, exame citológico, câncer do colo uterino

[ECE083] - A IMPORTÂNCIA DO EXAME PREVENTIVO GINECOLÓGICO PAPANICOLAU

Larissa Pereira Alves

Arthur Diaz Marquez

O diagnóstico diferencial da anemia falciforme é clinicamente importante. Na tentativa de tornar esse diagnóstico menos oneroso e mais eficiente, o uso de parâmetros dos contadores automáticos tem sido sugerido. O objetivo deste estudo foi avaliar a importância do hemograma no diagnóstico da anemia falciforme. Em conclusão, a contagem de hemácias pode ser útil no diagnóstico diferencial de anemias microcíticas.

PALAVRA-CHAVE: *Anemia falciforme, diagnóstico e hemograma.*

[ECE084] - ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS DE UM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITOS

Késsia Andreatta Corteletti

Arthur Diaz Marquez

Curso de Especialização em Saúde Coletiva

Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM

O diabetes tem adquirido um caráter de epidemia devido ao grande aumento do número de indivíduos acometidos nas últimas décadas. É uma doença caracterizada por distúrbios no metabolismo de açúcares, gorduras e proteínas. Ocorre devido a uma interação entre fatores hereditários e ambientais que levam a falta de secreção da insulina, aumento da glicose no sangue e comprometimento de vários órgãos, destacando-se os rins, a retina, e os sistemas nervoso e circulatório. A mortalidade relacionada ao diabetes está associada a eventos trombóticos, principalmente cardiovasculares. De uma maneira geral, pacientes com diabetes apresentam um quadro de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise; entretanto, ainda não foram esclarecidos os mecanismos que deflagram as alterações hemostáticas nos indivíduos diabéticos. O objetivo do presente artigo foi abordar as alterações hematológicas de um

paciente portador de diabetes mellitos mais frequentes descritas na literatura. Os indivíduos diabéticos apresentam alterações endoteliais, plaquetárias, nos fatores de coagulação, nos anticoagulantes naturais e no sistema fibrinolítico, sendo que essas alterações são causadas direta ou indiretamente pela hiperglicemia. As evidências laboratoriais das alterações hemostáticas nos indivíduos diabéticos suportam a observação clínica de que o diabetes é um estado de hipercoagulabilidade e hipofibrinólise. Ainda não estão bem estabelecidas as estratégias de intervenção clínica e/ou medicamentosa frente aos resultados alterados do sistema hemostático.

PALAVRA-CHAVE: Diabetes melitos; insulina; alterações hematológicas.

[ECE085] - ASPECTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Viviane Germano dos Santos

Jackeline Frade Agrizzi

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracteriza-se por ser um ambiente de alta complexidade que, admite pacientes potencialmente graves ou com instabilidade de um ou mais sistemas orgânicos. Compreendendo que humanizar esse setor é uma medida que pretende tornar efetiva a assistência a esse indivíduo, objetivou-se identificar os aspectos relacionados ao processo de humanização em Unidade de Terapia Intensiva. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica em livros e bases de dados eletrônicos. O processo de humanização otimiza as atividades inseridas dentro do contexto do cuidado, porém, é necessário que os profissionais desse setor sejam sensibilizados com esta problemática, implementando os métodos técnico-científicos já construídos e dominados, em busca de uma relação enfermagem/paciente/família mais próxima.

PALAVRA-CHAVE: Humanização. UTI. Família. Enfermagem.

[ECE086] A UTILIZAÇÃO DA ESCALA DE BRADEN COMO FATOR PREDITIVO AO APARECIMENTO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.

Ronaldo Gonçalves Vallory Junior

Jackeline Frade Agrizzi

As úlceras de pressão, conhecidas também como úlceras de decúbito, são definidas como lesões causadas pela constante pressão exercida sobre um determinado ponto do corpo, ocasionando comprometimento do aporte sanguíneo com diminuição ou interrupção da irrigação tissular, ocasionando oclusão de vasos e capilares, isquemia e morte celular. A fim de minimizar o aparecimento dessas úlceras de pressão, foram criadas diversas escalas de avaliação, dentre elas, a que vamos discutir neste artigo, a escala de Braden. Esse artigo será baseado na revisão bibliográfica do estudo de diversos autores, a fim de ressaltar a utilização da escala de Braden como fator preditivo ao aparecimento de úlceras de pressão em uma unidade de terapia intensiva.

PALAVRA-CHAVE: Enfermagem, Escala de Braden, Úlceras de Pressão, Unidade de Terapia Intensiva.

[ECE087] - CUIDADOS PALIATIVOS DOS PACIENTES TERMINAIS E ABORDAGEM DOS FAMILIARES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI.

Juliana Vieira da Silva

Jackeline Frade Agrizzi

O presente artigo aborda sobre a complexidade do quadro clínico dos pacientes internados na UTI, apresentando graus variados de exigências de cuidados e assistência qualificada, instabilidade orgânica, possibilitando que a morte seja uma realidade a ser afrontada. Esse estudo se faz necessário para melhor compreensão por parte da equipe de trabalho das possíveis repercussões emocionais que o paciente e seus familiares possam vir a ter diante do fato de não existirem possibilidades terapêuticas para patologia do paciente, além de um prognóstico de morte próxima. O objetivo foi verificar como ocorre a abordagem dos familiares dos pacientes terminais na Unidade de Terapia Intensiva e a importância dos cuidados paliativos. Dentre os resultados obtidos com as pesquisas realizadas, destaca-se que a prática dos Cuidados Paliativos, traz importantes conceitos e atitudes para auxílio de uma abordagem mais humana diante da dor da situação de terminalidade vivenciada por todos envolvidos de maneira geral. Conclui-se que, apesar de grande parte dos conhecimentos e a vivência dos profissionais que atuam na Unidade de Terapia Intensiva – UTI serem aplicados, as práticas podem ser aperfeiçoadas, o elo da equipe de saúde com a família e apontada como o primeiro passo no trabalho com o paciente.

PALAVRA-CHAVE: Cuidados Paliativos; Pacientes Terminais; Família; UTI.

Gustavo Baratela Cossuol

Claudia Regina Stelzer Moraes

O Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (GRSS) em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) tem sido discutido de uma forma mais abrangente, desde o final do século XX até a atualidade, pois existe uma preocupação com o enfrentamento de vários problemas. **Objetivo:** Identificar as abordagens relacionadas aos resíduos sólidos de saúde através do levantamento bibliográfico. **Metodologia:** revisão bibliográfica de cunho qualitativo através de buscas realizadas na Internet. Foi feito o levantamento de artigos sobre o tema, indexados nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). **Resultados e Discussão:** No decorrer da análise, os resultados encontrados nos artigos foram bem semelhantes, nos permitindo ter um panorama da evolução do Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde no Brasil. **Conclusão:** Apesar da legislação ter evoluído e a abordagem ao tema ter aumentado, ainda podemos encontrar muitas deficiências no processo de gerenciamento de resíduos, visto que muitas instituições no Brasil ainda têm dificuldades em implantar um Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) eficaz.

PALAVRA-CHAVE: gerenciamento de resíduos, problemas, análise, legislação.

[ECE089] - ESTUDO DOS PRINCIPAIS FÁRMACOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO TÓPICO E ORAL DE PACIENTES COM PSORÍASE

Thays Oliveira de Azevedo

Fabiana Passamani

A psoríase é uma doença inflamatória imunomediada, crônica e de base genética, afeta aproximadamente 3% da população mundial, independente de raça, idade ou sexo. As formas mais graves têm sido associadas com várias doenças que têm fatores patogênicos semelhantes. Comorbidades classicamente associadas com a psoríase são artrite psoriática, distúrbios psicológicos e psiquiátricos.

Atualmente não existe a cura da doença, o que tem a oferecer para estes pacientes é paliativo, na tentativa de amenizar o desconforto causado pela psoríase. Diante disto a escolha do tratamento é de grande importância e deve ser feita considerando-se a gravidade e a extensão do quadro clínico e o comprometimento psicoemocional. Devem ser priorizadas, inicialmente, as medidas gerais e terapia tópica, a seguir, fototerapia e, por último, tratamento sistêmico.

PALAVRA-CHAVE: Psoríase. Tratamento. Fármacos. Sintomas.

[ECE090] - O MERCADO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS NO BRASIL

Juliana Costa Pizziolo

Patrícia de Oliveira França

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar a questão dos medicamentos fitoterápicos no contexto nacional. Os objetivos específicos foram avaliar o mercado de medicamentos fitoterápicos no Brasil e a concessão de patentes de medicamentos fitoterápicos, compreender os problemas relacionados ao mercado de fitoterápicos, e estudar a relação entre pesquisa e desenvolvimento e a concessão de patentes, em especial na área de plantas medicinais

O problema que se enfrenta no Brasil é em relação a pouca P&D de medicamentos fitoterápicos; sendo assim os principais laboratórios no Brasil que vendem fitoterápicos são de origem estrangeira. Já a dificuldade do mercado internacional se deve a definição sobre medicamentos fitoterápicos e como os mesmos são enquadrados dentro do aspecto regulatório de cada país.

A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica. Conclui-se que o apelo comercial pela natureza se torna na realidade um grave problema para o sistema brasileiro de saúde pública, devido à cobiça econômica do setor produtivo de medicamentos fitoterápicos no país.

PALAVRA-CHAVE: Fitoterápicos. Concessão. Regulação.

[ECE091] - ESTABILIDADE DE FITOCOSMÉTICOS

Cristal de Castro Baioco Bastos Lopes

Patrícia de Oliveira França

O uso de plantas medicinais baseado no saber popular vem motivando e ganhando espaço em pesquisa com desenvolvimento de fitoterápicos e formulações cosméticas. Entretanto, o uso destes ativos da biodiversidade brasileira deve garantir ao consumidor segurança, qualidade e eficácia. O fitocosmético pode ser definido como cosmético que contém princípio ativo como extratos vegetais padronizados, óleos essenciais e óleos. Como todo produto tecnicamente elaborado deve passar por todas as etapas de pesquisa, dentre elas: proposição, criação e desenvolvimento. Desse modo, os estudos de estabilidade de fitocosméticos são essenciais e necessários para garantir o padrão de qualidade dos produtos quanto aos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. O estudo tem como objetivo descrever e discutir os estudos de estabilidade de fitocosméticos publicados na literatura nos últimos dez anos.

PALAVRA-CHAVE: Estabilidade; Fitocosmético; Cosmético.

[ECE092] - ANÁLISE DE PARASITAS INTESTINAIS EM AMOSTRAS FECAIS DE PACIENTES DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE ITAGUAÇU - ES

Patrícia Aparecida Tozzo

Arthur Diaz Marques

O objetivo deste trabalho foi identificar a presença de parasitas intestinais analisados em um laboratório de análises clínicas de Itaguaçu. Método: para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado um estudo transversal, de caráter quantitativo e documental, no mês de setembro de 2016, envolvendo 84 amostras fecais de indivíduos de diversas faixas etárias e de ambos os sexos, preparadas pelo método de Sedimentação espontânea. Resultados: das amostras analisadas foram obtidos, 31 (36,9%) com resultado negativo para parasitose intestinal e 53 (63,09%) com resultado positivo (parasitadas), sendo que, 43 (51,19%) apresentaram quadro de positivos com um único parasita e 10 (11,9%) de positivos com mais de um parasita. Nas amostras positivas foram encontrados os seguintes parasitas: *Ascaris lumbricoides* com visualização em 20 amostras (23,8%); *Endolimax nana* em 18 amostras (21,4%); *Entamoeba coli* em 11 amostras (13,09%); *Giardia lamblia* em 7 amostras (8,3%); *Strongyloides stercoralis* em 5 amostras (5,95%) e *Enterobius vermicularis* em 2 amostras (2,38%). A prevalência de amostras positivas foi para o sexo feminino com 49 (58,3%), seguido de 35 (41,66%) para o sexo masculino. Conclusão: o presente trabalho buscou demonstrar que uma pesquisa deste tipo têm uma grande importância epidemiológica e estratégica para os serviços de saúde, visando uma maior proteção da população em geral.

PALAVRA-CHAVE:

[ECE093] -DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Kátia Oliveira Pereira Bastos

Célia Marcia Birchler

Baseado numa linha exploratória sobre a literatura científica, o estudo faz uma revisão bibliográfica de autores e artigos que discutem o tema Educação Permanente em Saúde (EPS) que se configura como estratégia político- pedagógica para o desenvolvimento dos trabalhadores de saúde e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Busca-se compreender amplamente o conceito de EPS e a organização dos serviços de saúde a partir de uma perspectiva de mudança na formação e no processo de trabalho dos profissionais e gestores. Portanto, mediante acordos e plano de trabalho afinado entre trabalhadores de diferentes níveis hierárquicos, a gestão estratégica e o controle social, é possível obter e demonstrar resultados na prática/experiência e os efeitos constatados nos serviços do SUS.

PALAVRA-CHAVE: Educação Permanente em Saúde. Formação dos Profissionais. Sistema Único de Saúde.

[ECE094] - PREVENÇÃO PRIMÁRIA: UMA ALTERNATIVA A SER TRABALHADA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Josana Alvarenga Fernandes

Rubens José Loureiro

O presente projeto apresenta uma proposta de intervenção prevendo a realização de trabalho socioeducativo, envolvendo atividades multidisciplinares nas áreas culturais e artísticas atuando em rede com ações junto a usuários de entidade social e suas famílias, objetivando intervir na temática acerca do uso de drogas lícitas e ilícitas em caráter preventivo. Localizada no Município da Serra/ES denominada PC NET, atuando junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Proteção Social Básica.