



# Encontro Científico da EMESCAM



## *Apresentação dos TCCs*

*Ano II - Volume II*

*2018*



**EMESCAM**

Tradição e Conhecimento em Saúde



Encontro  
Científico da  
**EMESCAM**

***Apresentação dos TCCs***

***Ano II - Volume II***

***2018***

## Sumário

[ECE001] - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA SAÚDE EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS.....	6
[ECE002] - DOENÇA DE CHAGAS: UM SÉRIO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA .....	7
[ECE003] - AÇÃO INTERFERENTE DE SUBSTÂNCIAS ANTIOXIDANTES NAS ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS ENVOLVENDO A REAÇÃO DE TRINDER .....	8
[ECE004] - DERMATITES OCUPACIONAIS DE CONTATO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .....	9
[ECE005] - A ANÁLISE DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE ...	11
[ECE006] - PERDA AUDITIVA E EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A SOLVENTES ORGÂNICOS: REVISÃO DE LITERATURA .....	12
[ECE007] - IMPACTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DE EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO .....	13
[ECE008] TUBERCULOSE LARÍNGEA : REVISÃO DE LITERATURA.....	14
[ECE009] ABORDAGEM CIRÚRGICA COM INTENÇÃO CURATIVA NO ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....	15
[ECE010] DOENÇA DE CROHN PERIANAL: REVISÃO DE LITERATURA .....	16
[ECE011] DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO PRECEDENDO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: RELATO DE CASO CLÍNICO. ....	17
[ECE012] SÍNDROME DE BURNOUT EM MÉDICOS BRASILEIROS: UMA REVISÃO DE LITERATURA .....	19
[ECE013] SÍNDROME DE POEMS: REVISÃO DE LITERATURA .....	20
[ECE014] TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA .....	21
[ECE015] TRATAMENTOS CONSERVADORES REALIZADOS ANTES DE CIRURGIA DE COLUNA .....	22
[ECE018] Distrofia muscular de Duchenne: relato de caso e revisão bibliográfica .....	25
[ECE019] JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E SEUS REFLEXOS NA GESTÃO HOSPITALAR.....	26
[ECE020] AS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES REALIZADAS PELO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE: Uma Revisão Integrativa .....	28
[ECE021] - PANORAMA DA SÍFILIS CONGÊNITA NO ESPÍRITO SANTO, NO ANO 2013.....	29
[ECE023] - ACOLHIMENTO A FAMÍLIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - REVISÃO DE LITERATURA .....	31
[ECE024] - AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO INSTRUMENTO DE CHECKLIST NO CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMPARANDO DOIS MODELOS ASSISTENCIAIS: INTEGRAL E FUNCIONAL .....	32
[ECE025] - CORRELAÇÃO DA DEPRESSÃO COM O SUICÍDIO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	33

[ECE026] - CUIDADOS PALIATIVOS: QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UMA ABORDAGEM HUMANIZADA.....	34
[ECE027] - FITOTERAPIA COMO ALTERNATIVA DE TERAPÊUTICA COMPLEMENTAR PARA O TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS .....	36
[ECE028] – “INFELIZMENTE O PACIENTE NÃO TEM MAIS JEITO”: VIVÊNCIAS DE FAMILIARES FRENTE ÀS FASES DE LUTO.....	38
[ECE029] – NEGLIGÊNCIA INFANTIL: OLHAR DA ENFERMAGEM .....	39
[ECE030] – O CUIDAR DA ENFERMAGEM AO PACIENTE ACOMETIDO DE BEXIGA NEUROGÊNICA PÓS TRAUMA RAQUIMEDULAR .....	41
[ECE031] – O PAPEL DO ENFERMEIRO NA HANSENÍASE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA .....	42
[ECE032] – SURTO DE VÍRUS ZIKA: AÇÕES DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL.....	43
[ECE033] – ANÁLISE DE EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA DO <i>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE</i> AOS BETA - LACTÂMICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	45
[ECE034] – AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL/ CIRCUNFERÊNCIA DE PESCOÇO COMO INSTRUMENTO DE TRIAGEM DE HIPERTENSÃO EM ADOLESCENTES.....	46
[ECE035] – Distrofia muscular de Duchenne: relato de caso e revisão bibliográfica .....	47
[ECE036] – ABORDAGEM CIRÚRGICA COM INTENÇÃO CURATIVA NO ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	48
[ECE037] – ACNE NA MULHER ADULTA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	49
[ECE038] – ANÁLISE DO CONTROLE GLICÊMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE APOIO AO DIABETES INFANTIL.....	50
[ECE039] – ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA, SOCIOECONÔMICA E A SATISFAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA.....	51
[ECE040] – AVALIAÇÃO DO USO DA RAZÃO CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA POR ESTATURA COMO PREDITORA DE EXCESSO DE PESO NA ADOLESCÊNCIA.....	52
[ECE041] – COLITE PSEUDOMEMBRANOSA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	53
[ECE042] – DELÍRIUM PÓS-OPERATÓRIO EM PESSOAS IDOSAS: FREQUÊNCIA, FATORES ASSOCIADOS E INFLUÊNCIA NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR.....	54
[ECE023] – DOENÇA DE CROHN PERIANAL: REVISÃO DE LITERATURA .....	55
[ECE044] – DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO PRECEDENDO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: RELATO DE CASO CLÍNICO .....	56
[ECE045] – OS VÍNCULOS DE TRABALHO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E A LONGITUDINALIDADE DO CUIDADO.....	58
[ECE046] – PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES .....	59
[ECE047] – SÍNDROME DE MCCUNE-ALBRIGHT: REVISÃO DE LITERATURA .....	60
[ECE048] – SÍNDROME DE POEMS: REVISÃO DE LITERATURA.....	61
[ECE049] – TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA .....	62

[ECE050] – TRATAMENTO CONSERVADOR DO TRAUMA FECHADO DE FÍGADO E BAÇO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .....	63
[ECE051] – TRATAMENTO DE SÍFILIS RECENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.....	64
[ECE052] – TROMBOFLEBITE FÚNGICA DO SEIO CAVERNOSO: ASPECTOS ANATÔMICOS, CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS .....	65
[ECE053] – TUBERCULOSE LARÍNGEA: REVISÃO DE LITERATURA.....	66
[ECE054] – ALONGAMENTO E AGULHAMENTO SECO NA FLEXIBILIDADE DE CORREDORES DE RUA.....	66
[ECE055] – PREMATURIDADE E SEU IMPACTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR...	68
[ECE056] – O SERVIÇO SOCIAL E A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS .....	69
[ECE057] – A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COM CÂNCER .....	70
[ECE058] – A EDUCAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DO INDIVÍDUO: UMA VISÃO RELACIONADA AOS EGRESSOS DO CURSO SERVIÇO SOCIAL – 1ª TURMA EMESCAM .....	71
[ECE059] – A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MERCADO DO TRABALHO: A EXPERIÊNCIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NAS APAES DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA .....	72
[ECE060] – A POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA .....	73
[ECE061] – ADOÇÃO TARDIA: EXPECTATIVAS E OBSTÁCULOS .....	74
[ECE062] – ANÁLISE DA INSTRUMENTALIDADE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE UMA EMPRESA PRIVADA EM VITÓRIA – ES.....	75
[ECE063] – AS MÃES DA APAE: DESAFIOS ENFRENTADOS COM A CHEGADA DOS (AS) FILHOS (AS) COM DEFICIÊNCIA .....	76
[ECE064] – DOENÇA DE ALZHEIMER: O CUIDADO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS E CUIDADORES .....	77
[ECE065] – EXPECTATIVAS DE FAMÍLIAS E DE CRIANÇAS NO PROCESSO DE ADOÇÃO.....	78
[ECE067] – INCLUSÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DA GRANDE VITÓRIA NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL .....	79
[ECE068] – A INSERÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS NO MUNDO DO TRABALHO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS.....	80
[ECE069] – O PROCESSO DE DESLIGAMENTO DE ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS: REFLETINDO SOBRE MAIORIDADE E AUTONOMIA .....	81
[ECE070] – POLÍTICA NACIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONHECENDO A EXPERIÊNCIA DO CENTRO POP DE VILA VELHA (ES) .....	82
[ECE071] – RELAÇÃO ENTRE CONSELHO TUTELAR E MÃES ADOLESCENTES IDENTIFICADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: APONTAMENTOS PARA UM DEBATE).....	83
[ECE072] - COMENTÁRIOS SOBRE LEGISLAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - A DIFERENÇA ENTRE ABONO E JUSTIFICATIVA DE FALTA .....	84

**[ECE001] - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA SAÚDE EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS**

Lidiane Pereira da Silva - Haydêe Fagundes Moreira Silva de Mendonça

O aumento da população e o consumo de bens geram uma enorme quantidade de resíduos de todos os tipos, domésticos, de atividades públicas e industriais. Esses materiais recebem denominação de lixo e sua eliminação, e possível reaproveitamento, são desafios a serem vencidos pela sociedade (SILVA; SOARES, 2004). O lixo hospitalar gerado em hospitais, clínicas, laboratórios e farmácias constituído de lixo comum (papel, restos de comida de refeitórios e cozinhas etc), resíduos infectantes ou de risco biológico (sangue, gaze, curativos, agulhas etc) e resíduos especiais (químicos, farmacêuticos e radioativos) também coloca em risco à saúde da população e do meio ambiente, caso não seja realizada uma gestão correta desse tipo de resíduo. A ausência da responsabilidade social dos geradores, bem como a falta de fiscalização, os elevados custos com o tratamento e a disposição adequada contribuem para o aumento dos impactos causados na natureza. Nesse sentido, o presente trabalho busca mostrar a importância da implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde em laboratórios de análises clínicas e informar sobre os impactos ambientais que esses resíduos geram, apontando as classes de riscos, através da análise da literatura publicada. Na maioria dos artigos analisados, os autores ressaltam a necessidade de capacitar os profissionais de saúde para o correto gerenciamento dos resíduos. Um caminho para solucionar a questão dos resíduos de serviços de saúde é o exercício do bom-senso, aliado com a educação e o treinamento dos profissionais de saúde, e o esclarecimento da população. É preciso, acima de tudo instituir políticas públicas, sérias, de controle e fiscalização que coíbam a irresponsabilidade de quem ainda não se conscientizou da importância de conservar o ambiente saudável.

**PALAVRA-CHAVE:** Lixo hospitalar. Gerenciamento de Resíduos da Saúde. Laboratório de Análises Clínicas. Fiscalização.

**[ECE002] - DOENÇA DE CHAGAS: UM SÉRIO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA**

Eugênia Soares Cesana - Adércio João Marqueзинi

O *Trypanossoma cruzi* é o agente etiológico da tripanossomíase americana, esquistotripanose ou Doença de Chagas. A sua transmissão pode ser através da transmissão vetorial (maior importância epidemiológica), da transfusão sanguínea, da transmissão congênita e através de transmissões ocasionais como, por exemplo, em acidentes de laboratório, através de transplante de órgãos de doador chagásico, transmissão via oral e através do coito. O *Trypanosoma cruzi* durante o seu ciclo biológico apresenta as formas amastigota, epimastigota e tripomastigota, ou de transição entre elas. A fase aguda da doença pode ser sintomática ou assintomática. Na fase crônica existem várias formas, dentre elas: forma indeterminada, forma cardíaca, forma digestiva, forma nervosa, doença de chagas transfusional, doença de chagas congênita (DCC). O diagnóstico pode ser realizado através de diferentes estratégias, dependendo da fase em que a doença se encontra. O tratamento específico da Doença de Chagas encontra-se ainda em sua etapa experimental. Os ensaios clínicos só revelaram, até agora, dois medicamentos (o Nifurtimox (Lampit) e o Benzonidazol (Rochagan)) a que os médicos poderão recorrer para o tratamento, embora se tenha demonstrado que esta atividade é parcial e ainda não se tenha demonstrado que qualquer deles produza a cura da tripanossomíase. A profilaxia da doença de Chagas está intimamente ligada à melhoria das condições de vida de nosso camponês, bem como a modificação do hábito secular de destruição da fauna e da flora. Atualmente as medidas que podem ser sugeridas são: melhoria da habitação, com adequada higiene e limpeza da mesma, combate ao triatomíneo por meio de inseticidas e outros métodos auxiliares e ainda controle dos demais mecanismos de transmissão.

**PALAVRA-CHAVE:** *Trypanosoma cruzi*. Doença de Chagas. Transmissão.

**[ECE003] - AÇÃO INTERFERENTE DE SUBSTÂNCIAS ANTIOXIDANTES NAS ANÁLISES  
CLÍNICAS LABORATORIAIS ENVOLVENDO A REAÇÃO DE TRINDER**

Bruno Santos da Silva - Adércio João Marqueзинi

A ação interferente de substâncias exógenas (medicamentos e alimentos) nas análises clínicas laboratoriais vem a constituir um fator que comprovadamente leva a falsos diagnósticos e a intervenções clínicas erradas. Diante de uma série de trabalhos publicados nos últimos anos que vêm demonstrando a ação interferente da vitamina C (ácido ascórbico) nas análises clínicas laboratoriais envolvendo reação de Trinder (sistema glicose oxidase-peroxidase), que é amplamente utilizada em laboratórios de análises clínicas de todo mundo para quantificação de parâmetros bioquímicos séricos estratégicos aos diagnósticos de uma série de patologias, torna-se de fundamental importância estabelecer se outras substâncias de propriedades físico-químicas semelhantes a da vitamina C também poderiam interferir de forma semelhante nos testes laboratoriais realizadas pela reação de Trinder. Entre essas substâncias de propriedades físico-químicas semelhantes a da vitamina C destacam-se as vitaminas A e E bem como os flavanóides por se tratarem de substâncias antioxidantes presentes em uma série de alimentos e medicamentos a serem utilizados no tratamento e prevenção de diversas enfermidades.

**PALAVRA-CHAVE:** “Ação interferente dos medicamentos nas análises clínicas laboratoriais”. “Fatores interferentes nas análises clínicas laboratoriais”. “Método glicose oxidase-peroxidase”. “Reação de Trinder”. “retinol”. “carotenóides”. “ $\beta$ -caroteno”. “tocoferóis”. “ $\alpha$ -tocoferol”. “vitamina A”. “vitamina E”. “flavanóides”.

**[ECE004] - DERMATITES OCUPACIONAIS DE CONTATO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Marcelo Rezende Sette – Maria das Graças Caus de Souza  
Maria da Penha Caus Simões

Tratou-se de uma revisão da literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os termos dermatoses ocupacionais, dermatite de contato, dermatite de contato alérgica e dermatite de contato irritativa. Foram encontrados 19 artigos, publicados entre 1982 e 2013. O objetivo era apresentar a discussão existente acerca das dermatites de contato alérgicas e por substâncias irritantes, além de identificar as principais substâncias alérgicas e irritantes causadoras de dermatite de contato ocupacional e apontar as principais medidas de prevenção das dermatites ocupacionais de contato. Foi possível notar que a maioria dos artigos abordava as dermatites alérgicas de contato e seus alérgenos (63,1%), com pequeno percentual de abordagens sobre a dermatite de contato irritativa (10,5%). O restante (26,4%) abordava os dois tipos de dermatite de contato ocupacional conjuntamente. As principais substâncias alergênicas e irritativas de origem ocupacional foram: o látex e os aditivos na fabricação de luvas de borracha (tiurans e carbamatos), afetando, principalmente os profissionais de saúde; a madeira; o cimento e os elementos que o compõem; os óleos de corte, solventes, graxas e outros agentes químicos das indústrias; o cromo; os agrotóxicos; os pêlos urticantes de aranhas caranguejeiras; e os cosméticos. As principais medidas preventivas sugeridas foram: a educação e orientação, inclusive no caso de já acidentados, para evitar reincidências; disponibilidade (empregador) e correto uso dos EPI (empregado); adaptações necessárias, como: troca de EPI com alérgenos por outro EPI sem alérgenos, troca de função e licença para tratamento de saúde; boas práticas de higiene pessoal; exames médicos periódicos; afastamento do fator irritante ou alergênico; adição de sulfato ferroso ao cimento para reduzir o cromo hexavalente a cromo trivalente, menos sensibilizante; automação industrial; e, por fim, maior conhecimento da temática. Sugere-se a realização de mais pesquisas sobre a temática estudada para possibilitar avanços na detecção, tratamento e prevenção das dermatites ocupacionais de contato.

**PALAVRA-CHAVE:** Dermatoses ocupacionais. Dermatite de contato. Dermatite de contato alérgica. Dermatite de contato irritativa.

**[ECE005] - A ANÁLISE DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE**

Vitor Arpini Mazoco - Maria das Graças Caus de Souza –  
Maria da Penha Caus Simões

O estresse laboral é uma das maiores preocupações nos hospitais, já que as consequências repercutem na saúde, na qualidade de vida e no bem-estar dos trabalhadores. Dentre eles o mais conhecido é a Síndrome de *Burnout* que afeta negativamente as carreiras e a vida pessoal dos indivíduos devido à enorme responsabilidade aliada ao comprometimento que a profissão pede. Os resultados revelam médicos comprometidos com a carreira sofrendo pressões vindas da relação com pacientes vulneráveis, do seu contexto de trabalho e da vida pessoal e familiar. Os principais sintomas de estresse detectados foram: nervosismo, irritabilidade, ansiedade, depressão e fadiga, agravados pelos problemas de infraestrutura e pelo atendimento de pacientes fora do perfil da área de trabalho. Os resultados das pesquisas estudadas evidenciam a necessidade da implantação de um serviço de apoio ao profissional da área da saúde que os ajudem a lutar contra as doenças da sociedade e atender às necessidades pessoais. É a síndrome do final do século atacando os trabalhadores do final do século

**PALAVRA-CHAVE:** Estresse. Saúde. Síndrome de *Burnout*

**[ECE006] - PERDA AUDITIVA E EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A SOLVENTES ORGÂNICOS:  
REVISÃO DE LITERATURA**

Cristóvão Giesen Falcão - Maria das Graças Caus de Souza  
Maria da Penha Caus Simões

A pesquisa teve por objetivo levantar dados bibliográficos sobre os efeitos dos solventes orgânicos no sistema auditivo quanto a exposição ocupacional, através de estudos comprovando sua toxicidade. Para a metodologia do estudo utilizou-se as técnicas de pesquisa bibliográfica de natureza descritiva. Dispõe a literatura que diversos solventes químicos têm sido utilizados por diversas indústrias, tornando- e evidente que a população exposta a esses componentes potencialmente tóxicos e não monitorados, podem contribuir para o desenvolvimento ou agravamento de perdas auditivas nos ambientes de trabalho. Os estudos apontaram que a exposição ao tolueno e do estireno demonstra efeito ototóxico, ou seja, dano ou perda da função auditiva em pesquisas com roedores e relatos com sujeitos humanos. O tolueno e o estireno apresentaram ototoxicidade aumentada na presença de ruído, demonstrando uma adição ou sinergismo dos fatores químicos de modo simultâneo aos fatores mecânicos que acabam por lesar células cocleares. Foi evidenciado que mesmo existindo legislações relativas aos limites de tolerância e concentração desses solventes, encontram-se ambientes de trabalho que excedem os Limites de Tolerância permitidos, causando riscos à saúde dos trabalhadores. Diante dos resultados apontados, surge como premissa, ter como alternativa de prevenção a realização de palestras informativas sobre agentes químicos, em especial os solventes orgânicos, presentes no ambiente de trabalho, cuidados diretos com o trabalhador, através do monitoramento biológico e uso de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual adequados , audiometria tonal e avaliação ambiental da concentração dos contaminantes. Vale ressaltar a necessidade de realização de testes que avaliem a audição central, como complemento para a audiometria tonal, identificando precocemente as sequelas causadas pela exposição ao ruído e aos produtos químicos.

**PALAVRA-CHAVE:** Toxicidade; Solventes Orgânicos; Perda Auditiva.

**[ECE007] - IMPACTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE INCLUÍDAS NO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DE EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO**

Larissa Barbosa Andrikopoulos – Maria das Graças Caus de Souza  
Maria da Penha Caus Simões

O objetivo da pesquisa foi abordar a importância das intervenções em promoção da saúde no ambiente do trabalho, como parte do PCMSO em uma empresa de alimentos localizada na Grande Vitória/ES. Trata-se de um estudo descritivo, de caráter exploratório, em empresa do ramo alimentício, fundada desde 1943, e hoje é constituída por grupos mercadológicos atuantes na área de alimentos. Foi aplicado um questionário, onde os sujeitos envolvidos fazem parte da área produtiva da empresa, totalizando 180 colaboradores. A pesquisa foi realizada no período de novembro a dezembro de 2014. Pelos dados pesquisados, pôde-se concluir que, a maioria era do sexo masculino (68%), com predominância de ensino superior completo (62%), casados (65%), maior percentual para os fumantes (42%), existe conhecimento a respeito da política antitabagismo na empresa (65%), 75% dos entrevistados tiveram algum tipo de problema de saúde que o levou a tentar parar de fumar; 62% fazem algum tipo de atividade física, mas 60% essa prática não alcança um total de 120 minutos por semana. 65% aumentou o peso neste último ano. 85% receberam orientações para perder peso, sendo que a empresa adotou/patrocinou/subsidiou programa contínuo de incentivo a alimentação saudável e controle de peso. 89% dos entrevistados buscam alcançar qualidade de vida e melhorar a autoestima. O PCMSO em estudo deve estar combinado a um esforço entre empregadores, trabalhadores e sociedade. O intuito é alcançar melhorias à saúde e bem-estar das pessoas no local de trabalho.

**PALAVRA-CHAVE:** Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Promoção da Saúde; Saúde do Trabalhador.

**[ECE008] TUBERCULOSE LARÍNGEA : REVISÃO DE LITERATURA**

Alice Bravim Fernandes Moça - Carolina Rocio Oliveira Santos - Juliana Maria  
Mendonça do Amaral Lages - Larissa Cecato Delunardo - Luiza Dias Torres –  
Moacir Soprani - Regina Célia Tonini

A Tuberculose é uma infecção crônica causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, prevalente no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Sua forma de acometimento mais comum é a pulmonar, apesar de ter potencial de causar doença em diversos sítios do organismo. A forma laríngea é raramente encontrada isolada, mas apresenta alta patogenicidade e infectividade. Portanto, é fundamental que essa patologia seja considerada no diagnóstico diferencial das doenças da laringe, principalmente em pacientes imunossuprimidos. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver discussões pertinentes à sua epidemiologia, quadro clínico, diagnósticos diferenciais e tratamento acerca desse tema.

**Palavras-chave:** Tuberculose laríngea. *Mycobacterium tuberculosis*. Diagnóstico.

**[ECE009] ABORDAGEM CIRÚRGICA COM INTENÇÃO CURATIVA NO  
ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA**

Claudio Medina Da Fonseca - Daniel Alves Loureiro - Eron Machado Cobe  
Lara Kneipp Costa Rossi

Atualmente nos EUA, o câncer pancreático ocupa o terceiro lugar nas causas de morte relacionada ao câncer, sendo a maioria, cerca de 90%, do tipo adenocarcinoma ductal pancreático. Destes, mais de dois terços estão localizados na cabeça do pâncreas. O câncer pancreático é uma das neoplasias mais agressivas e de difícil tratamento, apresentando uma sobrevida média de seis meses após o diagnóstico e uma sobrevida em 5 anos de 5 a 7%. Isso se deve principalmente à sua biologia molecular agressiva, apresentando rápida progressão e ao diagnóstico tardio da malignidade, que ocorre na maioria dos casos. A única opção curativa para o adenocarcinoma ductal pancreático é a ressecção cirúrgica, entretanto, menos de 20% dos paciente ao serem diagnosticados são candidatos a cirurgia. Essa era associada a uma mortalidade perioperatória significativa, entretanto, com os avanços das técnicas cirúrgicas e cuidados perioperatórios, a mortalidade vem caindo em centros com grande volume de cirurgias. Tendo isso em vista, o trabalho pretende informar tanto ao clínico quanto o cirurgião sobre a doença, para que o diagnóstico seja realizado o mais precocemente possível e quando houver a possibilidade, abordada cirurgicamente da melhor forma possível. Foi realizada uma revisão de literatura sobre a abordagem cirúrgica com intenção curativa do adenocarcinoma ductal de cabeça de pâncreas usando artigos encontrados no scielo, pubmed e clinicalkey.

**Palavras-chave:** Neoplasias pancreáticas, pancreatoduodenectomia, carcinoma ductal pancreático

**[ECE010] DOENÇA DE CROHN PERIANAL: REVISÃO DE LITERATURA**

Lohana Soares Figueiredo - Natália Abrantes Grossi - Fabiano Quarto Martins  
Bruna Rodrigues Brandolini - Ana Paula Hamer Sousa Clara

As manifestações anais e perianais da doença de Crohn são muito comuns e o comprometimento dessa região pode se manifestar bastante acentuado e debilitante. O comprometimento perianal apresenta-se frequentemente com abscessos e fístulas, que costumam ser múltiplas, complexas e recorrentes. Esta revisão apresenta a anatomia do esfíncter anal necessária para o atendimento desta patologia, métodos de imagem, classificação e tratamento. Os novos tratamentos para a doença de Crohn perianal estão agora disponíveis e têm a promessa de controlar melhor a sepse e manter a continência fecal. As diferentes modalidades de tratamento são selecionadas com base na anatomia da fístula, nas características do paciente e nos objetivos de manejo (controle de fechamento ou de sepse).

**Palavras-chave:** Doença de Crohn. Fístulas perianais. Incidência. Diagnóstico. Tratamento.

**[ECE011] DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO PRECEDENDO LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: RELATO DE CASO CLÍNICO.**

Caio Guimarães Araújo - Carolina Zorzanelli Costa - Moacir Soprani - Raquel Altoé  
Regina Célia Tonini - Thaís Pires Silva Pereira - Valquiria Dinis

**Objetivo:** Revisar a literatura dando ênfase na importância do seguimento da doença de Kikuchi-Fujimoto e descrever a história, o diagnóstico e o tratamento dessa enfermidade a partir de um relato de caso de uma paciente atendida no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória – ES. **Método:** Consulta de prontuário informatizado e revisão bibliográfica, na qual foram consultadas as seguintes bases de dados: PubMed, MEDLINE e SciELO, sendo selecionados artigos publicados entre os anos de 1972 e 2014. **Resultado:** Relatamos o caso de uma mulher de 26 anos, que deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória por apresentar, há 40 dias, os seguintes sinais e sintomas: mialgia, poliartralgia, febre não aferida, náuseas, vômitos e lesões descamativas e pruriginosas difusas. Antes da admissão nesse hospital, a paciente esteve internada em outro serviço hospitalar com quadro de anasarca, linfadenopatia generalizada e bicitopenia. O quadro clínico evoluiu com trombose venosa profunda em membro superior direito, que complicou com tromboembolismo pulmonar, sendo iniciado anticoagulação plena. Também evoluiu com piora da função renal e com nodulação endurecida e dolorosa em região glútea esquerda. Paciente foi transferida para o Hospital Santa casa de Misericórdia, onde foi admitida com insuficiência renal aguda, manutenção da trombose venosa profunda e celulite em membro superior direito, anasarca, linfadenopatia generalizada e abscesso em região glútea esquerda. Submetida à drenagem da coleção, que revelou saída de secreção hemática. Biópsia excisional do gânglio axilar esquerdo demonstrou hiperplasia linfocítica atípica. Imunohistoquímica foi solicitada para confirmação diagnóstica. Após melhora clínica, a paciente recebeu alta hospitalar e foi encaminhada para acompanhamento clínico ambulatorial. O resultado do exame imunohistoquímico apresentado na consulta ambulatorial confirmou doença de Kikuchi-Fujimoto. Após um semestre de remissão da doença, paciente apresentou critérios suficientes para que fosse realizado o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico.

**Palavras-chave:** Linfadenite histiocítica necrosante. Linfadenite. Lúpus Eritematoso Sistêmico.

## [ECE012] SÍNDROME DE BURNOUT EM MÉDICOS BRASILEIROS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Henrique Novaes Rodrigues - Henrique Rodrigues da Silva Dalzini - Thiago Dalleprane Cavalcante - Denise Rozindo Bourguignon - André Carnevali da Silva  
Henrique César Pontini de Castro Alves

**Objetivo:** Realizar uma análise da literatura nacional e internacional relativa à Síndrome de Burnout em médicos brasileiros. **Métodos:** Trata-se de um estudo do tipo revisão narrativa de literatura com utilização da base literária de dados. Como critérios de inclusão: médicos de qualquer especialidade em sua rotina de trabalho no Brasil. Adotou-se como critério de exclusão: artigos de revisão de literatura, relatos de caso e metanálises, assim como artigos que não se tornam pertinentes ao estudo desenvolvido. A amostra foi composta de 15 trabalhos com seus resultados demonstrados também através de tabelas. **Resultados:** A caracterização da Síndrome de Burnout foi feita utilizando o questionário Maslach Burnout Inventory em 14 dos 15 artigos estudados (93,3%). Em relação à exaustão emocional, os artigos abordados trouxeram valores percentuais de níveis elevados, no intervalo de 23,1% a 69,1% (mediana de 47,5%), em relação à despersonalização os artigos abordados trouxeram valores percentuais de níveis alterados no intervalo de 24,2% a 96,1% (mediana de 31,8%), em relação à realização profissional os artigos abordados trouxeram valores percentuais de níveis alterados, no intervalo de 11,8% a 94,6% (mediana de 28,3%). O ambiente de trabalho se demonstrou predominantemente hospitalar, tendo todos artigos analisado profissionais que trabalham nestes locais. Tratando-se do gênero, sete estudos (46,6%) demonstraram prevalência do sexo feminino na amostra e oito estudos (53,3%) demonstraram prevalência do sexo masculino. **Conclusão:** A Síndrome de Burnout possui elevada prevalência entre os médicos brasileiros nos estudos publicados, em suas três dimensões, acometendo heterogeneamente nas diferentes especialidades. As estratégias positivas de enfrentamento e prevenção das tensões decorrentes do trabalho devem ser estimuladas a fim de melhorar as perspectivas de saúde no cotidiano laboral do médico.

**Palavras-chave:** Médicos brasileiros. Síndrome de Burnout. Estresse ocupacional.

### [ECE013] SÍNDROME DE POEMS: REVISÃO DE LITERATURA

Lucas Santos Bravin - Marcele Henriques Lougon - José Antônio Fiorot Junior

Maria das Graças da Silva Mattede

A síndrome de POEMS é uma entidade clínica rara, de acometimento sistêmico e desenvolvimento indolente. Consiste na presença concomitante de polineuropatia periférica, organomegalias, endocrinopatias, desordem monoclonal de plasmócitos, e alterações cutâneas, sendo a idade média dos pacientes com a síndrome de 50 anos e mais prevalente em homens (63%). Devido ao acometimento sistêmico e a diversidade de manifestações clínicas é fundamental o acompanhamento médico multiprofissional visando melhor otimização do tratamento. Para ampliar o conhecimento sobre o assunto idealizou-se uma revisão de literatura descritiva dos aspectos clínicos, critérios diagnósticos e tratamento da síndrome de POEMS. Estudo qualitativo, descritivo, em bases de dados como Pubmed, LILACS, SciELO, BIREME e Biblioteca Virtual da Saúde. A fisiopatologia da síndrome não está completamente estabelecida, mas estudos mostram relação da doença com aumento dos níveis séricos de citocinas. O tratamento padrão parcialmente indefinido, mas com opções terapêuticas, dentre eles corticosteroides, radioterapia, quimioterapia e transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas. O tratamento recente mais promissor tem sido o bevacizumab, um anti-VEGF que também pode ser utilizado como um marcador de resposta terapêutica. O bortezomib em baixas doses, associado a ciclofosfamida e dexametasona, tem sido uma nova opção terapêutica para pacientes com intolerâncias ou contraindicações à outras terapias. A ampliação do conhecimento médico no que diz respeito ao reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, estabelecimento do diagnóstico diferencial e tratamento adequado da síndrome de POEMS são relevantes para o prognóstico do paciente e continuação de estudos futuros.

Palavras chaves: Síndrome. POEMS. Polineuropatia. Gamopatia monoclonal.

**[ECE014] TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**

Carolina de Melo- Jéssica Peroni Custódio - Rafaella de Nadai --Felipe Bertollo Ferreira - Ana Paula Hamer Sousa Clara - Maria Das Graças da Silva Mattede

**Introdução:** A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma condição de alta prevalência e com um efeito significativo na qualidade de vida da população. É uma doença de etiologia multifatorial, incluindo alterações no eixo cérebro-intestino e na motilidade intestinal, porém, ainda não foi completamente elucidada. Dados recentes apontam sobre uma relação importante da disbiose intestinal na patogênese da SII. O transplante de microbiota fecal (TMF) tem a condição de reestabelecer a homeostase intestinal. **Objetivos:** Este trabalho objetiva a revisão de publicações científicas que associam o uso do TMF no tratamento da SII, para a posterior análise de sua eficácia terapêutica. **Metodologia:** A busca literária foi realizada no acervo MEDLINE, através do PubMed, onde angariamos 120 artigos. Através de critérios de inclusão e exclusão sobraram 9 publicações que foram analisadas. **Resultados:** A partir da análise dos estudos, um total de 91 pacientes foram avaliados. O tratamento revelou melhora sintomática em 85.71% dos casos. As diferenças ente os 9 estudos inclusos devem ser levadas em consideração. Não houve homogeneidade entre modelos, vias e uso do antibiótico pré-TMF. **Conclusão:** O TMF se mostrou eficaz no tratamento da SII, porém são necessários estudos clínicos com maior impacto científico para concretizar esta nova modalidade terapêutica. .

**Palavras-chave:** “Síndrome do Intestino Irritável”, “Transplante de Microbiota Fecal” e “Microbiota Intestinal”.

## **[ECE15] TRATAMENTOS CONSERVADORES REALIZADOS ANTES DE CIRURGIA DE COLUNA**

Lucas Alves Nemer - Marcello Moro Queiroz - Mitre Kalil Junior - Mitre Kalil –  
Thiago Rampazzo Pancini - Guilherme Carvalho Moitinho

São estimados que 18,5% da população brasileira, cerca de 27 milhões de pessoas, sejam acometidos por doenças crônicas de coluna, sendo considerada uma das doenças mais prevalentes no país e no mundo. O tratamento indicado para a maior parte das afecções, inicialmente, é conservador. Apesar de existirem consensos e diretrizes de evidências para orientar a tomada de decisão das abordagens a serem utilizadas, nem sempre é identificado o uso das mesmas pelos profissionais. Uma das dificuldades atuais é encontrar meios que avaliem e acompanhem o que é realizado durante programas de reabilitação empregados na prática clínica no Brasil, seja no setor privado ou público, fora dos cenários de pesquisas. O intento deste estudo foi identificar a abordagem fisioterapêutica a que pacientes indicados à cirurgia da coluna vertebral foram submetidos anteriormente, e se os mesmos tiveram tratamento pelo tempo mínimo preconizado pelas evidências atuais. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado uma pesquisa bibliográfica sobre o que tem-se de eficácia na literatura para tratamento das principais afecções da coluna dentro do âmbito fisioterapêutico e a influência do tratamento adequado no curso das mesmas, seja na melhora dos sintomas, qualidade de vida ou na redução de custos com tratamento e afastamentos do trabalho. No estudo de campo, realizado com pacientes encaminhados a cirurgia no setor de Ortopedia e Traumatologia de um hospital da Grande Vitória, os pacientes foram avaliados através de formulário, elaborado para identificar as terapias realizadas durante o tratamento. Trata-se de um estudo transversal, com uma amostra de 32 pacientes com idade entre 18 e 60 anos. Acreditamos que muitos destes indivíduos abordados, poderiam ter tido um melhor acompanhamento, com atendimento melhor fundamentado, baseado em evidência, o que é a tendência no mundo inteiro; além de possível mudança no desfecho da doença, podendo-se evitar um tratamento cirúrgico, visto que a maioria não realizou tratamento conservador com as melhores recomendações da literatura.

**Palavras-chave:** coluna vertebral, cirurgia de coluna e tratamento conservador.

**[ECE016] TROMBOFLEBITE FÚNGICA DO SEIO CAVERNOSO: ASPECTOS ANATÔMICOS, CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS**

Antonio Francisco Loss Possatti - Douglas Gonçalves Bento - Lucas Loss Possatti -  
Henrique Faria Ramos - Hildegardo Rodrigues

**Objetivo:** Descrever um caso raro de tromboflebite fúngica do seio cavernoso secundário a mucormicose rinocerebral, com ênfase nas manifestações clínicas, descrições radiológicas e ressaltando a importância do conhecimento anatômico. **Método:** Estudo do tipo relato de caso com revisão de literatura. Informações obtidas em prontuário, exames e entrevista com o paciente. Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, número 1.865.033. **Relato de caso:** Relatamos caso de um homem, 54 anos, com diagnóstico definido após resultado do histopatológico de mucormicose rinocerebral complicada com tromboflebite fúngica do seio cavernoso direito. O paciente recebeu tratamento para doença de base, com remoção do foco infeccioso primário e anfotericina B. A tromboflebite fúngica do seio cavernoso é uma enfermidade rara, de prognóstico ruim e muitas vezes fatal quando diagnosticada tardiamente. O diagnóstico e tratamento precoce dessa doença, quando instituído, melhora a probabilidade de sobrevivência do doente.

**Palavras-chave:** Mucormicose. Tromboflebite. Seio cavernoso. Rinossinusite fúngica invasiva. Sinusite fúngica.

**[ECE017] ANÁLISE DE EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA DO *STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE*  
AOS BETA - LACTÂMICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Caio Santiago Ferreira Coelho - Yuri Duarte Polyacove - Maria das Graças da Silva  
Mattede - Henrique Tommasi Neto - Firmino Braga Neto

Introdução: Infecções por *Streptococcus pneumoniae* são prevalentes na população, e por vezes são causadas por cepas com resistências a antibióticos, assim se faz necessário o diagnóstico precoce e tomada de conduta correta por parte do médico. Objetivo: Verificar, segundo a literatura, qual o mecanismo de resistência do pneumococo aos antibióticos beta - lactâmicos, e quais as opções terapêuticas adequadas frente à resistência desse patógeno. Metodologia: Revisão de literatura descritiva utilizando trabalhos científicos das bases de dados da área da saúde, informações científicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Centers for Disease Control and Prevention e livros textos. Revisão da literatura: O mecanismo de resistência do pneumococo aos beta-lactâmicos é a mudança do alvo de ligação da droga, o que pode ocorrer a partir de mutação genética ou aquisição do material genético de outros *Streptococcus spp.*, formando assim uma resistência heterogênea. Dessa forma, na suspeição de resistência, a cultura de material biológico deve ser feita, para determinar a concentração inibitória mínima e por consequência o padrão de resistência do patógeno. Essas informações, quadro clínico e história patológica pregressa do paciente, colaboram para o médico escolher o antimicrobiano adequado. Considerações finais: A resistência do *S. pneumoniae* à beta - lactâmicos tornou-se uma realidade, principalmente a partir da década dos anos noventa. Mas, ainda assim, essa classe de medicamento é considerada de escolha no manejo inicial de infecções pneumocócicas. Deve-se atentar a possibilidade de resistência e falha terapêutica, principalmente nos casos de doença invasiva.

Palavras-chave: *Streptococcus pneumoniae*. Antibacterianos. Penicilinas.  
Cefalosporinas

[ECE018] Distrofia Muscular de Duchenne: Relato de Caso e Revisão Bibliográfica

Gabriel Ferri Baltazar - Isabela Bittencourt Coutinho Lopes - Lucas Santos Bravin -  
Maria Angélica Santos Novaes - Rosana Arpini Pagung - José Carlos Novaes

Descrita pela primeira vez em 1858 pelo neurologista francês, Guillaume Duchenne, a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma patologia decorrente de alterações na síntese de distrofina em função de mutações genéticas, podendo levar à quebra da fita de leitura ou *stop codon* prematuro através de deleções, inserções ou duplicações. Em dois terços dos casos, tais mutações são herdadas da mãe, portadora assintomática, enquanto no terço restante é decorrente de mutação nova. Relata-se um caso de um paciente de 12 anos, com diagnóstico de DMD realizado aos 6 anos e 9 meses de idade, apresentando achados físicos exuberantes como hipertrofia de panturrilha, marcha escarvante, sinal de Gowers e fraqueza muscular proximal, entre outros. Além disso, apresentava dosagens de creatinoquinase elevada, biópsia muscular e estudo genético compatível. Com base nesse relato, são comentados aspectos de tratamento não farmacológicos e farmacológicos habituais, bem como novas abordagens terapêuticas através de revisão bibliográfica da literatura atual.

**Palavras-chave:** Distrofia Muscular de Duchenne; Distrofina; Células musculares esqueléticas.

## [ECE019] JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E SEUS REFLEXOS NA GESTÃO HOSPITALAR

Diego Peixoto Santos Costa - José Francisco Milagres Rabello – Fábio Marçal Vasconcellos - César Albenes de Mendonça Cruz

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a chamada constituição cidadã, houve uma ampliação dos direitos da população, dentre eles o direito a saúde a assistência médica, incluindo ainda como dever do Estado garantir este direito mediante políticas sociais e econômicas. Tal direito está positivado em vários artigos da Constituição, dentre eles o artigo 6º, contido no Capítulo inerente aos direitos Sociais, bem como no artigo 196 Em razão da grande dificuldade da Administração Pública em efetividade a este direito para toda a população, através da prestação de assistência médica, incluindo a assistência farmacêutica, iniciou-se no Brasil um fenômeno denominado Judicialização da Saúde. Com o aumento do acesso a informação por parte da população e com outra garantia constitucional, o de acesso à justiça, tornou-se cada vez maior o ajuizamento de demandas pleiteando vagas para internação, fornecimento de medicamentos e tratamentos, dentre outros pedidos. Esta crescente demanda vem gerando para o Estado um gasto elevado para o cumprimento das decisões judiciais, fazendo com que parte da verba destinada à área da saúde seja destinada para tal fim. Em decorrência disso, gerou-se um embate entre o individual x coletivo, já que a verba destinada para cumprimento de decisões judiciais, que atendem o interesse em sua grande maioria de apenas um indivíduo, poderia estar sendo destinada para o fortalecimento e/ou criação de outras políticas públicas voltadas para a área da saúde que atenderiam grande parte da população. O foco de estudo será direcionado a entender melhor o evento da judicialização da saúde, principais demandantes, pedidos, os reflexos das decisões no Estado, no orçamento e políticas públicas da saúde e de que forma o Estado (Judiciário e Executivo). Tal pesquisa tem particular importância tendo em vista o forte reflexo que tal fenômeno vem causando na sociedade, uma vez que traz à tona o embate entre o individual e o coletivo, gerando o questionamento acerca da destinação da verba pública, bem como da forma com que o Estado vem agindo, inclusive na gestão hospitalar, que ao longo do tempo vem se buscando diversas maneiras de gerir os hospitais públicos, inclusive através das Organizações Sociais. Estudar a judicialização, seus reflexos nas políticas públicas da saúde, em especial no

Espírito Santo, e como o poder público vem agindo, trará um maior conhecimento sobre o tema, o que possibilitará a adoção de novas medidas, ou até mesmo a adequação das medidas já utilizadas. Através de uma revisão bibliográfica, bem como análise de dados da Secretária de Saúde e Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a presente pesquisa pretende se constituir em instrumento de estudo para a comunidade, que envolve a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo e o Poder Judiciário, revelando os impactos e reflexos da judicialização da saúde nas políticas públicas, inclusive nas formas de gestão hospitalar e de que forma o Estado( Poder Judiciário e Executivo) vem atuando para minimizar os impactos para a sociedade, sem deixar de atender as demandas individuais.

**Palavras Chave:** Judicialização da saúde – Gestão Hospitalar – Terceiro Setor

**[ECE020] AS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES REALIZADAS PELO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE: Uma Revisão Integrativa**

Marlucia Santana dos Anjos - Francine Alves Grativál Raposo –  
Jaçamar Aldenora dos Santos

Introdução: O câncer é uma doença que vem crescendo muito rápido, na população, e estar muito ligada tanto aos fatores internos como externos, e neste último é possível intervir, com medidas de prevenções junto à comunidade. O estudo trata de uma revisão de literatura a respeito como são desenvolvidas as orientações de prevenção realizadas pela enfermagem sobre o câncer de pele na população. Objetivo: Descrever a atuação de enfermagem na prevenção do câncer de pele Método: Revisão de literatura realizada na base de dado Nacional da Biblioteca Virtual em Saúde-BVS no mês de maio do corrente ano. Empregando os seguintes descritores em saúde – De CS Câncer de pele AND Prevenção AND Enfermagem, resultou em 229 artigos, iniciou-se uma seleção com identificação dos artigos, utilização de critérios de inclusão e exclusão, depois da leitura chegando-se a um produto final de 4 artigos. Resultados: Identificou-se a falta do uso de fatores de proteção pelo desconhecimento; O rastreamento pelos profissionais de enfermagem influencia positivamente na prevenção da doença; O registro sobre as características anormais na pele ajudou a revelar a deficiência das campanhas de prevenções influenciando diretamente no aumento desse agravo na população; A falta de orientação sobre os riscos, na classe de trabalhadores. Discussão: Evidenciou-se que a intervenção da enfermagem nas ações de prevenção nos diagnósticos precoces do câncer de pele, influencia positivamente para a sua redução, no qual pode ser um diferencial junto às medidas de prevenções. Destacando como uma das estratégias o trabalho em grupo, destacando focando nas ações de educação, sensibilizando a comunidade sobre as medidas de prevenção sobre o câncer de pele, e como também outros tipos de câncer juntamente com os vários segmentos da sociedade. Considerações finais: A enfermagem pode influenciar positivamente para a prevenção câncer de pele por meio da orientação e educação in locus junto à população.

Palavra-chave: Câncer de pele, prevenção, enfermagem.

**[ECE021] - PANORAMA DA SÍFILIS CONGÊNITA NO ESPÍRITO SANTO, NO ANO 2013**

Caroline Deteman Bittencourt- Ingrid Zacché Callegari - Silvia Christina Silva Costa  
Priscilla Rocha Araújo Nader - Solange Rodrigues da Costa - Cristina Santos Ribeiro

Introdução: Devido ao aumento do número de casos de Sífilis e de Sífilis Congênita no Espírito Santo, buscou-se realizar um panorama da SC no estado, no ano de 2013. A fim de ofertar informações científicas aos gestores e profissionais da área da saúde para o planejamento de ações intervencionistas baseadas na realidade de cada região de saúde. Objetivo: Identificar o panorama da sífilis congênita nas Regiões de Saúde do Estado do Espírito Santo, no ano de 2013, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Método: Estudo transversal, descritivo e com abordagem quantitativa, que avaliou epidemiologicamente a frequência de casos registrados de Sífilis Congênita, no recorte geográfico formado pelas regiões de saúde do estado do Espírito Santo, no ano de 2013. A coleta de dados foi realizada através do banco de dados dos casos de sífilis congênita notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), DATA-SUS, que constitui uma amostra de 133 casos notificados. Resultados: Nota-se que 44,36% das mulheres da amostra possui baixa escolaridade, sendo a Região Norte com maior percentual (75%). Verificou-se que a Região Central foi a que obteve maior índice de mulheres que realizaram o pré-natal (84,62%), o que nos leva a refletir sobre sua qualidade, já que todas as mulheres estudadas tiveram RNs com Sífilis Congênita. Considerando acompanhamento pré-natal das gestantes com sífilis, observou-se predomínio do diagnóstico tardio, no momento do parto ou curetagem, sendo que os maiores índices foram nas Regiões Norte (50%) e Sul (57,14%). Esse cenário evidencia falhas no processo do pré-natal, levando ao tratamento inadequado da doença. Observou-se que nas 4 Regiões a maioria dos parceiros não foram tratados (69,92%). Nas Regiões Norte e Sul verificou-se o maior índice de RNs com Sífilis Congênita Recente (100% e 95,02% respectivamente). As Regiões Metropolitana e Central foram as únicas em que os RNs evoluíram a óbito devido a Sífilis Congênita. Conclusão: Visto que a transmissão vertical da sífilis tem aumentado e sido considerada um grave problema de saúde pública, é imprescindível

que a qualidade da atenção ao pré-natal e a educação em saúde sejam valorizadas e utilizadas como principais estratégias para a redução de casos desse agravo.

Palavra-Chave: Sífilis Congênita; Cuidado Pré-Natal; Atenção Primária à Saúde.

**[ECE023] - ACOLHIMENTO A FAMÍLIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - REVISÃO DE LITERATURA**

Amanda Modesto Monteiro - Patrícia Corrêa de Oliveira Saldanha  
Rubens José Loureiro - Renato Vidal de Oliveira

A hospitalização na UTI ainda está associada ao fim da vida e não à recuperação da saúde, e por tal é considerada como acontecimento estressante. O acolhimento na UTI deve ser uma diretriz, que contribui no estado de saúde de usuários e familiares sendo compreendido como uma ação de aproximação entre usuário e profissional de saúde, que realiza escuta qualificada, considerando suas queixas, medos e expectativas dos familiares. Objetivo: Realizar revisão bibliográfica referente ao acolhimento a família na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) realizado pelo enfermeiro como estratégia de cuidado de enfermagem. Método: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, onde foram inseridos como fundamentação 11 artigos brasileiros da biblioteca virtual LILACS e Portal CAPES dos últimos 10 anos. Resultados: Da análise temática emergiram as categorias: A internação na UTI; A humanização do cuidado de enfermagem; Necessidades da família que possui ente querido internado na UTI (sentimentos e sensações da família; comunicação profissional / família) e Processos de acolhimento da família realizado por enfermeiro. Conclusão: Compreendemos que esta revisão possa contribuir com novos estudos e também provocar reflexões sobre o tema acolhimento de pacientes e familiares realizado por enfermeiros em UTI, motivando a revisão desse processo de trabalho.

Palavra-chave: Acolhimento, Enfermagem, Família, UTI.

**[ECE024] - AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE DO INSTRUMENTO DE CHECKLIST NO CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO, USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMPARANDO DOIS MODELOS ASSISTENCIAIS: INTEGRAL E FUNCIONAL**

Lorrainy Lopes Berti França - Lorran Ferreira do Rego - Stephanie Oliveira de Araújo  
Cristina Ribeiro Macedo - Caroline Feitosa Dibai de Castro - Rosa Maria de Souza  
Barbosa de Melo

Os erros de medicação, de forma geral, correspondem a 30% dos erros em hospitais, segundo o Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, por essa razão o Programa de Segurança do Paciente da OMS lançou o Terceiro Desafio Global para a Segurança do Paciente, com foco na segurança de medicamentos. Diante da possibilidade de prevenção de práticas errôneas na medicação e do risco de dano em função da sua ocorrência, torna-se de extrema relevância identificar a natureza e determinantes dos erros, como forma de dirigir ações para a prevenção. O presente estudo tem por objetivo evidenciar a aplicabilidade do Checklist na avaliação da qualidade na assistência de enfermagem prestada em um Hospital Filantrópico de ensino, do município de Vitória/ES, no que tange à administração de medicamentos conforme recomendações do protocolo de Segurança, uso e administração de medicamentos do Ministério da Saúde (MS), de acordo com os cinco certos da medicação. Trata-se de um estudo quantitativo, retrospectivo partir de informações coletadas do banco de dados do Núcleo de Segurança do Paciente, da Qualidade do hospital, que objetiva avaliarmos a efetividade do instrumento. Conclui-se que a diferença no modelo assistencial de trabalho, seja integral ou funcional, demonstra determinada discrepância nos indicadores coletados, contribuindo como instrumento auxiliador da melhoria assistencial.

Palavra-Chave: Segurança do paciente; Cinco certos da medicação; Correta administração de medicação.

**[ECE025] - CORRELAÇÃO DA DEPRESSÃO COM O SUICÍDIO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Marcela Moura Paszczuk - Maria Carlota de Rezende Coelho - Ana Catarina Tavares Loureiro - Cristina Ribeiro Macedo - Rubens José Loureiro

O objeto do estudo versa sobre a correlação da depressão com o suicídio. Os objetivos foram identificar se o ato suicida esta correlacionado com o transtorno depressivo; verificar se a enfermagem tem abordado o tema suicídio e se a mesma o entrelaça com a depressão. Trata-se de uma Revisão Bibliográfica com estabelecimento de prioridades incluindo critérios para à seleção e ao tamanho da amostra, recorte temporal seleção de 14 artigos, publicados entre 2008 e 2016 em idiomas inglês e ou português. Os resultados obtidos são forte evidencia da correlação entre a depressão e o suicídio de forma direta ou indireta; O não tratamento dos transtornos psíquicos estão associados ao risco, tentativas e atos suicidas propriamente ditos nos diversos grupos da sociedade. Concluiu-se que a identificação e tratamento adequado dos transtornos psíquicos predisõem a menores riscos de tentativas de suicídios, melhoria em saúde mental, menor índice de atos suicidas concluídos. Fatores relacionados a conhecimentos sobre o tema ressaltam a importância da análise realizada, onde a partir de autópsias cerebrais dessas vítimas foi observado uma redução do fator neurotrófico do cérebro no córtex pré-frontal, caracterizando por sua vez de forma biológica fatores que predisõem o ato suicida.

Palavra-Chave: Suicídio. Depressão. Enfermagem. Saúde mental.

**[ECE026] - CUIDADOS PALIATIVOS: QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA UMA ABORDAGEM HUMANIZADA**

Alexandre Tresmann Prezilius - Luana Marques Ribeiro - Sérgio Kiepert Rocha  
Fabiana Rosa Neves Smiderle - Rubens José Loureiro  
Patrícia Correa de Oliveira Saldanha

**INTRODUÇÃO:** Apesar do processo de morte e morrer ser algo inerente à condição humana, diante da morte a humanidade sente-se extremamente desconfortável, fazendo brotar sentimentos conflitantes e dolorosos. Tentando amenizar tal situação, os cuidados paliativos surgem como um tratamento promissor para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, cuja terapêutica não visa mais a cura. **OBJETIVOS:** Conhecer como a equipe de enfermagem aborda a morte e o morrer no local de trabalho, identificando como está a sua preparação para prestar assistência a pacientes em cuidados paliativos. Caracterizar a capacitação dos profissionais de enfermagem em relação aos cuidados paliativos e detectar fatores que interferem nesses cuidados. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa realizada através de consulta à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), onde foram encontrados 16 artigos, publicados nos anos de 1999 a 2015. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise dos artigos demonstra que apesar da singularidade com que cada família reage à perda de um ente querido, as experiências se manifestam por sensações parecidas: aflição, incertezas, dificuldades e a equipe de enfermagem precisa identificá-las para poder acolher. Dessa forma é necessária uma mudança de paradigma sobre o processo de morte e morrer, tendo a educação permanente e continuada um papel relevante neste processo. **CONCLUSÃO:** Os resultados do estudo evidenciam a relevância dos cuidados paliativos na assistência ao paciente fora de possibilidade de cura e aos seus familiares, bem como a necessidade da renovação dos currículos dos cursos de graduação em enfermagem. É necessário que o tema seja trabalhado pela educação permanente e continuada nas instituições de saúde, que devem disponibilizar serviço de apoio para toda equipe de enfermagem. A sociedade precisa conhecer os princípios dos cuidados paliativos e passar a exigir serviços que prestem assistência de qualidade embasada na abordagem paliativa, fazendo o resgate da dignidade da vida, e que possibilitem a promoção de um

conforto para o indivíduo no momento da morte, garantindo que esta seja tranquila e digna.

Palavra-Chave: Enfermagem. Cuidados paliativos. Humanização da assistência. Morte.

**[ECE027] - FITOTERAPIA COMO ALTERNATIVA DE TERAPÊUTICA COMPLEMENTAR PARA O TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS**

Ana Cristina Galvani de Castro - Karina Degen dos Reis - Vinícius Mengal  
Italla Maria Pinheiro Bezerra - Bruno Henrique Fiorin

Introdução: Atualmente, de forma crescente, são profissionais, instituições, e indústrias, se empenhando e buscando a excelência para proporcionar ao portador de lesões, um tratamento eficaz. O uso de plantas com finalidade terapêutica configura-se uma das práticas medicinais mais antigas da humanidade, a qual o homem buscou através dos recursos naturais formas para aumentar as suas chances de sobrevivência, de modo a melhorar sua saúde. Objetivo: Identificar os principais princípios ativos, utilizados na fitoterapia, para o tratamento de lesões. Método: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, que foi realizada entre os meses de março e abril de 2017. Empregando os seguintes descritores em saúde: Fitoterapia AND Tratamento AND Lesão, que resultou em 128 artigos, sendo 02 de metodologia, iniciou-se uma seleção com identificação dos artigos, através da utilização de critérios de inclusão e exclusão, e depois da leitura chegando-se a um produto final de 34 artigos. Discussão e resultados: Quando nos referimos ao contexto brasileiro das pesquisas com plantas medicinais, um total aproximado de 52 plantas medicinais e um composto de ervas já foi estudado experimental ou clinicamente, quanto aos seus efeitos no auxílio do processo de cicatrização, algumas delas com mais de um estudo para comprovação. Diante dos dados vistos, temos como principais componentes de ação anti-inflamatórias no tratamento das lesões o Cajueiro (*Anacardium occidentale*), Mel, Abacaxi (*Ananas comosus* Merr), Babosa (*Aloe vera*); Sendo identificados, principalmente o Cajueiro (*Anacardium occidentale* (L.)); a Babosa (*Aloe vera*); a Própolis (Proveniente de abelhas da espécie *Apis mellifera*); a Jaca (*Moraceae Artocarpus integrifolia* L.), que atuam na angiogênese. E dentre as substâncias listadas, tem como ação antioxidante as seguintes: Própolis (Proveniente de abelhas da espécie *Apis mellifera*); Carambola (*Oxalidaceae Averrhoa carambola* L.); Laranja (*Citrus sinensis*); Maçã (*Malus* sp); Mamão (*Carica Papaya*); Melancia (*Citrus Vulgaris*); Morango (*Fragaria vesca*); e Uva (*Vitis Vinifera*). Considerações finais: Com base no exposto, as plantas medicinais têm se tornado

importante alternativa para o processo de cicatrização de feridas, que começam a fazer parte da atenção à saúde brasileira.

Palavra-Chave: Fitoterapia; Tratamento; Lesão.

**[ECE028] – “INFELIZMENTE O PACIENTE NÃO TEM MAIS JEITO”: VIVÊNCIAS DE FAMILIARES FRENTE ÀS FASES DE LUTO**

Lívia Heringer Daher Jorge - Italla Maria Pinheiro Bezerra  
Rubens José Loureiro - Bruno Henrique Fiorin

**INTRODUÇÃO:** Quando a possibilidade de perder um membro familiar se torna concreta, geralmente os familiares vivem as teorias da fase do luto, pois nesse momento estão frente a uma realidade muito impactante. Assim, sabe-se que o luto não se inicia com a morte, mas sim a partir das relações familiares existentes antes da mesma, afetado também pelas condições que estão próximas da morte e pela qualidade dos veículos estabelecidos; o luto não necessariamente é doloroso **OBJETIVO:** Analisar as fases de luto vivenciadas por familiares/cuidadores de pacientes em cuidado paliativo. **MÉTODO:** Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva desenvolvida a partir de abordagem qualitativa realizada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, localizado na Cidade de Vitória - Espírito Santo. Participaram do estudo 17 familiares de pacientes em cuidados paliativos. Para coleta de dados foi utilizado entrevista semiestruturada. A organização dar-se-á mediante técnica de análise de conteúdo segundo Bardin. **RESULTADOS:** Evidenciou-se que as famílias compartilham de discursos muito semelhantes, sendo evidenciado que a confiança na equipe e os cuidados prestados ajudaram muito na aceitação da doença e no conforto do familiar que vivencia esse momento. A espera por um milagre ou a esperança de cura também foi algo muito presente, embora o sentimento de impotência esteja presente. **CONCLUSÃO:** As fases de luto foram identificadas nos familiares e/ou cuidadores apresentando sentimentos em cada fase de forma semelhante, destacando que o trabalho da equipe de saúde foi importante na fase de negação e que nas demais fases, mesmo diante do sentimento de impotência, a fé e esperança estavam presentes.

Palavra-Chave: Cuidados Paliativos. Família. Vivências

**[ECE029] – NEGLIGÊNCIA INFANTIL: OLHAR DA ENFERMAGEM**

Letícia de Sousa Viana - Rubens José Loureiro

Cristina Ribeiro Macedo - Renato Vidal de Oliveira

A violência infantil, em especial relacionada à negligência, tem se mostrado significativo agravo na saúde da criança, com traumas que marcam a infância e permanecem arraigados em sua memória por toda a vida, desvelando na fase adulta problemas como a depressão, ansiedade e dificuldade em lidar com emoções.

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar as principais repercussões biopsicossociais na criança negligenciada, incluindo as repercussões tardias desta vitimização. Analisou-se o conhecimento e preparo da equipe de enfermagem para lidar com tal fenômeno e como ocorre a identificação e manejo dos casos pela equipe. Para isso, realizou-se uma revisão integrativa de literatura, utilizando o banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, em um levantamento do qual foram selecionados 16 artigos, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: artigos científicos publicados nas bases de dados disponíveis na íntegra; escritos em português; publicados no período de 2000 a 2016.

A partir dos artigos selecionados foi feito um Diagrama de Venn para melhor compreensão. Os dados analisados mostraram que os pais são os principais autores da negligência infantil, sendo pais muito jovens e usuários de substâncias psicoativas os vitimizadores mais frequentes. Na criança, foi observado que o atraso no crescimento e desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem, desnutrição, baixa autoestima e agressividade, compõe as principais repercussões biopsicossociais. Na vida adulta, temos ainda a depressão, ansiedade e toxicomania como conseqüências da negligência sofrida na infância. Na equipe de enfermagem, identificamos a dificuldade de perceber os sinais e sintomas da negligência na criança e o medo da notificação. Identificou-se também, que a enfermagem reconhece as dificuldades da área, mas nem sempre busca capacitar-se por conta das altas demandas de serviço. Foi observado que o ensino de enfermagem não é tão abrangente quando se trata do fenômeno violência infantil o que futuramente, reflete no despreparo do profissional para lidar com tais situações. Concluiu-se que a negligência constitui um importante problema de saúde, pois seus

agravos repercutem em toda a vida. O preparo e conhecimento adequado da equipe de enfermagem resultará em prevenção e melhor manejo dos casos de negligência, promovendo cuidado adequado a criança e em muitos casos, restaurando a família.

Palavra-Chave: negligência; infantil; enfermagem

**[ECE030] – O CUIDAR DA ENFERMAGEM AO PACIENTE ACOMETIDO DE BEXIGA NEUROGÊNICA PÓS TRAUMA RAQUIMEDULAR**

Kellen Cristian Lima Salomão - Patrícia Corrêa de Oliveira Saldanha

Rubens José Loureiro – Cristina Ribeiro Macedo - Renato Vidal de Oliveira

RESUMO - A reabilitação de pacientes com lesão medular é complexa, devendo ser contínua, e realizada por equipe multiprofissional. Nesse processo o enfermeiro tem uma função essencial nos acometidos de trauma raquimedular com bexiga neurogênica, e seu foco é proporcionar a pacientes e cuidadores conhecimentos e habilidades que irão impactar positivamente em suas vidas. Objetivo. Realizar revisão bibliográfica descrevendo o processo de cuidar da enfermagem ao paciente acometido de bexiga neurogênica, pós trauma raquimedular. Métodos. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, envolvendo o tema cuidado de enfermagem ao paciente acometido de bexiga neurogênica pós trauma raquimedular. Os unitermos utilizados foram: “enfermagem”, “trauma raquimedular”, “bexiga neurogênica” e “reabilitação”, e os textos deverão conter a palavra bexiga neurogênica. Será utilizado para a seleção os periódicos nacionais, na base de dados da SCIELO. Resultados. Foi identificado um número reduzido de publicações. O objetivo deste estudo foi apresentar e discutir os achados da literatura referentes ao cuidar da enfermagem ao paciente acometido de bexiga neurogênica, pós trauma raquimedular Neste contexto, os artigos foram lidos, selecionados criteriosamente e identificados por temáticas: complicações vesicais no TRM, bexiga neurogênica, cateterismo vesical intermitente assistido e autocateterismo, papel do enfermeiro na reabilitação e no cuidado da bexiga neurogênica, Educações dos familiares e do paciente e funções do enfermeiro. Conclusão. Entendemos que essa revisão possa contribuir com uma atualização de conhecimentos sobre a reabilitação de pacientes com bexiga neurogênica, vítimas de trauma raquimedular e fomentar discussões para remodelagem do processo de trabalho nas instituições reabilitacionais.

Palavra-Chave. Enfermagem; trauma raquimedular; bexiga neurogênica; reabilitação.

**[ECE031] – O PAPEL DO ENFERMEIRO NA HANSENÍASE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA**

Lidiana de Souza Neumam - Italla Maria Pinheiro Bezerra

Sara Martins de Barros Maestri - Francine Alves Gratal Raposo

**INTRODUÇÃO:** A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que causa diversos sinais e sintomas e se não tratada pode causar complicações ao paciente. Por isso, é de fundamental importância que a consulta da enfermagem envolva ações de prevenção com foco especial na avaliação quanto ao grau de incapacidade do usuário. **OBJETIVO:** Descrever o papel do enfermeiro e suas ações desenvolvidas frente ao paciente portador de hanseníase. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão integrativa. Para seleção dos artigos foi realizada uma busca nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, que possibilitou identificar os artigos nas bases Lilacs, Medline e Bdenf. Assim, para esse estudo, após buscas realizadas, identificaram-se sete artigos que fizeram parte da avaliação dessa revisão. Após esta etapa, realizou-se a divisão dos artigos em tabela de acordo com seus resultados. **RESULTADOS:** Evidenciou-se que a temática em geral é bastante discutida, porém foram encontrados poucos artigos ligados ao ser enfermeiro e às ações na atenção primária em saúde. Contudo, os sete artigos demonstram como o ser enfermeiro está inserido e se qualificando para assumir de fato o seu papel frente a pacientes com hanseníase. **CONCLUSÃO:** Assim, conclui-se que as ações de enfermagem estão ligadas desde a prevenção a cura e a reabilitação da hanseníase, tornando-se, contudo, um desafio de se ter uma assistência efetiva, pois muitas dificuldades são apresentadas. Porém, apesar dessas dificuldades, percebeu-se que a atuação acontece e atende direta ou indiretamente os pressupostos do ministério da saúde.

Palavra-Chave: Hanseníase. Ações. Enfermagem.

**[ECE032] – SURTO DE VÍRUS ZIKA: AÇÕES DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL**

José Lucas Souza Ramos - Italla Maria Pinheiro Bezerra

Caroline Feitosa Dibai de Castro - Jaçamar Aldenora dos Santos

Introdução: Ultimamente, muito tem se falado no surto decorrente do Vírus Zika, que gerou um estado de preocupação em saúde pública, onde as esferas governamentais tiveram que tomar medidas para a resolução e controle desta endemia, principalmente, pela sua possível associação com a microcefalia e complicações neurológicas como a síndrome de Guillain-Barré. Nesse sentido, tendo em vista que o Enfermeiro está diretamente ligado ao cuidado com o paciente, entende-se que estudos que venham a entender suas ações, bem como descrever a realidade atual do Brasil pós surto, é primordial para tomarem-se decisões imediatas de saúde. Objetivo: Analisar as práticas de saúde desenvolvidas pelos enfermeiros para o controle e prevenção do vírus zika na atenção primária do município de Vitória, ES. Método: Estudo exploratório de abordagem qualitativa realizado no município de Vitória, Espírito Santo, Brasil, tendo como cenário as Unidades de Estratégia Saúde da Família. Participaram 22 enfermeiros membros de cada equipe e que estavam atuando na unidade há no mínimo seis meses. Foi considerado o processo de saturação de falas para finalização da coleta de dados, que foi realizada através da aplicação de entrevistas semiestruturadas, realizadas conforme a disponibilidade do profissional. A análise dos resultados deu-se mediante a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin. O projeto de pesquisa deste estudo recebeu parecer aprovador pela Escola Técnica de Saúde de Vitória e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos sob parecer de nº 2.058.297 em 11 de Maio de 2017. Resultados: Os enfermeiros entrevistados das equipes de Estratégia Saúde da Família do município de Vitória percebem as ações de combate ao vírus zika de forma fragmentada direcionada ao público materno-infantil, devido à associação com a microcefalia, realizando ações preventivistas e sanitaristas. Porém, estes percebem que a educação em saúde é a principal estratégia para reorientação destas práticas aliada a uma mudança habitual da cultura da população além do apoio das esferas

governamentais e da mídia. Considerações finais: Observa-se que as ações realizadas na Estratégia Saúde da Família ainda possuem um caráter curativista, mas que necessitam serem melhor investigadas para assim sanar os problemas que circundam a assistência enfrentada pelos enfermeiros.

Palavra-Chave: Vírus Zika. Enfermagem. Estratégia Saúde da Família.

**[ECE033] – ANÁLISE DE EVIDÊNCIA DA RESISTÊNCIA DO *STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE* AOS BETA - LACTÂMICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Caio Santiago Ferreira Coelho - Yuri Duarte Polyacove - Firmino Braga Neto  
Maria das Graças Silva Mattede - Henrique Tommasi Neto

Introdução: Infecções por *Streptococcus pneumoniae* são prevalentes na população, e por vezes são causadas por cepas com resistências a antibióticos, assim se faz necessário o diagnóstico precoce e tomada de conduta correta por parte do médico.

Objetivo: Verificar, segundo a literatura, qual o mecanismo de resistência do pneumococo aos antibióticos beta - lactâmicos, e quais as opções terapêuticas adequadas frente à resistência desse patógeno. Metodologia: Revisão de literatura descritiva utilizando trabalhos científicos das bases de dados da área da saúde, informações científicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Centers for Disease Control and Prevention e livros textos. Revisão da literatura: O mecanismo de resistência do pneumococo aos beta-lactâmicos é a mudança do alvo de ligação da droga, o que pode ocorrer a partir de mutação genética ou aquisição do material genético de outros *Streptococcus spp.*, formando assim uma resistência heterogênea. Dessa forma, na suspeição de resistência, a cultura de material biológico deve ser feita, para determinar a concentração inibitória mínima e por consequência o padrão de resistência do patógeno. Essas informações, quadro clínico e história patológica pregressa do paciente, colaboram para o médico escolher o antimicrobiano adequado. Considerações finais: A resistência do *S. pneumoniae* à beta - lactâmicos tornou-se uma realidade, principalmente a partir da década dos anos noventa. Mas, ainda assim, essa classe de medicamento é considerada de escolha no manejo inicial de infecções pneumocócicas. Deve-se atentar a possibilidade de resistência e falha terapêutica, principalmente nos casos de doença invasiva.

Palavra-Chave: *Streptococcus pneumoniae*. Antibacterianos. Penicilinas.  
Cefalosporinas.

**[ECE034] – AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL/ CIRCUNFERÊNCIA DE PESCOÇO COMO INSTRUMENTO DE TRIAGEM DE HIPERTENSÃO EM ADOLESCENTES**

Lara Martins Fiório - Ligia Sousa Santos - Marília Moro - Gustavo Carreiro Pinasco

Patrícia Casagrande Dias de Almeida - Valmin Ramos da Silva

Objetivo: propor uma ferramenta simples, eficaz, de baixo custo e fácil aplicabilidade para triagem de pressão arterial sistêmica (PA) alterada em adolescentes. Método: estudo de corte transversal de uma amostra probabilística e representativa de adolescentes, de dez – 14 anos, matriculados em escolas públicas estaduais da Região Metropolitana da Grande Vitória. Foram utilizadas as medidas de circunferência de pescoço (CP) obtidos através de fita milimetrada e a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) aferida por método oscilométrico. As relações PAS/CP e PAD/CP foram estabelecidas dividindo-se o valor absoluto da PAS ou PAD pelo valor absoluto da CP do indivíduo. Os pontos de corte ótimos para PA elevada (pré-hipertensos e hipertensos), tanto para PAS quanto para PAD, em relação a CP foram determinados a partir de Curvas ROC (Intervalo de confiança = 95%). Resultados: avaliaram-se 818 adolescentes (477 meninas e 341 meninos). A prevalência de PA alterada foi 27,1% e a de CP alterada foi 23,8%. O ponto de corte ótimo para definição de PA alterada foi 3,81 para PAS/CP e 2,15 para PAD/CP. O ponto de corte para PAS/CP foi 3,83 em meninos e 3,81 em meninas e, para PAD/CP foi 2,10 em meninos e 2,22 em meninas. A área sob a curva (AUC) da PAS/CP e PAD/CP em diagnosticar PA elevada foram respectivamente 0,86 e 0,75.

Conclusão: a relação pressão arterial/circunferência de pescoço (PA/CP) mostrou-se uma ferramenta eficaz e prática na triagem de PA alterada na faixa etária avaliada (dez a 14 anos).

Palavra-Chave: Hipertensão; Circunferência de Pescoço; Adolescentes.

**[ECE035] – DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: RELATO DE CASO E REVISÃO  
BIBLIOGRÁFICA**

Gabriel Ferri Baltazar - Isabela Bittencourt Coutinho Lopes - Lucas Santos Bravin  
Maria Angélica Santos Novaes - Rosana Arpini Pagung - José Carlos Novaes

Descrita pela primeira vez em 1858 pelo neurologista francês, guillaume duchenne, a distrofia muscular de duchenne (dmd) é uma patologia decorrente de alterações na síntese de distrofina em função de mutações genéticas, podendo levar à quebra da fita de leitura ou stop codon prematuro através de deleções, inserções ou duplicações. Em dois terços dos casos, tais mutações são herdadas da mãe, portadora assintomática, enquanto no terço restante é decorrente de mutação nova. Relata-se um caso de um paciente de 12 anos, com diagnóstico de dmd realizado aos 6 anos e 9 meses de idade, apresentando achados físicos exuberantes como hipertrofia de panturrilha, marcha escarvante, sinal de gowers e fraqueza muscular proximal, entre outros. Além disso, apresentava dosagens de creatinoquinase elevada, biópsia muscular e estudo genético compatível. Com base nesse relato, são comentados aspectos de tratamento não farmacológicos e farmacológicos habituais, bem como novas abordagens terapêuticas através de revisão bibliográfica da literatura atual.

Palavra-Chave: distrofia muscular de duchenne; distrofina; células musculares esqueléticas.

**[ECE036] – ABORDAGEM CIRÚRGICA COM INTENÇÃO CURATIVA NO  
ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO: UMA REVISÃO DE LITERATURA**

Daniel Alves Loureiro - Eron Machado Cobe

Claudio Medina da Fonseca - Lara Kneipp Costa Rossi

Atualmente nos EUA, o câncer pancreático ocupa o terceiro lugar nas causas de morte relacionada ao câncer, sendo a maioria, cerca de 90%, do tipo adenocarcinoma ductal pancreático. Destes, mais de dois terços estão localizados na cabeça do pâncreas.

O câncer pancreático é uma das neoplasias mais agressivas e de difícil tratamento, apresentando uma sobrevida média de seis meses após o diagnóstico e uma sobrevida em 5 anos de 5 a 7%. Isso se deve principalmente à sua biologia molecular agressiva, apresentando rápida progressão e ao diagnóstico tardio da malignidade, que ocorre na maioria dos casos.

A única opção curativa para o adenocarcinoma ductal pancreático é a ressecção cirúrgica, entretanto, menos de 20% dos paciente ao serem diagnosticados são candidatos a cirurgia. Essa era associada a uma mortalidade perioperatória significativa, entretanto, com os avanços das técnicas cirúrgicas e cuidados perioperatórios, a mortalidade vem caindo em centros com grande volume de cirurgias.

Tendo isso em vista, o trabalho pretende informar tanto ao clínico quanto o cirurgião sobre a doença, para que o diagnóstico seja realizado o mais precocemente possível e quando houver a possibilidade, abordada cirurgicamente da melhor forma possível. Foi realizada uma revisão de literatura sobre a abordagem cirúrgica com intenção curativa do adenocarcinoma ductal de cabeça de pâncreas usando artigos encontrados no scielo, pubmed e clinicalkey.

Palavra-Chave: Neoplasias pancreáticas, pancreatoduodenectomia, carcinoma ductal pancreático

**[ECE037] – ACNE NA MULHER ADULTA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Anna Caroliny da Silva Mantovani - Marcus Vinicius Oliveira Nogueira –  
Nayane Frozi Caiado - Karina Demoner de Abreu - Cristine Aparecida Mendes –  
Lia Quintaes Cardoso Santa Clara

A acne vulgar é uma dermatose inflamatória crônica que acomete a unidade pilossebácea. Na mulher adulta é definida quando há surgimento ou persistência das lesões acneicas após os 25 anos de idade. Sua patogênese é complexa, envolvendo os androgênios circulantes, estando presente o hiperandrogenismo periférico ou a hipersensibilidade terminal da unidade pilossebácea. Seu arsenal terapêutico inclui o tratamento da acne vulgar, mas também terapias hormonais, antiandrogênicas, entre outras.

Palavra-Chave: acne; mulher; *Propionibacterium acnes*; hiperandrogenismo.

**[ECE038] – ANÁLISE DO CONTROLE GLICÊMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE APOIO AO DIABETES INFANTIL**

Karluana Nunes Endlich - Lorena Viana Magri - Marcela Ferreira Trazzi –  
Christina Cruz Hegner Patrícia Casagrande Dias de Almeida - Leticia Guimarães de Souza  
Renata Xavier Frechiani de Castro Bergamin

**Objetivo:** Avaliar o controle glicêmico de crianças e adolescentes com diabetes. **Método:** Estudo observacional, descritivo do tipo retrospectivo, composto por 25 pacientes, todos com Diabetes Mellitus tipo 1, participantes do Grupo de Apoio ao Diabetes Infantil em um hospital filantrópico de Vitória, Espírito Santo. Estes foram analisados, a partir de dados obtidos de prontuários eletrônicos, em relação a idade, sexo, tempo de tratamento, resultados de glicemia em jejum e hemoglobina glicada laboratorial e foram submetidos ao teste de hemoglobina capilar para posterior análise e comparação. **Resultado:** O grupo estudado, entre 3-17 anos, tem maior prevalência do sexo masculino (52%) e apresentam um tempo médio de tratamento de 5,4 anos. Em relação à glicemia em jejum, 76% dos participantes apresentaram um controle glicêmico inadequado. Em relação à hemoglobina glicada, tanto a capilar quanto a laboratorial, apenas 4% atingiram o alvo de controle. Sendo que os testes de hemoglobina glicada capilar e laboratorial não apresentaram diferença significativa quando comparados. **Conclusão:** O controle glicêmico da maioria dos participantes do estudo está inadequado.

**Palavra-Chave:** Diabetes Mellitus. Hb A1c. Glicemia.

**[ECE039] – ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA, SOCIOECONÔMICA E A SATISFAÇÃO E PERCEPÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA**

Bruno Dian Gandra - Herbert Felipe Heimbeck - Isadora Luiz Pereira  
Bruno de Freitas Valbon - Alessandra Tieppo - Filipe Garcia Moreira

**OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico, socioeconômico, a satisfação e percepção/educação da saúde ocular dos pacientes submetidos à cirurgia de catarata no Hospital Universitário Santa Casa de Misericórdia de Vitória. **MÉTODOS:** Estudo observacional, com amostra formada por 114 pacientes, atendidos no Ambulatório de Oftalmologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV). Entre janeiro e dezembro de 2016. Recrutados aleatoriamente. **RESULTADOS:** A média de idade foi de 67,3 anos, e a raça branca foi responsável por 80,7% dos casos. 66,7% eram provenientes da região Metropolitana e em relação ao grau de instrução, a maioria (65,8%) apresentou até 8 anos de estudo. Em relação a atividade ocupacional 47,4% eram aposentados e a renda mensal individual, 59,6% ganhavam até um salário. 45,6% dos pacientes tiveram acesso ao serviço encaminhados pela Unidade Básica de Saúde e 8,8% tiveram acesso ao serviço por meio da ajuda interna de funcionários do hospital. 25,4% alegaram o tempo de espera como a maior dificuldade, 20,2% a distância de casa. **CONCLUSÃO:** A população atendida não tem acesso rápido a primeira consulta com oftalmologista nem a cirurgia de catarata, resultando em baixa acuidade visual, tornando necessária a busca por meios de facilitar o acesso ao especialista, visando diminuir o tempo de espera, as dificuldades e os malefícios causados pela patologia. Tratando-se de uma população economicamente carente, com baixa acuidade visual, baixo nível de instrução, que depende unicamente do serviço público de saúde em sua grande maioria, a existência de algumas formas irregulares de acesso ao serviço acarretam uma maior dificuldade de acesso para os pacientes com real necessidade, e aumentam o tempo de espera das pessoas que estão na fila para a primeira consulta ou para a realização do procedimento cirúrgico no serviço de especialidade.

Palavra-Chave: Catarata; cirurgia; visão.

**[ECE040] – AVALIAÇÃO DO USO DA RAZÃO CIRCUNFERÊNCIA DE CINTURA POR ESTATURA COMO PREDITORA DE EXCESSO DE PESO NA ADOLESCÊNCIA**

Marina Bento Alves Vasconcellos - Rebeca Silva Moreira da Fraga - Gustavo Carreiro Pinasco  
Valmin Ramos da Silva - Janine Pereira da Silva

Objetivo: Obter pontos de corte da razão circunferência de cintura / estatura (CCE) para predição de sobrepeso e obesidade em adolescentes escolares e avaliar utilidade diante das variantes sexo, idade e estadiamento puberal. Métodos: Estudo transversal, descritivo, quantitativo, com 818 adolescentes de dez a 14 anos, de escolas públicas. Avaliados por profissionais treinados quanto ao peso, estatura e circunferência abdominal. Estadiamento puberal foi autodeclarado, de acordo com classificação de Tanner. Criadas curvas Receiver Operating Characteristic Curve para uso de CCE no diagnóstico de sobrepeso, obesidade e obesidade para cada sexo. Os testes de Kruskal-Wallis e U de Mann-Whitney foram utilizados. Foi usado intervalo de confiança de 5%. Resultados: Os valores de corte preditores de sobrepeso e obesidade geral foram respectivamente 0,46 [área abaixo da curva (AUC)=0,956] e 0,51 (AUC=0,980). Obesidade específica para meninas e meninos foi respectivamente 0,51 (AUC=0,974) e 0,52 (AUC=0,943). CCE ( $p=0,33$ ) e índice de massa corporal ( $p<0,001$ ) variaram com a idade. Não houve diferença considerando sexos ( $p=0,276$ ) ou estadiamento puberal para meninos ( $p=0,208$ ) e meninas ( $p=0,052$ ). Conclusão: CCE é útil para rastreamento de excesso de peso na adolescência. Apesar da variação entre faixas etárias, adotando valor único de 0,5 obtém-se altas taxas de sensibilidade e especificidade. Além disso, não necessita do uso de tabelas ou gráficos para sua interpretação, independe do sexo ou estadiamento puberal, e dispensa uso de balança, o que facilita seu uso por profissionais da saúde e leigos.

Palavra-Chave: Child; Adolescent; Overweight; Obesity; Waist-Height Ratio.

**[ECE041] – COLITE PSEUDOMEMBRANOSA: UMA REVISÃO DE LITERATURA**

Thalis Scuassante Bolzan - Tony Coimbra Clara - Yallana Silveira Arruda - Ana Paula Hamer Sousa Clara  
Maria das Graças Silva Mattede - Lara Kineipp Costa Rossi

O principal agente etiológico de diarreia infecciosa e colite associada a antibioticoterapia é o *Clostridium difficile*, um bacilo gram positivo anaeróbio formador de esporos e produtor de toxinas capaz de causar a colite pseudomembranosa. Pacientes que se submeteram a antibioticoterapia prévia, idosos maiores de 60 anos, indivíduos hospitalizados e imunodeprimidos são os mais acometidos. O espectro clínico varia desde portadores assintomáticos do *Clostridium difficile*, até colite fulminante com falência de múltiplos órgãos e óbito. O início dos sintomas ocorre geralmente dentro de duas semanas após o fim do uso de antibióticos. O diagnóstico é baseado na combinação de sintomas clínicos além de exames de amostras fecais positivas para as toxinas do *Clostridium difficile* ou achados endoscópicos e/ou histológicos de colite pseudomembranosa. O tratamento de portadores assintomáticos não é indicado, entretanto, pacientes com infecção por *Clostridium difficile* comprovada devem receber tratamento adequado. O mesmo consiste na suspensão do antibiótico deflagrador do quadro, prevenção secundária por estratégias de controle da infecção e tratamento farmacológico específico com antibioticoterapia. A infecção por *Clostridium difficile* recorrente pode ser melhor manejada com transplante de fezes conforme guidelines atuais e casos graves podem necessitar de colectomia subtotal emergencial. Outras medidas alternativas para o tratamento ainda são motivos de debate. A mortalidade resultante da colite pseudomembranosa depende da gravidade dos sintomas, doenças subjacentes e idade do paciente.

Palavra-Chave: Colite pseudomembranosa; *Clostridium difficile*; Transplante fecal.

**[ECE042] – DELIRIUM PÓS-OPERATÓRIO EM PESSOAS IDOSAS: FREQUÊNCIA, FATORES ASSOCIADOS E INFLUÊNCIA NO PERÍODO DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR**

Mayne Santiago Brandão - Nicole Souza Henriques - Thiago Lobato Sordine  
Renato Lírio Morelato - Larissa Bimbato - Alessandra Tieppo

**OBJETIVOS:** Estudar a frequência, fatores de risco e influência no período de permanência hospitalar de Delirium pós-operatório em pacientes idosos submetidos a cirurgias eletivas não cardíacas. **MÉTODOS:** Estudo do tipo transversal, observacional, de pessoas idosas (65 anos ou mais de idade) internadas para realização de cirurgia eletiva não cardíaca no Hospital filantrópico universitário. Durante o período pré-operatório imediato foram avaliados os fatores de risco (variáveis independentes): idade, gênero, cognição (MiniCog), funcionalidade (Katz e Time up and go), fármacos e aspectos clínicos. O desfecho (variável dependente) foi avaliado no pós-operatório imediato (até 72 horas), através do CAM (Confusion Assesment Method). Realizamos estatística descritiva, qui quadrado e t de student para amostras independentes. **RESULTADOS:** Oitenta e três pacientes foram incluídos na pesquisa, sendo 44,6% (37) de cirurgia ortopédica, 41 % (34) cirurgia geral, 13,3% (11) cirurgia urológica, e um paciente (1,2%) de outra cirurgia não relacionada. Predominou o sexo masculino (53%) com idade média de 73 anos (65-95 anos). Oito pacientes (9,6%) apresentaram Delirium pós-operatório; cinco do tipo hiperativo (6%), dois hipoativo (2,4%) e um misto (1,2%). Os pacientes com delirium eram mais idosos ( $p = 0,02$ ), com maior declínio cognitivo ( $p = 0,01$ ), portadores de anemia ( $p = 0,04$ ) e prolongamento na permanência hospitalar ( $p = 0,001$ ). **CONCLUSÃO:** Observamos Delirium pós-operatório acometendo os mais idosos, com declínio cognitivo e portadores de anemia; com aumento da permanência hospitalar. Demonstrando a importância da avaliação abrangente no período pré-operatório para prevenção de Delirium.

Palavra-Chave: Delirium; período pós-operatório; assistência ao idoso.

**[ECE023] – DOENÇA DE CROHN PERIANAL: REVISÃO DE LITERATURA**

Lohana Soares Figueiredo - Natália Abrantes Grossi - Fabiano Quarto Martins  
Bruna Rodrigues Brandolini - Ana Paula Hamer Sousa Clara

As manifestações anais e perianais da doença de Crohn são muito comuns e o comprometimento dessa região pode se manifestar bastante acentuado e debilitante. O comprometimento perianal apresenta-se frequentemente com abscessos e fístulas, que costumam ser múltiplas, complexas e recorrentes. Esta revisão apresenta a anatomia do esfíncter anal necessária para o atendimento desta patologia, métodos de imagem, classificação e tratamento. Os novos tratamentos para a doença de Crohn perianal estão agora disponíveis e têm a promessa de controlar melhor a sepse e manter a continência fecal. As diferentes modalidades de tratamento são selecionadas com base na anatomia da fístula, nas características do paciente e nos objetivos de manejo (controle de fechamento ou de sepse).

Palavra-Chave: Doença de Crohn. Fístulas perianais. Incidência. Diagnóstico. Tratamento.

**[ECE044] – DOENÇA DE KIKUCHI-FUJIMOTO PRECEDENDO LÚPUS ERITEMATOSO**

**SISTÊMICO: RELATO DE CASO CLÍNICO**

Caio Guimarães Araújo - Thaís Pires Silva Pereira - Moacir Soprani - Regina Célia Tonini  
Raquel Altoé - Valquiria Dinis - Carolina Zarzonelli Costa

Objetivo: Revisar a literatura dando ênfase na importância do seguimento da doença de Kikuchi-Fujimoto e descrever a história, o diagnóstico e o tratamento dessa enfermidade a partir de um relato de caso de uma paciente atendida no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória – ES. Método: Consulta de prontuário informatizado e revisão bibliográfica, na qual foram consultadas as seguintes bases de dados: PubMed, MEDLINE e SciELO, sendo selecionados artigos publicados entre os anos de 1972 e 2014. Resultado: Relatamos o caso de uma mulher de 26 anos, que deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória por apresentar, há 40 dias, os seguintes sinais e sintomas: mialgia, poliartralgia, febre não aferida, náuseas, vômitos e lesões descamativas e pruriginosas difusas. Antes da admissão nesse hospital, a paciente esteve internada em outro serviço hospitalar com quadro de anasarca, linfadenopatia generalizada e bicitopenia. O quadro clínico evoluiu com trombose venosa profunda em membro superior direito, que complicou com tromboembolismo pulmonar, sendo iniciado anticoagulação plena. Também evoluiu com piora da função renal e com nodulação endurecida e dolorosa em região glútea esquerda. Paciente foi transferida para o Hospital Santa casa de Misericórdia, onde foi admitida com insuficiência renal aguda, manutenção da trombose venosa profunda e celulite em membro superior direito, anasarca, linfadenopatia generalizada e abscesso em região glútea esquerda. Submetida à drenagem da coleção, que revelou saída de secreção hemática. Biópsia excisional do gânglio axilar esquerdo demonstrou hiperplasia linfocítica atípica. Imunohistoquímica foi solicitada para confirmação diagnóstica. Após melhora clínica, a paciente recebeu alta hospitalar e foi encaminhada para acompanhamento clínico ambulatorial. O resultado do exame imunohistoquímico apresentado na consulta ambulatorial confirmou doença de Kikuchi-Fujimoto. Após um semestre de remissão da doença, paciente apresentou critérios suficientes para que fosse realizado o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico.

Palavra-Chave: Linfadenite histiocítica necrosante. Linfadenite. Lúpus Eritematoso Sistêmico.

**[ECE045] – OS VÍNCULOS DE TRABALHO MÉDICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E A LONGITUDINALIDADE DO CUIDADO**

Lucas Silveira Moraes - Nuno Bressanelli - Diana de Oliveira Frauches  
Denise Rozindo Bourguignon - Márcio de Oliveira Almeida

Objetivo: Discutir a distribuição dos vínculos de trabalho médico transitório na atenção primária à saúde no Espírito Santo. Método: Estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo, de dados secundários do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), referentes ao Espírito Santo, em julho de 2017. Os vínculos de trabalho médico foram classificados em transitórios e não transitórios, sendo distribuídos segundo as regiões de saúde do estado. Diferença da proporção dos tipos de vínculos entre as regiões foi investigada com o teste Qui quadrado de Pearson e com a Análise de Resíduos Ajustados, ambos ao nível de significância de 5% ( $p < 0,05$ ). Projeto de pesquisa CAAE 75595617.3.0000.5065. Resultados: Dos 1.677 vínculos incluídos na pesquisa, foram observados 891 vínculos transitórios (53,13%) e 786 não transitórios (46,87%), com associação dos vínculos transitórios às regiões de saúde Norte e Central e dos não transitórios à região Metropolitana, enquanto a região Sul não apresentou associação. Conclusão: O cenário atual ainda privilegia vínculos de trabalho médico transitório na atenção primária do Espírito Santo, o que é nocivo para os médicos, para o SUS e, principalmente, para a população.

Palavra-Chave: Recursos Humanos em Saúde. Atenção Primária à Saúde. Relações Trabalhistas. Assistência à Saúde.

**[ECE046] – PREVALÊNCIA DA SÍNDROME METABÓLICA EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES**

Mateus Oliveira Potratz - Patrícia Casagrande Dias de Almeida  
Janine Pereira da Silva - Christina Cruz Hegner

Objetivo: Identificar a prevalência de síndrome metabólica em adolescentes com excesso de peso. Método: Estudo epidemiológico, transversal, em amostra probabilística e representativa de adolescentes (dez a 14 anos) frequentadores de escolas da rede pública estadual da Região Metropolitana da Grande Vitória, ES, representados por 200 estudantes com excesso de peso. Foram obtidos peso, estatura e circunferência abdominal. Para a avaliação nutricional foi considerada o índice de massa corporal por idade, em escore z, do referencial padrão OMS. Realizada aferição da pressão arterial e coleta de 10 mL de sangue venoso, para análise da glicemia de jejum, perfil lipídico e triglicérides. Para diagnóstico de síndrome metabólica foi utilizado o critério sugerido por Cook et al. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas. As informações coletadas foram organizadas em Excel. Quando necessário foram feitas análises estatísticas em métodos paramétricos ou não paramétricos. Variáveis qualitativas foram comparadas pelo teste do qui-quadrado ou pelo teste de Fisher. O nível de rejeição para a hipótese de nulidade foi estabelecido em, estabelece-se em 0,05. Resultados: Dos 200 adolescentes avaliados 134 tinha sobrepeso, 62 obesidade e 4 obesidade grave. Foi diagnosticado 11,5% (23/200) adolescentes com síndrome metabólica, condição associada ao excesso de peso ( $p=0.000$ ). Entre os componentes individuais da síndrome metabólica nos adolescentes com excesso de peso identificou-se, dentre o de maior prevalência a pressão arterial sistólica aumentada (34,5%), e o de menor prevalência a glicemia de jejum aumentada (1,5%). Conclusão: Houve 11,5% de prevalência de síndrome metabólica entre os adolescentes com excesso de peso.

Palavra-Chave: Síndrome X Metabólica, Sobrepeso, Obesidade, Adolescente.

**[ECE047] – SÍNDROME DE MCCUNE-ALBRIGHT: REVISÃO DE LITERATURA**

Eduardo Littig Neto - Rubens Littig Mariano - Chárbel Jacob Junior  
Regina Célia Trindade - Marcus Alexandre Novo Brazolino

A Síndrome de McCune-Albright é uma condição rara causada por uma mutação na fase de desenvolvimento embrionário. As principais glândulas endócrinas do corpo podem carregar essa mutação, conferindo secreção autônoma às mesmas. Apesar do fato de que qualquer tecido pode ser afetado, há certa preferência pelos ossos, pele e gônadas, assim descritas na tríade clássica da doença. Sua prevalência é incerta, estimada entre 1/100.000 e 1/1.000.000, e mesmo com a carência de dados epidemiológicos melhores, a doença pode ser considerada rara. Suas manifestações clínicas incluem fraturas e deformidades ósseas, causadas pelas lesões displásicas típicas da síndrome, manchas café-au-lait na pele e presença de puberdade precoce, além de outras endocrinopatias. Quanto ao diagnóstico, os achados clínicos são soberanos. Testes laboratoriais podem ajudar a detectar afecções glandulares, e os exames de imagem são importantes para avaliação e acompanhamento das alterações ósseas. Quando há dúvidas nos exames de imagem, a biópsia de lesão óssea se mostra eficaz. Por fim, existem testes genéticos específicos, porém são de difícil acesso e não são necessários para diagnóstico e conduta. O tratamento da síndrome baseia-se na correção e controle dos achados mais comuns. Nenhum tratamento é considerado modificador da história natural da doença, e essa é uma das principais questões que as novas pesquisas visam solucionar. Este trabalho apresenta uma reunião de informações a respeito dessa patologia, organizada na forma de uma revisão bibliográfica, que visa contribuir para fomentar novas pesquisas sobre o tema e para o aumento do acesso ao que já é conhecido. A Síndrome de McCune-Albright possui, então, um caráter multidisciplinar e ainda carece de novos estudos para o aperfeiçoamento do manejo dos pacientes e para a promoção de qualidade de vida aos mesmos.

Palavra-Chave: Síndrome de Albright-McCune. Displasia Fibrosa Poliostótica.

Manchas Café-au-lait.

**[ECE048] – SÍNDROME DE POEMS: REVISÃO DE LITERATURA**

Lucas Santos Bravin - Marcele Henriques Lougon - José Antônio Fiorot Junior Cristiane  
Aparecida Mendes - Maria das Graças Silva Mattede - Leilian de Lacerda Montezi -

A síndrome de POEMS é uma entidade clínica rara, de acometimento sistêmico e desenvolvimento indolente. Consiste na presença concomitante de polineuropatia periférica, organomegalias, endocrinopatias, desordem monoclonal de plasmócitos, e alterações cutâneas, sendo a idade média dos pacientes com a síndrome de 50 anos e mais prevalente em homens (63%). Devido ao acometimento sistêmico e a diversidade de manifestações clínicas é fundamental o acompanhamento médico multiprofissional visando melhor otimização do tratamento. Para ampliar o conhecimento sobre o assunto idealizou-se uma revisão de literatura descritiva dos aspectos clínicos, critérios diagnósticos e tratamento da síndrome de POEMS. Estudo qualitativo, descritivo, em bases de dados como Pubmed, LILACS, SciELO, BIREME e Biblioteca Virtual da Saúde. A fisiopatologia da síndrome não está completamente estabelecida, mas estudos mostram relação da doença com aumento dos níveis séricos de citocinas. O tratamento padrão parcialmente indefinido, mas com opções terapêuticas, dentre eles corticosteroides, radioterapia, quimioterapia e transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas. O tratamento recente mais promissor tem sido o bevacizumab, um anti-VEGF que também pode ser utilizado como um marcador de resposta terapêutica. O bortezomib em baixas doses, associado a ciclofosfamida e dexametasona, tem sido uma nova opção terapêutica para pacientes com intolerâncias ou contraindicações à outras terapias. A ampliação do conhecimento médico no que diz respeito ao reconhecimento precoce dos sinais e sintomas, estabelecimento do diagnóstico diferencial e tratamento adequado da síndrome de POEMS são relevantes para o prognóstico do paciente e continuação de estudos futuros.

Palavra-Chave: Síndrome. POEMS. Polineuropatia. Gamopatia monoclonal.

**[ECE049] – TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**

Carolina de Melo - Jéssica Peroni Custódio - Rafaella de Nadai - Felipe Bertollo Ferreira  
Ana Paula Hamer Sousa Clara - Maria das Graças Silva Mattede

**Introdução:** A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma condição de alta prevalência e com um efeito significativo na qualidade de vida da população. É uma doença de etiologia multifatorial, incluindo alterações no eixo cérebro-intestino e na motilidade intestinal, porém, ainda não foi completamente elucidada. Dados recentes apontam sobre uma relação importante da disbiose intestinal na patogênese da SII. O transplante de microbiota fecal (TMF) tem a condição de reestabelecer a homeostase intestinal. **Objetivos:** Este trabalho objetiva a revisão de publicações científicas que associam o uso do TMF no tratamento da SII, para a posterior análise de sua eficácia terapêutica. **Metodologia:** A busca literária foi realizada no acervo MEDLINE, através do PubMed, onde angariamos 120 artigos. Através de critérios de inclusão e exclusão sobraram 9 publicações que foram analisadas. **Resultados:** A partir da análise dos estudos, um total de 91 pacientes foram avaliados. O tratamento revelou melhora sintomática em 85.71% dos casos. As diferenças entre os 9 estudos inclusos devem ser levadas em consideração. Não houve homogeneidade entre modelos, vias e uso do antibiótico pré-TMF. **Conclusão:** O TMF se mostrou eficaz no tratamento da SII, porém são necessários estudos clínicos com maior impacto científico para concretizar esta nova modalidade terapêutica.

**Palavra-Chave:** “Síndrome do Intestino Irritável”, “Transplante de Microbiota Fecal” e “Microbiota Intestinal”.

**[ECE050] – TRATAMENTO CONSERVADOR DO TRAUMA FECHADO DE FÍGADO E BAÇO:  
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

Lucas Alves Nemer - Marcello Moro Queiroz - Mitre Kalil Junior - Mitre Kalil - Thiago Rampazzo Pancini - Guilherme Carvalho Moitinho

Objetivo: revisar na literatura as indicações e modalidades de tratamento conservador no trauma abdominal fechado com lesões do fígado e do baço, comparando-os com o tratamento cirúrgico no que tange morbidade, mortalidade e prognóstico. Metodologia: revisão sistemática de literatura na base de dados MEDLINE, sendo acessada via PUBMED. Foram selecionados 13 artigos publicados nos últimos cinco anos. Resultado: o tratamento não operatório em relação ao tratamento cirúrgico no trauma hepático e esplênico contundentes possui vantagens como a diminuição de laparotomias desnecessárias não terapêuticas associada a diminuição de mortalidade, morbidade, duração do tempo de internação e menor necessidade de transfusão de hemoderivados. Procedimentos minimamente invasivos, como angioembolização, contribuíram para o aumento das taxas de sucesso do tratamento não operatório, sendo este último basicamente influenciado pela condição hemodinâmica do paciente. Os graus de lesões hepática e esplênica além da presença de lesões abdominais associadas também definem a conduta do tratamento não operatório. Graus avançados de lesões no fígado e baço requerem avaliação criteriosa em relação ao uso de angioembolização ou tratamento cirúrgico, sendo o tratamento não operatório também passível de escolha em lesões mais graves. Conclusão: o manejo não-operatório do trauma hepático e esplênico em pacientes hemodinamicamente estáveis é o tratamento de escolha, comprovados pelos benefícios demonstrados pelos estudos avaliados.

Palavra-Chave: tratamento não-operatório. Lesão hepática contusa. Lesão esplênica contusa.

**[ECE051] – TRATAMENTO DE SÍFILIS RECENTE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA**

Fábio Lucas Bassini e Silva - Raphael Benevenuto - Vinícius Laporti do Nascimento  
Diana de Oliveira Frauches - Maria das Graças Silva Mattede - Vanessa Pereira Gaigher

Introdução: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela espiroqueta *Treponema pallidum*. O não tratamento oportuno tem graves consequências. Embora a penicilina G benzatina seja o antibiótico de escolha, há atualmente escassez desse medicamento. Objetivo: Verificar, segundo a literatura recente, quais as opções terapêuticas para sífilis recente. Métodos: Revisão sistemática de literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde, com publicações de 2007 a 2017. Para minimizar o risco de vieses, foram utilizadas recomendações do Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, do sistema GRADE e do PRISMA. Discussão e resultados: O tratamento de sífilis recente pode ser realizado de diversas maneiras. Entre elas pode-se citar a penicilina G benzatina, amoxicilina associada a probenecida, azitromicina, ceftriaxone, minociclina e doxiciclina/tetraciclina. As opções terapêuticas apresentam boa efetividade e tolerabilidade em relação à penicilina G benzatina e podem ser empregadas como alternativa, exceto em gestantes, nas quais o padrão-ouro ainda é a penicilina G benzatina. Conclusão: Penicilina G benzatina permanece o medicamento de escolha para tratamento da sífilis recente. As evidências obtidas não permitem indicar, quando não disponível penicilina G benzatina, um método preferencial de tratamento para sífilis recente. A escolha deve ser individualizada, analisando fatores como adesão, custo e perfil de resistência conhecida na região do paciente. É necessário a realização de mais estudos que verifiquem a efetividade das terapias alternativas à penicilina G benzatina.

Palavra-Chave: Sífilis. Terapêutica. Antibacterianos. Esquema de Medicação.

**[ECE052] – TROMBOFLEBITE FÚNGICA DO SEIO CAVERNOSO: ASPECTOS ANATÔMICOS, CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS**

Antonio Francisco Loss Possatti - Douglas Gonçalves Bento - Lucas Loss Possatti -  
Henrique Faria Ramos - Hildegado Rodrigues

**Objetivo:** Descrever um caso raro de tromboflebite fúngica do seio cavernoso secundário a mucormicose rinocerebral, com ênfase nas manifestações clínicas, descrições radiológicas e ressaltando a importância do conhecimento anatômico. **Método:** Estudo do tipo relato de caso com revisão de literatura. Informações obtidas em prontuário, exames e entrevista com o paciente. Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, número 1.865.033. **Relato de caso:** Relatamos caso de um homem, 54 anos, com diagnóstico definido após resultado do histopatológico de mucormicose rinocerebral complicada com tromboflebite fúngica do seio cavernoso direito. O paciente recebeu tratamento para doença de base, com remoção do foco infeccioso primário e anfotericina B. A tromboflebite fúngica do seio cavernoso é uma enfermidade rara, de prognóstico ruim e muitas vezes fatal quando diagnosticada tardiamente. O diagnóstico e tratamento precoce dessa doença, quando instituído, melhora a probabilidade de sobrevivência do doente.

**Palavra-Chave:** Mucormicose. Tromboflebite. Seio cavernoso. Rinossinusite fúngica invasiva. Sinusite fúngica.

**[ECE053] – TUBERCULOSE LARÍNGEA: REVISÃO DE LITERATURA**

Alice Bravim Fernandes Moça - Juliana Maria Mendonça do Amaral Lages - Larissa Cecato Delunardo - Regina Célia Tonini - Moacir Soprani –  
Carolina Rocio Oliveira Santos - Luiza Dias Torres

A Tuberculose é uma infecção crônica causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, prevalente no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Sua forma de acometimento mais comum é a pulmonar, apesar de ter potencial de causar doença em diversos sítios do organismo. A forma laríngea é raramente encontrada isolada, mas apresenta alta patogenicidade e infectividade. Portanto, é fundamental que essa patologia seja considerada no diagnóstico diferencial das doenças da laringe, principalmente em pacientes imunossuprimidos. O presente trabalho tem como objetivo desenvolver discussões pertinentes à sua epidemiologia, quadro clínico, diagnósticos diferenciais e tratamento acerca desse tema.

Palavra-Chave: Tuberculose laríngea. *Mycobacterium tuberculosis*. Diagnóstico.

**[ECE054] – ALONGAMENTO E AGULHAMENTO SECO NA FLEXIBILIDADE DE CORREDORES DE RUA**

Ana Carolina de Oliveira Barbosa - Lara Musso Aurich - Marcília Bellini Choinaki  
Gracielle Karla Pampolim Abreu - Rodrigo Luiz Vancini - Marcelo Dalla Bernardina

A biomecânica da corrida sofre alterações como mudanças angulares, alteração do centro de gravidade, dentre outras. As alterações citadas provocam um desequilíbrio da flexibilidade muscular, normalmente causado pelas formações de pontos gatilhos intramusculares. Dessa forma, com o intuito de aprofundar o estudo deste tema, procedeu-se com um levantamento bibliográfico e um estudo de campo. No referencial teórico identificamos que com o crescimento cada vez maior do número de praticantes de corrida devido a seu fácil acesso, baixo custo e por prevenir/controlar doenças, cresce o número de lesões decorrentes de alterações biomecânicas. Diante deste fato que afeta tanto o setor público quanto o setor privado, conhecer técnicas que previnam essas lesões e proporcionem uma prática de corrida segura e saudável é de suma

importância. A literatura nos traz que a flexibilidade adequada é um importante fator de prevenção de lesões. Uma das formas de ganho de flexibilidade é o uso de alongamento, sendo o alongamento estático o mais utilizado. Por outro lado, temos o agulhamento seco que é muito utilizado atualmente para tratamento de dor miofascial. Esta técnica inativa pontos gatilhos diminuindo a tensão muscular e restaurando padrões de movimento. A pesquisa de campo teve por objetivo, avaliar e comparar os efeitos das técnicas agulhamento seco e alongamento na flexibilidade de corredores de rua através da fotogrametria. Trata-se de um estudo experimental, randomizado, com protocolos de alongamento e agulhamento seco com duração de 6 semanas, em 21 corredores de rua de Vitória – ES randomizados em 2 grupos através de sorteio: grupo alongamento (10), grupo agulhamento seco (11). Como resultado foi encontrado diferença estatisticamente significativa na comparação pré e pós para o ângulo de tornozelo intra-grupo de alongamento ( $p 0,039$ ), com aumento médio de  $6,6 \pm 8,6$  graus. Na análise intra-grupo de agulhamento seco, foi encontrado diferença estatisticamente significativa na comparação pré e pós do ângulo de quadril ( $p 0,003$ ), com diminuição média de  $10,7 \pm 9,6$  graus. Nas comparações entre os grupos, foi encontrado diferença estatisticamente significativa para a variável quadril ( $p 0,029$ ). Com isso pode-se concluir que o Agulhamento seco foi benéfico na flexibilidade de isquiostibiais em corredores de rua, saudáveis e sem lesões. Em contrapartida o alongamento não obteve os resultados esperados em longo prazo (6 semanas), confirmando os achados na literatura sobre seus efeitos imediatos.

Palavra-Chave: Flexibilidade, Agulhamento Seco, Alongamento, Corredores de Rua

**[ECE055] – PREMATURIDADE E SEU IMPACTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR**

Jamile Sales Vargas - Juliana Cavassani - Ramani Pin - Letícia Guimarães Peyneau  
Ermenilde da Silva Pinto - Rozy Tozetti Lima

**Introdução:** A prematuridade influencia diretamente em atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, ocasionados pelos longos períodos de internações em Unidades de Terapia Intensiva. **Objetivos:** Avaliar o Desenvolvimento Neuropsicomotor através da escala de DENVER II. **Metodologia:** Foram analisados 1216 prontuários, observados através do Livro da Vida no ano de 2013, destes, 34 se incluíam no critério de inclusão, a amostra foi composta por 4 crianças, com idade gestacional menor que 34 semanas. Foi utilizado como instrumento de avaliação a escala de Developmental Screening Test II – DENVER, traduzido para a língua portuguesa (Brasil), o teste consiste em 125 itens que são divididos em quatro grupos: 1) as capacidades pessoais e sociais; 2) desempenho motor fino-adaptativo; 3) linguagem; 4) desempenho motor-grosso. **Resultado:** Os resultados mostraram que todas as crianças apresentam atrasos na área da linguagem e motricidade grossa. **Conclusão:** Conclui-se que todas as crianças deste estudo apresentaram atrasos em seu desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando como principais fatores de risco acompanhamento inadequado do pré-natal < 6 consultas, idade gestacional  $\leq$  32 semanas, utilização da ventilação mecânica invasiva e longos períodos de internação.

**Palavra-Chave:** Prematuros. Desenvolvimento neuropsicomotor. Atraso.

**[ECE056] – O SERVIÇO SOCIAL E A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS**

Aldisséia da Penha Alochio Curitiba - Keila dos Reis Silva - Angela Maria Caulyt Santos da Silva - Adriana Mendes - Ludimila Rodrigues Nunes

O interesse pelo estudo sobre a inclusão da criança com deficiência na escola surge dos questionamentos dessa população que habita no imaginário social e individual dos profissionais da educação e dos familiares dessa criança, por desconhecimento e dúvidas que culminam em incerteza sobre os benefícios e as possibilidades da inclusão. É importante ressaltar que o profissional de Serviço Social, inserido na escola, não desenvolve ações que substituem aquelas desempenhadas por profissionais tradicionais da área da educação. Sua contribuição se concretiza no sentido de subsidiar, auxiliar a escola, e seus demais profissionais, no enfrentamento de questões que integram a pauta da formação e do fazer profissional do assistente social, sobre as quais, muitas vezes a escola não sabe como intervir. Objetiva-se compreender a importância do assistente social na inclusão de crianças com deficiências nas escolas regulares, na tentativa de discussão e ampliação sobre esse tema. Conhecer a educação inclusiva ajuda na maneira de conviver com essa parcela da população e como a participação de toda a sociedade, provoca mudanças não só físicas mais também estruturais para que a pessoa incluída tenha, acesso a mesma educação daqueles que não tem deficiência.

Palavra-Chave: Serviço Social; Inclusão Escolar; Exclusão e Deficiência.

**[ECE057] – A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES COM CÂNCER**

Eliane Regina Fontainha Ribeiro - Angela Maria Caulyt Santos da Silva

Eliane Tozato Pereira - Leyla Márcia Kill

Espera-se que este artigo contribua no campo das políticas sociais públicas e possa ser referência às mulheres em tratamento contra o câncer, sobretudo conheçam seus direitos garantidos e que lutem pelos mesmos. Para que esse propósito seja alcançado entra em atuação o assistente social fazendo orientações sobre as políticas públicas e orientações técnicas sobre os meios para acessar esses direitos. O objetivo é identificar as políticas públicas direcionadas às mulheres com câncer; e, descrever a atuação do assistente social em meio às políticas públicas para mulheres com câncer. Pesquisa descritiva com característica de abordagem qualitativa e bibliográfica com utilização de bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Universidade Federal De Minas Gerais (UFMG) no período de junho de 2012 a junho de 2017. Consideram-se como resultados a apresentação de políticas sociais públicas, Leis e Portarias que amparam as mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Discorre-se brevemente sobre os aspectos da doença câncer de mama, câncer de colo do útero e câncer de ovários que são os que mais acometem as mulheres. As principais legislações que as amparam e descreve-se sobre a atuação do assistente social em equipe multidisciplinar, com orientações técnicas à mulher ou ao seu familiar para acessarem esses direitos. Conclui-se afirmando que a atuação do assistente social é importante no campo da saúde, pois para acessar direitos é necessário que tenha profissional que instrua essas mulheres e seus familiares na luta por um tratamento digno, para que tenham seus direitos respeitados.

Palavra-Chave: A atuação do assistente social; Políticas Públicas; Mulheres com câncer

**[ECE058] – A EDUCAÇÃO E A TRANSFORMAÇÃO DO INDIVÍDUO: UMA VISÃO  
RELACIONADA AOS EGRESSOS DO CURSO SERVIÇO SOCIAL – 1ª TURMA EMESCAM**

Alfredo Bruno Siqueira Rossi - Edelária Koehler - Nara Núbia Siqueira Marçal  
Célia Marcia Birchler - Angela Maria Caulyt Santos da Silva  
Rúbia Mara Ferreira de Alvarenga

Esse trabalho de conclusão de curso buscou contextualizar a trajetória dos egressos da primeira turma de Serviço social da Emescam, relatando acerca das políticas públicas voltadas para a educação explorando o subjetivo do entrevistado na sua experiência vivida durante e após a graduação correlacionadas com as expressões da questão social, elucidando a transformação do sujeito através do processo educacional de forma descritiva, utilizando a metodologia qualitativa para humanizar a pesquisa destacando as interações humanas e as acepções dos fenômenos. Através da coleta de dados documental com tratamento sintético, pesquisa de campo buscando informações diretas com o sujeito e analisando o conteúdo para relatar o comportamento do ser, atestado por uma fonte com intuito de desvendar o curso para além do mercado de trabalho, analisando a transformação do sujeito através da graduação, assim concluímos que o indivíduo mesmo que não venha a exercer suas atividades no campo profissional, através de todo aparato absorvido e refletido na graduação o torna apto para ser um assistente social.

Palavra-Chave: Educação. Egressos. Transformação. Serviço Social.

**[ECE059] – A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO MERCADO DO TRABALHO: A EXPERIÊNCIA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NAS APAES DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA**

Agata da Silva Firmino - Fabiana Breda Gomes - Maria Cirlene Caser  
Glauca Salles Xavier - Sebastião Gonçalves de Barros Neto

Este artigo faz uma reflexão acerca do processo de trabalho dos assistentes sociais das APAES, da Região Metropolitana de Vitória, na inclusão da pessoa com deficiência intelectual (PCDI) no mercado de trabalho. Buscou identificar os serviços oferecidos, possibilidades e desafios encontrados pelos assistentes sociais no desenvolvimento de sua prática cotidiana. Tratou-se de pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevistas, com roteiro semiestruturado de perguntas fechadas e abertas, com as assistentes sociais. As informações foram coletadas em caráter confidencial, assegurando privacidade, sigilo e proteção à identidade dos participantes, tendo para isso utilizado nomes fictícios de flores para os 08 (oito) participantes da pesquisa. O estudo revelou que numa sociedade regida pelo sistema capitalista, apesar das legislações existentes, a inclusão das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho encontra barreiras e que estas se constituem em desafios a serem enfrentados pelos assistentes sociais inseridos nesses espaços sócios ocupacionais. O trabalho do assistente social enfrenta mudanças e demandam uma visão crítica, que possibilite enfrentar os desafios postos nas instituições, dessa forma, cabe aos assistentes sociais inseridos nas instituições, conhecer a realidade social, buscando estratégias para propor e efetivar ações profissionais que viabilizem os espaços de inserção das PCDI no mercado de trabalho, como um direito social inerente ao homem, como condição primeira para sua sociabilidade.

Palavra-Chave: Serviço Social, mercado de trabalho e pessoa com deficiência.

**[ECE060] – A POLÍTICA DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM  
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA**

Elaine Aniceto da Silva - Gisele Ezequiel Mourão de Oliveira - Fabricia Maria Milanezi  
Eliana Moreira Nunes Garcia - Klíndia Ramos Barcelos

Este artigo teve por objetivo analisar a Política de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes no Município de Vitória, pautada nas legislações e políticas sociais que norteiam os serviços de acolhimento. Para tanto optou-se pelo método crítico dialético e pelas pesquisas: básica, descritiva, qualitativa e documental. As pesquisas possibilitaram o mapeamento dos serviços de acolhimento e a análise dos Projetos Políticos Pedagógicos que direcionam o serviço de acolhimento institucional.

Palavra-Chave: Crianças e Adolescentes. Acolhimento Institucional. Legislação Social.

**[ECE061] – ADOÇÃO TARDIA: EXPECTATIVAS E OBSTÁCULOS**

Aline Anizio Lopes - Rosieni Ott Kruger Chinad - Raquel de Matos Lopes Gentili  
Maria de Fátima dos Santos Nacari - Danielle Érica da Silva Laudino

Adoção é um processo jurídico pelo qual uma criança ou adolescente é inserido, na qualidade de filho, em uma família não-biológica. Refere-se à adoção tardia, quando esta ocorre com crianças em idade superior a 6 anos de idade e adolescentes. Objetivos: Analisar as expectativas de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade disponíveis para adoção e as expectativas de famílias em processo de adoção. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, possibilitado pela inserção institucional de pesquisadoras, que também foram estagiárias da Instituição. O processo de pesquisa, realizado ao longo de 18 meses contou com os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa documental, acessados pelo banco de dados do Sistema de Informação e Gerenciamento de Acolhimento e Adoção, entrevistas semi-estruturadas e grupo focal, realizado com crianças e adolescentes e postulantes. Resultados: Observou-se que os postulantes à adoção raramente possuem expectativas de adotar adolescentes e crianças maiores de 6 anos, com problema graves de saúde e afrodescendentes. Em relação às expectativas dos indivíduos em processo de adoção, constatou-se que as expectativas variam de acordo com a idade e com as experiências de rejeição anteriores. Conclusão: A pesquisa confirmou o predomínio do desejo de adoção de crianças na primeira infância, apesar de existirem algumas adoções tardias, indicando a existência de uma sociabilidade que consagra uma visão dos postulantes à adoção, de demandarem adoção crianças pequenas, solidificando situações de violações de direitos crianças e adolescentes no âmbito social, emocional e afetivo.

Palavra-Chave: Adoção Tardia. Criança e Adolescente. Acolhimento Institucional.

**[ECE062] – ANÁLISE DA INSTRUMENTALIDADE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DE UMA EMPRESA PRIVADA EM VITÓRIA – ES**

Aparecida de Oliveira Rezende - Renata Nunes Ribeiro - Maria Cirlene Caser  
Cláudia Gomes Rossoni - Livia Pereira Nunes Bessa

Este artigo tem como objeto de estudo a análise da instrumentalidade no exercício profissional dos assistentes sociais de uma empresa privada, localizada em Vitória - ES. Compreendemos que o Serviço Social caracteriza-se como uma profissão assalariada inserida na divisão social e técnica do trabalho que enfrenta as correlações de forças entre capital x trabalho, isto é, ao mesmo tempo em que atua sobre as necessidades dos trabalhadores é chamado a atender aos requisitos de seu empregador. Desse modo, este estudo buscou evidenciar através das mudanças do mundo do trabalho a forma com que a instrumentalidade configurada como mediação tem sido executada na passagem das ações meramente instrumentais para o exercício profissional crítico e competente, considerando nesta perspectiva o olhar do próprio assistente social sobre seu processo de trabalho. Tratou-se de pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, utilizando o procedimento documental para a coleta de dados do sistema de registro de casos sociais atendidos pelo setor de Serviço Social. As informações foram “complementadas” com entrevistas realizadas com assistentes sociais que atuam nesse espaço ocupacional. Conclui-se que mesmo com os desafios e contradições na rotina profissional, o assistente social na empresa privada tem extrema importância, pois compreende a realidade social dos empregados na sua totalidade e a partir desse conhecimento desenvolve a instrumentalidade do exercício profissional, com estratégias e técnicas para atender as intervenções com competência profissional, e como resultado conquista cada vez mais seu espaço de atuação na empresa privada.

Palavra-Chave: Serviço Social. Esfera Privada. Instrumentalidade.

**[ECE063] – AS MÃES DA APAE: DESAFIOS ENFRENTADOS COM A CHEGADA DOS (AS) FILHOS (AS) COM DEFICIÊNCIA**

Eliane Coutinho Silva - Jéssica de Oliveira Rosa - Rosangela Maria Marineli Januthe  
Leyla Márcia Kill - Gláucia Salles Xavier - Rayany Mathias da Silva

Essa pesquisa de campo, qualitativa, de natureza descritiva e exploratória realizada com 10 mães dos usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cariacica, visou abordar os desafios enfrentados pelas mães e/ou famílias com a chegada dos (as) filhos (as) com deficiência, bem como o tratamento dado a esta questão tanto pela sociedade quanto pelo Estado ao longo da história. Procurou-se discorrer sobre o trabalho do assistente social na referida instituição e sobre quais foram as políticas públicas desenvolvidas no Brasil que asseguram os direitos sociais a esta parte da população. A exemplo disso, temos os artigos 203, 227, 244 da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outras legislações. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o processo vivenciado pelas mães da APAE com a chegada dos (as) filhos (as) com deficiência. Como objetivo específico, buscou identificar os desafios enfrentados no cuidado da pessoa com deficiência e apresentar algumas políticas públicas desenvolvidas para esta parte da população. Após a análise dos dados coletados, foi constatado que 80% das mães entrevistadas encontram-se sozinhas no cuidado do (a) seu (a) filho (a) e que uma das maiores dificuldades enfrentadas é a locomoção dessa camada social em vias públicas. Por fim, essas genitoras afirmam que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é de extrema importância no processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência.

Palavra-Chave: Deficiência. Desafios. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Serviço Social. Políticas Públicas.

**[ECE064] – DOENÇA DE ALZHEIMER: O CUIDADO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS E CUIDADORES**

Iara Julião Lopes - Maria da Silva Santo - Eliane Tozato Pereira  
Adriana Mendes – Renato Lirio Morelato

Este artigo tem como objetivo traçar o perfil sócio demográfico dos idosos com Doença de Alzheimer (DA) e de seus cuidadores que fazem acompanhamento no ambulatório de geriatria do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – HSCMV, identificando às dificuldades e/ou demandas apresentadas ao Serviço Social. Tratou-se de uma pesquisa documental com levantamento de dados no prontuário eletrônico e análise de 23 fichas de entrevista social com informações dos idosos e cuidadores realizada pelo assistente social da instituição. Identificou-se nesta amostra que os idosos possuem baixa escolaridade, são aposentados ou recebem benefício assistencial, com renda que varia de um a três salários mínimos, a maioria professa sua fé na religião católica e geralmente convive com um familiar, filho/a, esposo/a, que exerce a função de cuidar. Os cuidadores são na maioria informal, do sexo feminino com escolaridade de nível médio e sem vínculo empregatício devido à necessidade de despender tempo integral ao idoso. Apesar das dificuldades econômicas e sociais, e da sobrecarga de trabalho, cuidar é um ato de amor e solidariedade para os cuidadores pesquisados. Embora as legislações vigentes preconizem aos idosos e cuidadores o acesso a bens e serviços como direito do cidadão, verifica-se que ainda faltam investimentos e efetivação de políticas públicas voltadas para esses sujeitos. Os dados apontam para necessidade de ampliação da oferta de grupos de apoio, como o Grupo de Cuidadores de Idosos do HSCMV, assim como maior envolvimento da sociedade e do Estado nas demandas relativas ao processo de envelhecimento, e, sobretudo, a velhice com Alzheimer.

Palavra-Chave: Idoso, Alzheimer, Cuidador, Família, Dificuldades.

**[ECE065] – EXPECTATIVAS DE FAMÍLIAS E DE CRIANÇAS NO PROCESSO DE ADOÇÃO**

Fabiana Oliveira Dos Santos - Lorena de Souza Eleutério  
Raquel De Matos Lopes Gentilli - Cláudia Gomes Rossoni  
Danielle Érica da Silva Laudino

O objetivo deste trabalho foi discutir as expectativas dos postulantes à adoção e de crianças até 6 (seis) anos de idade em face da realidade destas, em acolhimento institucional, quanto ao processo de adoção. Método: o método utilizado para fazer a pesquisa seguiu a metodologia proposta por Cecília Minayo com abordagem de estudo qualitativo. Para a coleta de dados foram utilizadas revisão bibliográfica, pesquisa documental no Sistema de Informação e Gerência da Adoção e Acolhimento, com autorização institucional, entrevista com os candidatos à adoção e observação participante das crianças em atividade lúdica. Resultados: Obtivemos, como resultado, elementos sobre a visão da família adotante em relação ao convívio familiar que vai ser modificada com o ingresso da criança adotada e da construção de uma nova tecitura de relações em família. Conclusão: Concluimos que as famílias entrevistadas relatam expectativas ligadas à identificação tanto de aparência física quanto de personalidade. Em relação às expectativas das crianças observamos que as mesmas trazem questões envolvendo sentimentos de pertencimento e inclusão, manifestação de afeto e cuidados individuais, manifestação de desejo de segurança e proteção.

Palavra-Chave: adoção, acolhimento, criança institucionalizada

**[ECE067] – INCLUSÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DA GRANDE VITÓRIA  
NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL**

Cristiane Dos Santos Toretta - Kelly Aparecida Oliveira Dos Santos  
César Albenes De Mendonça Cruz - Angela Maria Caulyt Santos Da Silva - Marcélia Retz

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de inserção dos egressos do sistema prisional no mercado de trabalho formal que são atendidos no Escritório Social da Secretária de Estado da Justiça (SEJUS) localizado em Vitória/ES. Conhecendo as legislações existentes que os amparam, como a Lei de Execução Penal e o projeto “Escritório Social”, que visa reintegração social para àqueles que cumpriram pena restritiva de liberdade, diagnosticando quais são as suas carências, necessidades e compreender os meios que o Governo do Espírito Santo oferece para viabilizar a reintegração social por meio do trabalho. Portanto, considerando a categoria trabalho como determinante na vida humana ao longo da história, torna-se necessário pensar o âmbito do trabalho e sua representatividade, sobretudo de pessoas que passaram pelo sistema prisional, uma vez que a sociedade reconhece o sujeito pelo trabalho que exerce no meio social. Através deste estudo foi possível verificar as dificuldades que o egresso encontra para se inserir no mercado de trabalho e a sua efetivação, tendo em consideração a complexidade que consiste na subjetividade desses indivíduos e/ou pelas falhas que a política possui, entre elas a falta de efetivação do cumprimento das leis e a fiscalização daquelas que são inerentes ao Estado. Quanto a metodologia adotada, utilizou-se um estudo qualitativo, e os procedimentos utilizados foi a pesquisa bibliográfica exploratório e descritiva.

Palavra-Chave: Egresso Prisional. Mercado de Trabalho Formal. Escritório Social. Reintegração Social.

**[ECE068] – A INSERÇÃO DE PESSOAS TRANSEXUAIS NO MUNDO DO TRABALHO:  
DESAFIOS E PERSPECTIVAS**

Bárbara Oliveira de Souza - Ingrid Naiara Moreira Martins - Maria Cirlene Caser  
Pedro Bussinger - Sebastião Gonçalves de Barros Neto

Esse artigo teve por objetivo analisar os desafios e perspectivas da população transexual integrantes do grupo da Associação Gold – Grupo Orgulho, liberdade e dignidade no processo da inserção no mercado de trabalho. Este segmento da população não consegue emprego formal e por isso, na maioria das vezes, realiza trabalho informal e/ou atua na prostituição. De acordo com o dado da ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transexuais, 90% das travestis e transexuais estão se prostituindo no Brasil. Tratou-se de pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevistas, com roteiro semiestruturado de perguntas fechadas e abertas, com 10 (dez) integrantes transexuais da associação Gold. Conclui-se que existem dificuldades para a inserção da pessoa transexual no mundo do trabalho. Apesar da maioria dos transexuais terem cursos e escolaridade de acordo com o exigido no mercado formal de trabalho, são deixados para trás na hora da seleção. Além disso, os que estão inseridas no trabalho formal sentem o peso da intolerância no ambiente de trabalho, pois as empresas não estão preparadas para lidar com a situação, sendo revelado que os colegas de trabalho não entendem a sua condição de transexual, ficando evidente a falta de informação por parte dos integrantes das empresas sobre a identidade de gênero. Identificou-se que são necessários investimentos em políticas públicas que assegurem a empregabilidade para essa população, cabendo aos assistentes sociais trabalhar para efetivação das políticas sociais, lutando para a defesa e garantia de seus direitos.

Palavra-Chaves: Mercado de Trabalho - Serviço Social - População Transexual.

**[ECE069] – O PROCESSO DE DESLIGAMENTO DE ADOLESCENTES  
INSTITUCIONALIZADOS: REFLETINDO SOBRE MAIORIDADE E AUTONOMIA**

Andreia Lopes - Jéssica Gomes Lopes  
Eliana Moreira Nunes Garcia – Fabricia Maria Milanezi

Essa pesquisa buscou contextualizar o processo de desligamento de adolescentes institucionalizados. Mais especificamente, objetivou-se analisar em que medida as ações promovidas pelos serviços de acolhimento institucional contribuem para que os adolescentes que se encontram em processo de desligamento, devido à aproximação da maioridade, estejam preparados para a vida fora do acolhimento institucional, tendo condições de conduzir a própria vida com autonomia. Constitui-se de uma pesquisa descritiva com característica de abordagem qualitativa, realizada por meio de pesquisa bibliográfica, além de consulta em materiais publicados: livros, artigos, materiais disponíveis na internet, e também Relatórios Anuais de Gestão (2013 a 2016) de uma instituição de acolhimento para crianças e adolescentes da Região Metropolitana de Vitória/ES, entre outros materiais. O estudo revelou que as ações desenvolvidas pelas instituições de acolhimentos estão de acordo com o que preconizam as legislações vigentes. As instituições oferecem acesso à educação, à convivência comunitária, participação em cursos de formação profissional e em programas de adolescente aprendiz, contudo, os adolescentes frente ao desligamento não estão totalmente amparados pelas políticas públicas existentes, pois nem sempre, estas garantem aos adolescentes a conquista da autonomia quando da maioridade.

Palavra-Chave: Adolescente. Acolhimento institucional. Maioridade. Autonomia.

**[ECE070] – POLÍTICA NACIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA:  
CONHECENDO A EXPERIÊNCIA DO CENTRO POP DE VILA VELHA (ES)**

Debora Barbosa Alves - Eliana Moreira Nunes Garcia  
Cláudia Gomes Rossoni - Maria Dorotéa dos Santos Silva

Este estudo tem como tema a Política Nacional para População em Situação de Rua e o Centro Pop, dentro do contexto histórico de conquista dos direitos e garantias fundamentais para esta população. Como objetivo, procura analisar a implantação e consolidação do Centro de Referência Especializado para População em situação de rua (Centro Pop) de Vila Velha, Espírito Santo à luz da Política Nacional de Assistência para Pessoas em Situação de Rua e propõe descrever o processo de uso das ruas como moradia (habitar-morar) por esse segmento da população, contextualizando o processo de rompimento dos vínculos sociais e familiares. A metodologia escolhida para este estudo foi a pesquisa bibliográfica e documental. Para contextualizar o uso das ruas como moradia (habitar-morar) optou-se por uma revisão bibliográfica dos autores que discutem essa temática, normativas, orientação técnica e política específica destinada ao atendimento a esta população, visando fundamentar e compreender o processo de construção e efetivação dessas políticas. A pesquisa qualitativa descritiva e documental foi realizada nos relatórios de atendimentos produzidos do Centro Pop, do município de Vila Velha. Este estudo demonstra que o desafio está na reformulação de políticas públicas coerentes com a real necessidade da PSR e das mais variadas demandas na busca pela construção da cidadania e emancipação destes indivíduos das ruas. Neste sentido apontamos que o tema população em situação de rua é relevante, e complexo; o que requer novos estudos e aprofundamento, buscando respostas na realidade vivida por esses sujeitos, e nas mais variadas expressões da questão social que estão expostos, visando uma intervenção humanizada, e a ampliação das políticas públicas.

Palavra-Chave: Assistência Social. População em Situação de Rua. Centro Pop – Vila Velha.

**[ECE071] – RELAÇÃO ENTRE CONSELHO TUTELAR E MÃES ADOLESCENTES IDENTIFICADAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: APONTAMENTOS PARA UM DEBATE)**

Ana Paula da Pena Costa - Bruna Ávila Pimenta da Silva - Jaqueline da Silva  
Célia Márcia Birchler - Jussara Bezerra de Menezes

O presente trabalho tem como objetivo apresentar breve debate, sobre o atendimento do Conselho Tutelar, visto a demanda de acompanhar adolescentes em situação de risco social, desacompanhadas de seus responsáveis. Traz na história dos direitos da pessoa em desenvolvimento, a necessidade de criar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) juntamente com o Conselho Tutelar, que visam respectivamente, transformar as crianças e adolescentes em cidadãos providos de todos os direitos, e dar a proteção garantindo os direitos para aqueles que tiverem seu direito violado. Diante disto, analisaremos um (1) caso, em que seria fundamental o atendimento do Conselho Tutelar, levando em conta as atribuições do mesmo dispostas no ECRIAD e o que está disposto na lei que rege esses desprotegidos. Citaremos o crescente número de gravidez na adolescência que é uma questão social cada vez mais presente no nosso dia a dia e percebidos dentro do campo de estágio da maternidade Pro-Matre. Diante do não acompanhamento dos responsáveis legais dessa adolescente, faz com que mãe e filho se tornem indefesos diante da sociedade e desprovidos de seus direitos, inerentes a pessoa humana. Salientamos a importância do trabalho em rede e do conhecimento dos direitos de cada cidadão, como também o trabalho primordial do Serviço Social em constatar a demanda e enviá-la para o órgão competente, para que tomem providências cabíveis aos mesmos.

Palavra-Chave: Gravidez. Adolescência. Conselho Tutelar.

**[ECE072] - COMENTÁRIOS SOBRE LEGISLAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - A DIFERENÇA ENTRE ABONO E JUSTIFICATIVA DE FALTA**

Janaina Dardengo Paterline; Diego Peixoto Costa; Fábio Marçal Vasconcellos; José Francisco Milagres Rabelo; Nayana Ferreira Pereira

Nota-se com muita frequência que as figuras da justificativa e do abono de faltas geram dúvidas e confusões entre suas essências e especialmente sobre os efeitos causados por cada um, especialmente quando entra em questão a hipótese do regime de compensação de faltas. Importante destacar que, apesar da confusão existente, trata-se de institutos distintos com motivações, aplicabilidades e consequências que serão destacadas de forma a minimizar quaisquer desentendimentos. O abono de faltas se dá quando por força de dispositivos legais ou normativos externos ou internos à IES, o estudante não participou da atividade acadêmica realizada; neste caso, o aluno tem a sua ausência devidamente registrada na pauta de controle de frequência, porém esta falta não será contabilizada para a apuração de apuração da frequência mínima exigida para aprovação no respectivo componente curricular. Assim, dado que a falta, apesar de registrada, não será computada, vindo a mesma ser devidamente abonada. A justificativa de faltas é a apresentação de motivo razoável apto a justificar a ausência do estudante a atividade acadêmica obrigatória. Trata-se do caso fortuito ou força maior, assim entendidos aqueles fatos necessários postos diante dos acadêmicos cujo efeito não seria possível evitar ou impedir. Neste caso ocorre a contabilização dessa ausência para fins de aprovação ou reprovação, mas fica assegurado ao estudante o direito de pleitear a realização de segunda chamada de quaisquer atividades avaliativas realizadas nas ocasiões em que esteve ausente. O regime de compensação também é bastante conhecido como Regime Domiciliar ou Regime Especial de Aprendizagem e ocorrerá em decorrência de motivos de saúde. Neste caso as atividades presenciais são substituídas pela realização de programa de atividades a serem realizadas fora do ambiente acadêmico, necessariamente de forma simultânea com o afastamento do estudante por motivo de saúde ou gestação dado se tratar de um instrumento de substituição e não como reposição. Destaque-se, entretanto, que o regime de compensação não pode ser

aplicado às atividades práticas ou às avaliações. Assim, percebe-se que a diferenciação entre o abono e a justificativa de faltas se dá na contabilização do número de faltas do acadêmico para a verificação do limite mínimo exigido no respectivo componente curricular. As faltas não são computadas no caso do abono, mas contam normalmente no caso da justificativa. Compete destacar que os registros de frequência devem refletir exatamente a realidade do momento de sua verificação, cabendo docente responsável pela atividade acadêmica desenvolvida e à secretaria acadêmica a contabilização ou não da referida falta.